











1-24 — 2nd — 31 3v 74

F. M. Schinner



# PHARMACOPOEA DANICA,

REGIA AUTORITATE

A

COLLEGIO SANITATIS REGIO  
MEDICO-CHIRURGICO HAFNIENSI  
CONSCRIPTA.




---

HAFNIAE, 1805.

Sumtibus FRIDERICI BRUMMER.

---

Excuderunt N. MÖLLER & FILIUS, Aulæ Regiæ et Universitatis Typographi.





## *L e c t u r i s*

S.

**J**am dudum Pharmacopoeae Danicae recudendae animadverti coepit necessitas, quum editionis, quae anno 1772 prodierat, exemplaria distracta repertuque difficillima essent. Multis jam abhinc annis Collegium medicum una cum Regia Societate medica susceperat consilium subeundi molestum hunc non minus ac salutarem laborem. Ejus tamen perficiendi curam relictam sibi vidit novum Sanitatis Collegium, quod anno superiore è Collegii medici et Academiae chirurgicae membris aliisque viris peritis constitutum, jussu Regio in illius locum ac munia successit, operamque in absolvenda nova Pharmacopoeae diu desideratae editione collocatam, omnium primam gravissimamque esse censuit.

Longe simplicior recentioris medicinae facies, multorum medicamentorum antiquiorum inutilitas, nonnullorum recentiorum nondum usu satis comprobata agendi facultas una cum eximio, quem ars Chemica nostro aevo fecit progressu, insignes postulavere mutationes, multasque cautiones adhibendas suaserunt.

Duplex inprimis nos sollicitos habuit desiderium, alterum, ne remedium apparatus justo nimis augetur, verum potius provide, absque ullius idonei neglectu, restringeretur; alterum eo tendens, ut Medicis practicis esset copia, inter medicamenta virtute paria, ea deligendi exhibendique in usus, quae propositis finibus obtinendis inprimis apta et accomodata iis visa essent. Hinc dedimus operam, ut inter medicamentorum numerum nimis largum atque angustum media a nobis via teneretur, quod quidem studium, quousque nobis successerit, penes aequos peritosque lectores esto iudicium.

Grati profiteamur nos e nonnullarum Pharmacopoeiarum recentiorum luce nutibusque profecisse, neque cuiusvis nostri Collegii Sodalium usum diuturnum et experientiam multiplicem consulere negleximus.

Pharmacopoea nostra in duas divisa partes est. Priori continetur materia pharmaceutica, seu eorum medicamentorum, quae retinenda esse duximus, recens. Complectitur non modo simplicia, sed ea quoque praeparata, quae, quum commode hic parari nequeant, peregre advehi necesse sit.

Ordinem sequuti sumus sequentem: Primo loco habetur cuiusvis medicamenti nomen officinale. Sequuntur ejusdem nomina vernacula, quantum fieri potuit, in Dania, Norvagia, Islandia, Lapponia cet. consueta, denique Teutonica. Ea tandem excipit Lin-

naeanum, addita Classium et Ordinum, ad quos illud pertinet, mentione, ejusque descriptione succincta. Quibus praemissis subjiciuntur Characteres sensus potissimum ferientes, saporis, odoris, nec non figurae cujuscunque fere simplicis; locus natalis, tempus collectionis et imprimis notae bonitatis. Neque desiderantibus in medicamentis e regno vegetabili receptis, deest designatio tabulae aeneae, quae in Florae Danicae illustri opere ejus figuram exhibet.

Parte posteriore medicamenta composita et praeparata comprehenduntur. Hic quoque diu haesimus suspensi, utrum chemica nomenclatura recentior a nobis recipienda, an servanda antiquior esset. Hinc aderant causae verendi, ne nova vocabula minus peritos tabernarum medicarum ministros in errores inducerent, iisque varia miscendi turbandique ansam praeberent; illinc probabilis expectatio, non adeo procul abesse tempus, quo antiqua recentioribus locum cedere sint; et omnino commendabilior ratio ea visa est, qua medicamentorum denominatio potius a partium constituentium natura, quam virtute medica, peteretur. Inde et hic mediam inire viam conati sumus, ut adeo et antiquiora et recentiora nomina, cum in ordine alphabetico generali, tum in indice commemorata reperiantur, quo ea quaerendi noscendique difficultas nulla erit.

In remediorum extemporaneorum delectu cautam parsimoniam adhibuimus, ut non nisi perpauca admissa inveniantur. Persuasum enim



nebis habuimus, Pharmacopoeam unice ad pharmaceuticas chemicasque notiones referri debere; neque dubitavimus, doctum quemvis facili negotio e medicamentorum apparatu copioso formulas suas compositurum. Accedit, quod in notis formulis applicandis saepius singularia momenta atque indicia obveniant, quorum habita attentius ratione illas immutari oportet; nimiae vero formularum copiae facilis sit abusus, ad adjuvandam adaugendamque malam medicastro-  
rum sedulitatem, unde ad rempublicam infanda damna redundant. Agyrtis vero hisque, quorum ad aegrotantis cubile perfugium est formularum pharmaceuticarum sylloge, nostram Pharmacopoeam inservire nolumus.

Praeparationes chemicae ex parte sunt multo simpliciores reditae, omnes vero, quoad fieri potuit, accuratissime institutae. Conspicua nostrorum pharmaceuticorum Sodalium Beckeri et Mantheyi, virorum peritissimorum solertia, nos de illarum explorata fide esse certissimos jubet.

Quum ob emptorum paucitatem fieri omnino nequeat, ut oppidorum minorum tabernae medicae pleno medicamentorum apparatu instructae sint, delectum maxime necessariorum, quae in omnibus minoribus pharmacopoliis praesto esse debeant, in calce subjunximus.

Tandem adjecta est Taxa medicinalis, quae tamen e jussu Regio, prout commerciorum vicissitudines aliaeque rationes id postulerint, annuis mutationibus erit obnoxia.



Caeterum gravitatem et difficultatem laboris a nobis suscepti  
omni ambitu suo perspectam habuimus, nullique operae pepercimus,  
ut ea quam diligentissime perfunderemur. Idcirco vero novam  
hanc Pharmacopoeam omnium iudicio se probaturam esse, tantum  
abest ut sperare audeamus, ut potius existimaturi simus, nos stu-  
diorum nostrorum fructus sat uberes lactosque percepisse, ubi iis,  
ad leniendam aegrotantium miseriam et ad sanitatem eorum citius  
tutiusque restituendam, nonnihil conferre nobis contigerit.

---

## NOTAE circa Pondera et Mensuras.

- I. Libram medicam ubique in Pharmacopoea nostra intelligimus. Est illa Unciarum duodecim. Si quis igitur libram ponderis civilis desideret, distinctis hoc in praescriptione notetur verbis, Unciarum numerum, quarum haec sedecim habet, indicando.
- II. Uncia (℥) drachmas octo; Drachma (℥) tres scrupulos; Scrupulus (℥) viginti grana continent, uti melius e sequenti apparet Tabula:

	Libra una	Libra femis	Uncia una	Uncia femis	Drach. una	Drach femis	Scrup. unus	Scrup. femis	Gran. unum
Gr. Granum . .	..	..	..	..	..	..	..	..	I
℥β Scrupulus femis	..	..	..	..	..	..	..	I	10
℥ Scrupulus unus	..	..	..	..	..	..	I	2	20
℥β Drachma femis	..	..	..	..	..	I	1½	3	30
℥j Drachma una	..	..	..	..	I	2	3	6	60
℥β Uncia femis .	..	..	..	I	4	8	12	24	240
℥j Uncia una . .	..	..	I	2	8	16	24	48	480
℥β Libra femis . .	..	I	6	12	48	96	144	288	2880
℥j Libra una . .	I	2	12	24	96	192	288	576	5760

III. Mensura nostra ordinaria (℥ot) est librarum duarum ponderis civilis.

IV. Herbarum florumque pondus in praescriptionibus per fasciculos, manipulos et pugillos determinari solet. Praestat vero et his pondus exactum assignare. Sit igitur *Fj* (Fasciculus) unciae unius, *Mj* (Manipulus) unciae femis, *Pj* (Pugillus) drachmae unius ponderis.








P A R S I.

MATERIA PHARMACEVTICA.









C A N O N E S  
MATERIAE PHARMACEVTICAE  
PRAEMITTENDI,

A. *Pro Fungis.*

- I. Cito siccati ab heterogeneis admistis liberentur.
- II. Serventur loco sicco, ne mucorem contrahant.

B. *Pro Radicibus.*

I. Annuae Radices, quarum parcissima tamen in nostris pharmacopoliis copia est, evellentur, antequam caules floresque protrulerint. Biennes altero, ex quo fata sunt, vere eruantur. Si vero inopia urget, autumn ejusdem anni, quo fata sunt, postquam folia caulesque emarcuere, colligi possunt. Perennes perinde est, vere an autumn effodiantur. Autumn tamen pleraeque sunt si non efficaciores, certe aquoso succo non adeo turgidae.

II. In delectu Radicum, spongiosae, farinaceae, cariosae, imprimis vero exsucco cortice tectae, rejiciantur. Bonitatem enim Radicum ostendit perfectus torosusque corticis habitus.

III. Quae principiis aromaticis et resinosis praeditae sunt Radices, lotionem non purgantur. Sufficit, si de modice siccatis pulveres, sordesque excutiantur.

IV. Praegrandes et succulentae Radices, in taleolos dissectae ferventur.

V. Siccentur cito Radices aut loco calido ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore.

VI. Siccatae frigido siccoque loco ferventur, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coerceantur vasis.

VII. Patriae nostrae inquilinae, tum succulentae multum gummosae, tum etiam subtilibus et facile avolantibus viribus praeditae, quotannis recentes legantur aut arcessantur.

VIII. Quibus siccatis exigua, recentibus vero multa virtus inest; ut Armoraciae, Iridis, Ari, Scillae, Bryoniae, opportuna tempestate collectae, sabulo sicco reconditae ferventur.

### C. *Pro Lignis, Corticibus et Stipitibus.*

I. Stipites versus autumnum, quo tempore succo efficaci probe cocto scatent, refecentur.

II. Cortices e fruticibus autumnno ex arboribus adulta hyeme, accedente vere, deglubantur.

III. Ligna hiberno succidentur tempore.

### D. *Pro Herbis, Foliis et Gemmis.*

I. Turiones gemmaeque primo vere, quo tempore turgidulae sunt, et ante explicationem foliorum decerpantur.

II. Herbae colligantur adultae cum foliis rite expansis, antequam flo-

res sese explicuerint. Quae semper virent, quovis tempore colligere licet, verum tamen praefiat.

III. Folia colligenda sunt tempestate sicca non diu post ortum solis, simulac rorem, quo nocte canescunt plantae, Solis radii dissipaverint. Decerpantur vero, postquam defloruerit et antequam maturuerit planta.

IV. Herbae indigenae quotannis recentes comparari debent. Effoetae superflites pro sale alcali Herbarum (Kali) parando adhiberi possunt.

V. Exsiccatio herbarum citissime fiat aut calido umbroso et ab aëre perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

#### E. *Pro Floribus.*

I. Flores decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploferint, quamprimum radii Solis rorem dissipaverint.

II. Coma florens colligenda, dum flos explicari incipit.

III. Siccentur ut herbae, et quidem, quam fieri potest, citissime.

#### F. *Pro Seminibus.*

I. Semina colligantur perfecte matuta, antequam sponte excidant, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo.

II. Quae capsulas, involucra etc. retinent Semina, ea his munita servantur.

III. Plerumque autem Seminum delectus ita inslituendus est, ut aquae immittantur, et quidquid supernatat, abjiciatur: quod vero fundum petit, iterum sicceatur.

G. *Pro Fructibus.*

Fructus non nisi maturi decerpantur, si excipias *Acaciae* et *Aurantiae* fructus, de quibus infra.

---







**ABROTANUM.** Abrod. Eberaute; Gernyurzel; Gerisfrant.

*Artemisiae Abrotani*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA. Planta frutescens Europae meridionalis et Orientis, apud nos in hortis colitur. Colligenda mense Augusto cum summitatibus. Odoris est fragrantis grati; saporis amaricantis aromatici.

**ABSINTHIUM VULGARE.** Malurt. Gemeiner Wermuth.

*Artemisiae Absinthii*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA. Colitur in hortis et nonnunquam sponte provenit in ruderatis, maritimis aridis et ad vias. Planta perennis, mense Augusto colligenda cum summitatibus. Odoris est nauseosi gravisque; saporis intense amari. Flor. Dan. Tab. 1176.

**ACACIA NOSTRA.** Slaetorn; Kreygebærtorn. Stecke-  
den.

*Pruni spinosae*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., FLORES. Frutex humilis in dumetis et ad sepes occurrens, flores mense Aprili colligenda sunt fere-  
no coelo. Odor florum recentium gratus; sapor amaricans, amygdalae amarae accedens. Flor. Dan. Tab. 926.

**ACETOSELLA.** Skovsyre; Suurklover; Giogemad; Giogeurt. Sauerklee.

*Oxalidis acetosellae*, Linn. Cl. X. ord. Pentagyn., HERBA. Planta perennis, in sylvis muscosis et ad sepes umbrosas copiose crescit. Odoris nullius; saporis acidi grati, succo citri vel acido Tartari fere similis. Colligenda mense Majo. Flor. Dan. Tab. 980.

Ejusdem SAL. Skovsyresalt. Sauerkleesalz.

*Oxalidis acetosellae* Sal *essentiale acidum*. Sincerum hoc sal aliunde advectum, pulverem exhibet non adeo subtilem in lamellulas dispositum, ex

albo gilvi, aut subfusci coloris. Saepius vero crystallis tartari et acido sulphurico remixtum invenitur, quod ex saporis differentia et solutione in aqua fontana gypsi quid continente, admixtas tartari crystallos praecipitante, patet. — Copiosissime in Svecia, tum in Alsatia, nec non in sylva Thuringea, e succo plantae paratus. Cum Oxalide corniculata v. potius stricta Linnaei etiam confunditur; planta luteos flores habens et copiosum sal largiens, in Helvetia majori copia reperiunda.

ACETUM. *Ædise. Essig.*

Acetum crudum parari potest ex quovis liquore vinoso, fermentationi acetosae subjecto. Sit sincerum, gustu et odore gratum, et taniae aciditatis, ut unciae duae sufficiant ad Kali carbonici drachmam perfecte saturandam. Adulteratio aceti, acido sulphurico effecta, detegitur, si adjecta baryta muriatica progignit barytam sulphuricam, in acido nitrico diluto haud solubilem.

ACONITUM. *Stormhat; Blaemunke; Munkehätte. Eisenshürlein; Blauer Sturmhut; Mönchskappen; Narrenkappen.*

*Aconiti Napelli*, Linn. Cl. XIII. ord. Trigyn., HERBA. RECENS plerumque in hortis culta, in Siaelandia et Laalandia vero sponte, uti in Europa meridionali, crescens, mense Julio colligenda. Odor fortis, herbaceus; recentis odor, si teratur, virosus.

ACORUS VERUS. Vid. *Calamus aromaticus.*

AERUGO. Viride aeris. Cuprum aceticum. *Spansegront. Grünspan.*

Est cuprum inter vinacea expressa corrosum, donec sale metallico imperfecto obductum fuerit, quod deinde abraditur et asservatur. Paratur maxime in Gallia et optime in officinis Montepessulani. Colligendum quod e colore viridi ad coeruleum vergit, et creta non adulteratum. Sit solidum, siccum, sine maculis atris, et in aceto fere sine residuo solubile.

Lillmids affnissning gynn aflyg i Döyda, som sinder sig  
 (där en Götting, og man sagt saa mange Dunder, at Bj-  
 men v, samt de Lulldommer at medle Bj halsi cer-  
 beren u-fa lutan (manst Holag, du,





AGARICUS CHIRURGORUM; FUNGUS QVERNUS. Eget-  
svamp; Tondersvamp. Eichenschwamm; Euntenschwamm; Zunderschwamm;  
Fenerschwamm.

*Boletus igniarius*, Linn. Cl. XXIV. ord. Fung. FUNGUS acaulis pulvina-  
tus, convexo-planus, saepe ungulae equinae figurae, supra corticosus, infra  
fistulosus sive porosus, in medio mollis, superne fulvus, interdum fasciis dis-  
coloribus, inferne pallidior sive albidus. In caudicibus Betularum, Qver-  
cum, Tiliarum et Fagorum nascitur, mensibus Augusti et Septembris col-  
ligendus, deinde praeparandus coctione, exsiccatione et malleatione. Ino-  
dorus et insipidus est.

AGARICUS MUSCARIUS. Fluesvamp. Fliegenschwamm.

*Agaricus muscarius*, Linn. Cl. XXIV. ord. Fung. FUNGUS venenatus fre-  
quens silvarum incola, pileo coccineo, albis verrucis obfesso. Odoris vehe-  
menter ingrati; saporis urentis. Infima pars radicis terrae inhaerens, colli-  
gatur. Flor. Dan. Tab. 1129.

ALKANNA RUBRA sive SPURIA; ANCHUSA; BUGLOSSUM.  
Röd Öretunge. Rothe Ochsenzunge.

*Anchusae tinctoriae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX perennis, te-  
res, oblonga, foras rubens aut nigricans. Eligantur radices parvae, fibro-  
sae, quae colorem purpureum in tota substantia magis diffusum habent. Ma-  
iores intus albicant. Odorem habent nullum; saporem mucidum. Habe-  
tur ex Hispania et Gallia meridionali.

ALLIUM. Svildleg. Knoblauch.

*Allii sativi*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RADIX bulbosa, tunicata;  
ubique in hortis culta. Odor proprius; sapor acris, subdulcis. In sa-  
bulo servanda.

ALOË. Aloe. Aloe.

*Aloës spicatae* et *Aloës perfoliatae*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., peren-  
nis, in utraque India cultae, succus gummeo-resinosus, inspissatus, Cabal-



*lina* impura hippiatris relinquitur, et quae ex hac fraudulenter parata Aloë pura splendensque pro succotrina venditur, ingrato, nauseoso sapore atque odore se prodit. Praestantior ejus species est *Succotrina* ex Alexandria ad-  
vecta, e foliis collecta, quae, dum proba est, splendet et pellucet, unde lucida salutatur, habetur ex Aloë perfoliata. Coloris est ex spadiceo fusci, com-  
minuta, ex aureo fulvi. Calore manus flexilis est. Saporis multum amari,  
non ingrati tamen et paulum aromatici Odoris, Myrrham mentientis, gum-  
mosae magis indolis quam Hepatica; quae habetur ex Aloë spicata, obscu-  
rior est opaca, compactior; colorem habet profundiorum et superficiem non  
adeo splendentem; odoris est fortioris magis ingrati; Saporis amaricantis  
magisque nauseosi. Vilissima species est *Caballina*; coloris nempe longe ob-  
scurioris fereque nigri; Odoris foetidi ob multam copiam resinae, sordium  
fabulique ingratiissimi. Habetur ex Aloë spicata, et advehitur in putamini-  
bus cucurbitarum ex Indiis et China; vilior autem in cadis ex insulis ame-  
ricanis, praecipue Barbados insula, adfertur.

ALTHEA; BISMALVA. *Althec.* *Althee*; *Eibisch*.

*Althaeae officinalis*, Linn. Cl. XVI. ord. Polyandr., RADIX. Planta peren-  
nis in hortis culta, at sponte hinc et inde proveniens, radicem dat albam,  
digiti crassitudinis, mucilagine lenta turgidam, odoris nullius, saporis subdul-  
cis mucilaginosi. Flor. Dan. Tab. 536.

Ejusdem FOLIA cordata, tomento cinereo obducta, mense Julio col-  
ligenda.

ALUMEN CRUDUM f. VULGARE. *Allun.* *Allaun.* Est SAL  
medium terrestre e terra argillacea, pauxillo Kali et acido sulphurico compo-  
situm, postremo tamen praeponderante. Cryalli sunt octaedrae pellucidae,  
saporemque habent dulcescentem et adstringentem. Multam praeterea habent  
aquam crystallisationis. Sit splendoris, subpellucidum nec ferro inquinatum.  
Habetur e Norvagia et Scania. Advehitur ex Anglia, Germania et Italia.

oe puccinella before the Magistrate

Postmaster, answer to the letter of the 17th

Wentworth, 1881 of Fall, 1881 - Anniversary of Boy, 1881, 1881, 1881.

AMMONIACUM GUMMI. Ammoniaf. Gummi Ammoniaf.

Plantae violaceae adhuc ignotae succus gummeo-resinosus, externe obsoleto flavus, interne ex albescente, rubente et obsoleto flavo variegatus, lentus, et calore manus mollescens. Odoris nauseosi, alliacei, castoreati paucillum spirantis, Galbano quodam modo similis sed longe gravioris; saporis nauseosi amaricantis acriusculi. Praestat vel in granis angulatis variae magnitudinis, intus albidis atque inter se plerumque conglutinati, vel in massis rotundis; tum granula albida substantiae molliori fuscae immixta sunt. Haec seminibus Ferulae haud dissimilia, et fabulo plerumque interpolata sunt. Advehitur ex India orientali et Aegypto, maxime e deserto Africae Barca. Pro usu interno nonnisi electum, purissimum, Thrausina veteribus dictum, adhibeatur i. e. vel Ammoniacum in puris granis emtum, vel grumi candidiores variegati, subsplendentes, e massa selecti. Quo uberiore horum unguium seu amygdalarum dictarum copia abundat, eo praestantius Gummi ammoniacum est. Quod jam colatum venditur, suspectum est; cum saepe nonnihil Peucedani immixtum sit.

AMMONIACUM SAL; AMMONIUM MURIATICUM. Salmiaf. Salmiaf.

Est sal neutrum ex Acido muriatico et Ammonio, nec non aqua crystallisationis constans. Inter antiquissima salia habebatur, in Aegypto ex fuligine stercoreum animalium concrematorum paratum. Nunc vero Brunsvigae et aliis Germaniae locis, ac in Scotia et in Gallia fabricatur, et forma conorum, instar sacchari adfertur. Nativum etiam, montes ignivomi et Calmuccorum regio largiuntur. Crystallum habet plumosas; in modico calore totum sublimatur. Odoris est levissimi; saporis sensum frigoris linguae imprimientis, salini, urinosi. Eligatur candidum et purum, quod addito sale alcali fixo mox salis volatilis odorem spargit.

AMMONIUM MURIATICUM. Vid. *Ammoniacum Sal.*



AMYGDALAE DULCES. *Söde Mandler. Süße Mandeln.*

*Amygdalae communis*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., NUCLEI ex Europa australi allati. Sunt femina majora odore debili, sapore dulci et grato praedita, pellicula tenui, aequali, non rugosa et gilvo cinamomei coloris tecta. Sint recentes, siccae, fragiles, torosae, non rancidae nec vermibus exesae, aut maculis flavis intus conspicuis notatae.

AMYGDALAE AMARAE, praecedentium varietas; sunt femina varietatis cujusdam amygdali communis, fructu minore, saporis amaricantis in *Laurocerasum* incidentis.

AMYLUM. *Kraftmeel; Stivelse. Kraftmehl.*

*Tritici hybernici* et *Tritici turgidi*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., SEMINA in subtilissimum pulverem redacta, post elutionem principii gelatinosi et saccharini per aquam frigidam, subsidentem. Saporem habet farinaceum.

ANAGALLIS. *Rödärve; Gaaseheel; Grine ved Dag; Grine ved Middag. Gauchheil; Vogelkraut; Hühnerdarm.*

*Anagallidis arvensis*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA et FLORES. Planta annua crescit in arvis et hortis. Mense Julio colligenda. Saporis est initio oleracei, postea amari cum acrimoniae sensu. Flor. Dan. Tab. 88

ANCHUSA. Vid. *Alkanna*.

ANGELICA. *Ängelik; Övanne; Övannerod; Sloke; Slojfe; Fatno; Fadnobast; Fadnorvotas; Fadnoransse. Ängelise.*

*Angelicae Archangelicae*, Linn. Cl. V. ord. Digyn. RADIX biennis oblonga ex capite crassiore in fibras saepe pollicares vel tenuiores divisa, extus et flavo rubescens, intus alba, in Alpibus Norvagicis, Lapponicis sponte, apud nos in paludibus et hortis reperiunda; hyeme colligenda. In superficiebus segmentorum transversorum, alba, maculis numerosis flavis, oleo aethereo repletis notata. Odor aromaticus, fragrans, gratus; sapor aromaticus fortis, masticatae acris, mordens in lingua et faucibus cum calore. Sit tenax, abunde fragrans. Flor. Dan. Tab. 206.





ultramontane endem. list of birds of Argentina et maxima melaleuca

ANGUSTURA; AUGUSTURA. *Angustura.* *Augustura.*

*Bruceae ferrugineae* vel *Magnoliae speciei* CORTEX duriusculus, fragilis, externe pallidus subcinerascens, rugosus subsulcatus, interne e luteo subfuscus laevis. Odor leniter aromaticus; sapor primo amygdalis amaris similis, deinde acris. In frustis plerumque latis subconcavis, interdum convolutis digiti crassitie commixtis, ex America meridionali advehitur.

ANISUM. *Anis.* *Anis.*

*Pimpinellae anisi*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN recens oblongo-rotundum, striatum, torosum, coloris viridiusculi; odoris suaveolentis; saporis dulciusculi cum levi aromate. Ex annua planta, in Germania copiose culta, advehitur. Eligantur femina magna matura, et stipitibus et impuritatibus liberata.

ANISUM STELLATUM. *Stierneannis.* *Sternannis.*

*Illicii anisati*, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., CAPSULAE SEMINALES, stellatae, coriaceae, fuscae, seminibus ovatis nitidis repletae, coloris e cinereo spadicei subviriduli, odoris aromatici, saporis ex subdulci aromatici; quo majores sunt magisque odoraе, eo sunt meliores.

ANTIMONIUM CRUDUM; STIBIUM; STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM. *Spidsglands.* *Spießglanz.*

Est Minera metallica ex sulphure et regulo constans, per eliquationem in vasis clausis a matrice purgata, et crySTALLIS acicularibus, nitentibus conspicua. Sit longis et splendentibus striis praeditum, et sub igne strenuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

AQUA PYRMONTANA. *Pyrmontervand.* *Pyrmontervasser.*

Est aqua medicata martialis inodora, saporis acidulo-styptici.

AQUA SEDLICENSIS V. SEIDLICENSIS. *Seidlitzervand.* *Seidlitzervasser.*

Est aqua medicata salina inodora, saporis amaricantis, salini, haud ingrati.

AQUA SELTERANA. Seltervand. Selterwasser.

Est aqua medicata alcalina, salina, vel carbonata, inodora, saporis lixiviosi haud ingrati.

AQUIFOLIUM. Christtorn; Maretorn; Skootidsel; Beened. Hülsendorn; Stechpalmen.

*Ilicis aquifolii*, Linn. Cl. IV. ord. Tetragyn., FOLIA. Frutex in sepibus silvisque Helvetiae et Europae australioris nec non Holsatiae, sub umbra aliorum arborum sponte provenit; odorem nullum, saporem adstringentem habet. Flor. Dan. Tab. 508.

ARGENTUM. Sølv. Silber.

Est metallum indigenum, album, auro levius, ductile, via sicca oxygenium respuens, in acido nitrico solubile, oxydatum cum acido muriatico connubium indissolubile contrahens. Pro parando caustico lunari cupellatum recipitur.

ARGENTUM FOLIATUM. Bladsølv.

Pro obducenda pillularum materia adhibetur.

ARGENTUM VIVUM. Vid. *Mercurius*.

ARMORACIA; RAPHANUS RUSTICANUS. Peberrod. Meerrettich.

*Cochleariae armoraciae*, Linn. Cl. XV. ord. Silicul., RADIX fusiformis, alba, succulenta, biennis, recens. Odoris fragrantis pungentis, penetrantis, oculos ferientis; saporis leniter amaricantis, dulcescentis, acris, fervidi, odori congrui. Recens fabulo servanda.

ARNICA. Bolverley; Guldblomme; Hestebloimme; Gionsockbloimme; Hestsølvie; Stoksvæve; Dlsonge. Fjallkraut; Wølferley.

*Arnicae montanae*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA. E montanis Bohemiae et Saxoniae locis allata, propter validiorem odorem alibi crescenti praefertur. Planta perennis ad altitudinem unius et dimidii aut duo-







rumi pedum excrefcens, habet folia ovata, integra et nervofa, Plantaginis inflar fuperficie utraque hirta, margine integerrimo, unde non confundenda efl cum Inula dyfenterica, cujus folia funt oblonga fubtomentofa. Saporem habet fubacrem. Flor. Dan. Tab. 63.

Ejusdem FLORES funt compofiti lutei; digitis confricati, et naribus admoti, flernutationem ciunt. Squamulae calycinae breviores funt non fetofae, apicibus purpureis. Sapor ex acri amarus.

ARSENICUM ALBUM. Kottefrucht. Raſen- oder Mäufegift.

Oxydum Arfenici album, arfenicum oxydatum: fublimando paratum maſſam refert ſcoriformem, compactam, albam, fubpellucidam, tempore opacam. In igne fumi inflar avolat, odorem alliaceum ſpargens. Odoris caeterum nullius, ſaporis vero acris urentis, inflammantis.

ARUM. Dauff Ingefer. Deutſcher Ingwer. Aron.

*Ari maculati*, Linn. Cl. XX. ord. Polyandr., RADIX perennis inaequaliter globofa aut oblonga, tuberculis hirta, compacta, et craſſitudinis pollicis. Verno tempore, antequam floret, colligatur. In locis umbroſis habitans, praeferenda illae, quae in apricis ſiccis offenditur. Per hyemem et aestatem, fabulo tecta fervetur, quotannisque recens colligatur. Recens ſapore acerrimo praedita eſt, ſiccata autem acredine fere privata et farinoſa; odoris nullius. Flor. Dan. Tab. 505.

ASA DULCIS. Vid. *Benzoë*.

ASA FOETIDA. Dyvelsdref. Stinkender Aſand; Teufelsdreck.

*Ferulae aſae foetidae*, KAEMPERO *Hingifch* dictae, Linn. Cl. V. ord. Digyn., GUMMI-RESINA, e radice fauciatâ potiſſimum elicitâ, ex Perſia Indiisque allata; Odoris foetidiffimi, tetri, ex alliaceo viroſi; ſaporis amaricantis, acris, mordentis, diutiffime inhaerentis. Sit graviffimo odore praedita, inflar cerae flexilis et lenta, plurimisque maſſulis albetibus, luteis, roſeis, murinis, amethylinis, cum ſplendore aliquo variegata.

ASARUM. Hasselurt. Hasselwurzel.

*Asari Europaei*, Linn. Cl. XI. ord. Monogyn., RADIX perennis, fibrosa, recens. Coloris est ex cinereo fusci; Odoris nardini, Valerianae aemuli, subaromatici; saporis ex amaro acris, nauseosi. Sub calidiore Germaniae coelo germinat; rarius in Daniae provinciis. Flor. Dan. Tab. 633.

Ejusdem FOLIA in dunetis et circa radices corylorum semper virentia; mensibus Majo et Junio colligenda. Odorem habent nullum: Saporem subaromaticum acrem.

ASPHALTUM; BITUMEN JUDAICUM. Jodebeeg. Jubenpech; Schlackichtes Erdpech; Asphalt.

*Bitumen* solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens, magna copia mari mortuo, rubro, et aliis Asiae australis nec non Europae lacubus Asphalticis innatans. Vulgare, in fodinis Galliae aliarumque Europae provinciarum occurrit. Accensum odoris est ingrati: cum spiritu nitri fumante efferuescit. Per destillationem hujus, Oleum Asphalti obtinetur, atro-brunneum, liquidum, in fila ductile, odoris ingrati, empyreumatici; sapore acri faucibus inhaerens.

AUGUSTURA. Vid. *Angustura*.

AURANTIA. Pomerantser. Pomeranzer.

*Citri Aurantii*, Linn. Cl. XVIII. ord. Icosandr., MALA, matura ex Europa meridionali advecta. Sunt globosa, non nihil depressa, umbilicata, externe vestiuntur cortice carnosio, interne pulpam habent membranofam, succulentam, vinosam, et seminibus subovatis sunt instructa; Odorem habent fragrantem et gratum; Saporem aromaticum ex amaro acidum. Poma aurantiorum immatura siccata, pisi magnitudinis, coloris fusci nigricantis.

Eorundem CORTICES odoris fragrantissimi; saporis grate amari. Recipiuntur tantum exteriores partes, quae flavedinis nomine distinguuntur, olei aetherei in superficie externa divites.







Eorundem FLORES, NAPHAE FLORES. Orangeblomster.  
Pomeranzblüthen.

Recentes habent odorem svavissimum, sicci fere nullum; saporem amaricantem.

Eorundem FOLIA. Pomerantsblade. Pomeranzenblätter.

Sunt ovata, appendice cordata ad basin aucta. Odorem habent manu trita grate fragrantem; saporem amarum.

AURANTIORUM CURASSAVIENSIIUM CORTICES amariores, hinc praestantiores sunt.

AXUNGIA PORCI. Swinesfidt. Schweinseschmalz; Schmeer.

Pinguedo molliuscula, depurata, alba, e mesenterio hausta. Sit recens et minime rancida.

**B**ALSAMUM CANADENSE. Vid. *Terebinthina*.

BALSAMUM COPAIVAE; BALSAMUM de COPAHU. Copaiwabalsom; Copaiwabalsam.

*Copaiferae officinalis*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., LACRYMA oleoso resinosa, ex arbore in America meridionali, praesertim in Brasilia germinante, incisione facta magna copia stillans. Praestat balsamus limpidior dilutiorque, tum consistentia liquida, tum colore flavescente, odore fragrantem et sapore non ingrato amaro linguaeque diu inhaerente praeditus, qui successu temporis tenax evadit, et consistentiam melleam adipiscitur. Rejiciatur opacus non tenax, subturbidus, fragrantem odore destitutus, cujus in fundo deprehenditur liquor aquosus turbidus. Adulteratur praesertim *Terebinthina*, oleo expresso unguinoso uti amygdalarum dulcium, nupta. Innotescit hoc partim e colore non adeo flavescente parum opaco et subglaucis, sapore non adeo amaro, et odore minus fragrantem; partim vero Balsamo ferro candenti immisso, quo odor proprius sese prodit; partim vero ex admixta Tinctura tartari vel alia alcalina, qua sincerus balsamus fere omnis solvi-

tur limpidusque evadit. Oleum amygdalarum, balsamo in spiritu vini soluto, in fundo remanet.

BALSAMUM PERUVIANUM; BALSAMUM PERUVIANUM NIGRUM. Sort peruviansk Balsom. Schwarzer peruvianischer Balsam.

*Myroxyli Peruviferi*; Linn. Cl. X. ord. Monogyn., succus oleoso resinofus arboris in America australi, maxime regno Peruviano crescentis, et e cortice, coctione in aqua, paratus. Albus enim, spontaneo exsudans stillicidio, vix ad nos pervenit. Sit e spadiceo nigricans, crassitudinis melleae, ponderosus; saporis acris, aromatici, pinguiusculi, amaricantis; odoris suavis fragrantis, e Caryophyllaceo et balsami Tolutani, Benzoini, Styracini et praesertim filiquae Vanillae odore quasi confusi, quem, etiam dispergit carbonibus aut ferro ignito inspersus; opacus, inter digitos tractus fila subtilia pellucida exhibens; frigidae aquae guttatim instillatus fundum petens; bullienti vero in pelliculam oleosam penetrantis saporis, aquae innatantem et in partem graviolem crudiolem fundum petentem, dehiscens. Chartae instillata gutta nigra manens et adhaerens, probi; rubicunda vero promptaque defluens, factitii signum esse dicitur. Oleum, interveniente cera, cum balsamo commixtum Peruviano, patefcit super lenem ignem, ubi quid balsami sinceri inest, secedit et fundum petit. Conficitur etiam balsamus spurius ex populi gemmis cum oleo secundario Benzoës digestis, qui balsamus quidem veri odorem mentitur, sed minus suavis et validus est. Alii Benzoës partes quatuor, Styracis unam, cum oleo coquunt et Asphalto tingunt; quae fraus in Alcahole Vini facile detegitur, in quo balsamus verus omnis solvitur.

BARDANA, LAPPA MAJOR. Algerborre; Algerstreppe; Storstreppe; Tordensstreppe; Lungegræs-Plunger; Rægg-Haarflæggborrer; Borre. Kletten.

*Arctii Lappae*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., RADIX perennis, ad vias et in locis ruderatis frequens, ramosa foris nigricans, intus alba, fibro-

...the ... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..





sa, saporis subdulcis, subausteri: Majo mense colligenda. Rejiciatur vetusta lignosa. Flor. Dan. Tab. 642.

BARYTA SULPHURICA. Vid. *Spathum ponderosum*.

BDELLIUM. Bdelliumgummi. Gummi Bdellium.

Arboris incognitae aut nondum descriptae in Guinea, Arabia, Media et India nascentis LACRYMA; coloris ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concreta, sapore ac odore ad Myrrham accedens. Saepius cum Myrrha in cistis permixtum reperitur. Praefertur amarum, pellucidum, dum frangitur pingue ac odoratum.

BECCABUNGA. Lemmife; Ledmye; Beshung. Bachbungen; Wasserbungen; Bachbohnen.

*Veronicae Beccabungae*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA RECENS. Caulis repens, cylindricus, glaber, succulentus, spithameus, subramosus, ramis oppositis. Folia ovata, obtusa, ferrata, utrinque glabra. Odor confusorum foliorum debilis. Sapor amaricans acriusculus, substypticus. Ad featurigines frequens. Flor. Dan. Tab. 511.

BELLADONNA; SOLANUM FURIOSUM. Natsskade. Nachtschatten; Tollbeeren; Wollstirischen.

*Atropae Belladonnae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA. In hortis culta, Austriac et Angliae indigena, cum cautela seorsim siccanda, cavendo, ne quid ejus aliis herbis admisceatur; saporis et odoris est fere oleracei. Proveniunt pariter in Falstria, et mense Junio colligantur. RADIX sublignosa, ramosa, geniculata, e cinereo flavescens. Flor. Dan. Tab. 758.

BENZOË; ASA DULCIS; GUMMI BENZOËS. Benjoë. Benzoe.

*Styracis Benzoës*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., RESINA, ex Indiis allata, fere opaca, facile fragilis; odor fragrans gratusque, inprimis si accendatur; prunis impositum liquefcens; inter dentes friabilis, in ore autem non solubilis; saporis subdulcis, resinosi et balsamici. Quo magis abundat massulis albican-



tibus flavescentibus, amygdaloides tunc dicta, eo est praestantior. Rejiciatur fusca impura.

BERBERIS. Berberisbær. Berberisbeeren.

*Berberidis vulgaris*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., BACCAE. Frutex albescentis ad fepes in sylvis crescens, inque hortis colitur. Baccae sunt coloris pulchre rubri, odoris expertes; saporis grate acidi, subadstringentis; pro gelatina aut syrupo colligendae. Flor. Dan. Tab. 904.

Earundem succus ruber, qui colatione clarior fit non tamen limpidus, et gratia succo citri aut Tamarindorum similis est, et postquam crystallorum forma sal essentielle tartari excussit, acidum tamen acre servat. Prelo e stanno puro confecto exprimatur, et per plures annos in ampullis, oleo olivarum superaddito fervetur.

BERGAMOTTAE OLEUM; CORTICUM AURANTIORUM OLEUM. Bergamot-Olie. Bergamoth-Öel.

*Citri medicae* e specie Bergamotta dicta, expressione obtentum OLEUM essenziale ex Italia advectum, subpellucidum, flavescentis, odoris et saporis corticum ficcatorum.

BETULAE SUCCUS. Birkesaft. Birkenwasser.

*Betulae albae*, Linn. Cl. XXI. ord. Tetandr., LIQUOR, e vulnerato trunco aut ramis sponte stillans. Eliciatum verno tempore antequam frondeat arbor, et studiose vitris inditus, superfuso pauxillo olei olivarum, contra aëris accessum defendatur.

Ejusdem CORTEX ab epidermide alba sericea liberatus, fit brunneus, subconvolutus, vix lineae crassitudinis, fragilis, fractura inaequali, non fibrosus; odoris debilis; saporis styptici subbalsamici.

BETULINUM OLEUM; OLEUM RUSCI; OLEUM BRUSCI. Birkeolie. Schwarzer Degen; Birkentheer.

*Betulae albae* e cortice exusto per descensum destillans OLEUM empyreumaticum, e Lithuania maximam partem allatum, corium bubulum Russi-





cum (Süßten) redolens; quo odore dignoscitur a supposito, e cortice juniperi aliisque destillato.

BISMALVA. Vid. *Althea*.

BISMUTHUM; MARCASITA. Bismut. Wismuth.

Metallum perquam fragile, ex albo subrubicundum, lamellis compositum, leni igni admoto liquefcens, fortiori vero in vase clauso avolans. Acido nitrico nuptum, per aquam sub forma oxydi albi praecipitatur.

BITUMEN JUDAICUM. Vid. *Asphaltum*.

BOLUS ARMENA. Armenisch Bolus. Armenischer Bolus.

Argillae pinguis species, coloris rubri vena lutea interflincti, durioris compagis ac communes terrae bolares, prompte linguae adhaerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae et Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

BORAX VENETA; CHRYSOCOLLA. Borax. Borax; Borras.

Borax; Tincal; Asiae sal nativum e Natro et acido boracico constans, peracta depuratione et crystallisatione nomine boracis insignitur. Eligatur borax alba, e parvis transparentibus massulis constans, in igne spumescens, facile fluens et vitrescens; saporis est lixiviosi.

BOVISTA; CREPITUS LUPI. Ulvesiis; Fiißop. Bovist.

*Lycoperdon Bovista*, Linn. Cl. XXIV. ord. Fung., sub cute externa membranacea parenchyma exhibens leve, spongiosum, admodum molle, pulverulentum. In campis ericetosis pullulat.

BRYONIA. Galdebær; Hundebær. Gichtrübe; Zannrübe.

*Bryoniae albae*, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenef., RADIX fusiformis, pedalis et ultra, saepe ramosa; albido-pallens, transversaliter rugosa, carnosa, lactescens, decorticatione in taleolos transversos dissecta et sicca, pallida est annulata atque radiata. Odor nauseosus; sapor nauseosus, acriusculus, substypticus, recentis vero debilior. Flor. Dan. Tab. 813.

BUGLOSSUM. Vid. *Alkanna rubra*.



**CACAO.** *Cacaobonner.* *Cacaobohnen; Chocoladefrucht.*

*Theobroma Cacao*, Linn. Cl. XVIII. ord. Pentandr., FRUCTUS. Arbuscula in Americae meridionalis locis depressis umbrosis culta. Semina oleoso farinacea, e fusco nigricantia, feminibus Viciae Fabae similia. Odorem vix ullum habent; saporem gratum oleosum, leniter subadstringentem amaricantem.

**CAJEPUT OLEUM.** *Cajaput=Olje.* *Cajaput=Del.*

*Melaleuca Leucadendri*, Linn. Cl. XVIII. ord. Polyandr., OLEUM essenziale pellucidum, coloris laete virentis, ex insulis Moluccis, Malabaria et Banda allatum. Odoris camphoracei cum aliqua odoris terebinthinacci miscela, minori copia valde grati; saporis aromatici, momento contactus, linguae sensum frigoris imprimantis.

**CALAMINARIS LAPIS; CADMIA.** *Galmei.* *Gallmey.*

*Zinci* minera terrea, coloris flavescens vel fusci, circa Aquisgranum nec non in Anglia et Polonia e terra cruta. Praestat ruber.

**CALAMUS AROMATICUS; ACORUS VERUS.** *Calmus.* *Calamus; Ackerwurz.*

*Acori calami*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RADIX. Perennis, in paludosis et aquis stagnantibus luxurians; longa, obliqua, crebro geniculata, digitum crassa, ex flavo rufescens, intus alba et fungosa. Saporis acris et aromatici; odoris fragrantis.

**CALX.** *Kalk.* *Kalz.*

Paratur e lapidibus et terris calcareis, e conchis marinis et ostrearum calcinatis. Odor nullus; sapor causticus. E testis ostrearum paratus praefertur.

**CAMPESCANUM f. CAMPESCENSE LIGNUM.** *Kampesfe=træet.* *Kampeschenholz.*

*Haematoxyli Campescani*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., LIGNUM arboris in America calidiori, ad sinum Campefce regni Mexicani copiose crescen-







tis, durum admodum et compactum, coloris rubri, odoris vix ullius; saporis dulcis amaricantis, leniter adstringentis.

CAMPHORA. Campher. Kampher.

*Lauri camphoriferae* aliusque arboris ignotae, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., CONCRETUM resinoso oleosum volatile, in glebis deformibus sordidis e Japonia et Java per Batavos allatum, et ab iisdem, nova uti videtur sublimatione ope calcis vivae per se extinctae ac dilapsae, depuratum, et in panes seu massas orbiculares infra concavas, coactum. Odorem habet fragrantissimum, penetrantem, ad Rosmarinum accedentem; saporem calidissimum Menthae Piperitidis aemulum, amaricantem, linguam faucesque penetrantem. Optima nivea et glaciei instar est, subdiaphana; super ignem liquata olei instar fluit, et accensa deflagrat omnis. Quum ocyssime in auras avolet, vesicae ope ab aëris accessu custodienda est.

CANCROCORUM LAPIDES. Krebssteine; Krebssteine. Krebssteine; Krebsaugen.

*Cancro Aflaci* Concrementa calcarea, e lamellis sibi superincumbentibus vel striis composita, ventriculo accreta, umbilicata, qua nota ab adulteratis dignoscuntur.

CANELLA ALBA. Hvid Kaneel. Weißer Zimmet.

*Winteranae canellae*, Linn. Cl. XI. ord. Monogyn., CORTEX. Arbor Indiae occidentalis in Jamaica frequens. Cortex in superficie externa passim vel ex albo flavescens, vel virescens, vel ex fusco rubens, subtus autem albicans. Saporis acriusculi et aromatici.

CANNABIS. Hamp. Hanf.

*Cannabis sativae*, Linn. Cl. XXI. ord. Pentandr., SEMEN. Planta annua colitur ubique in agris. Semina sunt rotunda glabra, oleoso mucilaginosa. Vix ullum odorem habent; saporem subfatuum.

CANTHARIDES. Spanische Fluer. Spanische Fliegen.

*Meloë vesicatorius* Linn. sive *Lytta vesicatoria* Fabricii, in regionibus

calidioribus, Hispania, Gallia, Germania, etc. abundans; oblonga, e viridi splendens, antennis nigris filiformibus, mense Junio et Julio, dum Fraxinum, Ligustrum, Populum albam, Sambucum, quas praecipue amat, gregarie depascuit, colligatur et leviter siccetur. Praeferuntur minores, non ultra perpauca grana ponderantes, recentes, integrae non pulverulentae. Odor et sapor nauseosus teterrimus et piceus est.

CAOUTCHOU. Vid. *Resina elastica*.

CARDAMINES; NASTURTIUM PRATENSE. Engelfasse; Bildfasse; Giögeblomster. Gauchblumen; Wiesenkresse.

*Cardamines pratensis*, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., HERBA RECENS et FLORES. Caulis erectus, subsimplex, glaber. Folia pinnata cum foliolis subrotundis, subcarnosa. Corolla cruciformis, petalis obovatis, retusis, albidis vel dilute violaceis; unguibus sublutefcentibus, longitudinis calycis. Odor debilis; sapor subamarus, leviter acriusculus. In pascuis vere colligenda. Flor. Dan. Tab. 1039.

CARABE. Vid. *Succinum*.

CARDAMOMUM MINUS. Cardamommer. Kardamemen; Kleine Kardamomen.

*Anomi Cardamomi*, Linn. Cl. I. ord. Monogyn., FOLLICULI ventricosi, triloculares, continentes semina angulata e subrufo fusca si recentia sint, quae praefenda: temporis mora vero e cinereo ferruginea, multum aromatica, notabilis Camphorae odoris. Planta perennis palustris, Indiae orientalis.

CARDUUS BENEDICTUS. Corbendist. Cardobenedicten.

*Centaureae benedictae*, Linn. Cl. XIX. ord. Syngenes., HERBA in hortis culta, colligenda quo tempore flores protrudere coepit. Odor ingratus, qui in siccata herba facile perit; sapor intense amarus.

CAREX ARENARIA; GRAMEN RUBRUM. Stor Græsrod; Sandvedgræs. Große Graswurzel.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1919. The names are listed in alphabetical order of their last names.



...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

*Caricis arenariae*, Linn. Cl. XXI. ord. Triandr., RADIX, in arenosis locis copiose occurrens. Tritici repentis radici quoad nodos et genua similis, sed minus glabra et instar Sarsaparillae facile fissilis, coloris externe fusci, interne albi. Odoris fere terebinthinacei et saporis dulcescentis.

CARICA; FICUS. Feigen. Feigen.

*Ficus caricae*, Linn. Cl. XXIII. ord. Trioec., RECEPTACULUM fructificationis arboris Europae meridionalis et orientalis. Thalami sunt incrassati succulenti, principio saccharino et mucilaginoso imbuti. Eligantur pingues i. e. recentes, ponderosae, molles, grandes, torosae parenchymate melleo tenaci flavo; feminibus flavis turgentes. Rejiciantur nigrae, durae, fordibus verminosis inquinatae.

CARVUM. Rummen; Danst Rummen; Karve; Karvi. Feldkümmel.

*Cari carvi*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN parvum striatum, oblongum, tenue, fuscum, paululum incurvum, odoris aromatici subgraviusculi; saporis aromatici calidi, fatis grati. Habetur planta in Europa boreali in pratis. Flor. Dan. Tab. 1091.

CARYOPHYLLATA; GEUM URBANUM. Nesselferod. Nesselwurzel; Benediktenwurzel.

*Gei urbani*, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., RADIX fibrosa, subrufa; odoris et saporis aromatici caryophyllacei, coloris intus carmosini. In sylvis et umbrosis habitat. Mense Aprili et Majo effossa, probe custodiatur. Flor. Dan. Tab. 672.

CARYOPHYLLI AROMATICI. Nesselfer. Würznäseln; Gewürznelken.

*Caryophylli aromatici*, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., f. *Eugeniae caryophyllatae* Thunbergii, FLORUM CALYCES cum flore nondum expanso, qui claviculis forma similes, prius fumò per aliquot dies expositi, deinde sole siccantur. Dum caryophylli ad maturitatem usque in arbore relin-

quantur, *Antophylli* dicuntur. Arbusculum sponte crescit in nova Guinea et in insulis Moluccis. Caryophylli leniter siccati e fusco nigricant, et odorem habent fragrantissimum, qualem flores Dianthi caryophylli; saporem vero aromaticum fortem, calidum, acriusculum, subamaricantem, fauces linguamque calefacientem, halitu forti et grato. Eligantur egregie fusci, grandes, ponderosi, e quibus ungue pressis olei aetherei quid exfudat.

CASCARILLA; ELEUTHERIUM. *Cascarilla.* *Kassarille;* *Kassarillerinde.*

*Crotonis Cascarillae*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., vel *Clutiae Eluteriae*, Linn. Cl. XXII. ord. Gynandr., CORTEX ex America e calidis ejus regionibus allatus. Coloris extus cinerei, intus e ferrugineo fusci, quem etiam comminutus servat: fragilis. Odoris inprimis accensi, gratissime fragrantis; saporis amari multum aromatici. Praestat ponderosus, defractus particulis resinosis splendens, et si accensus fuerit fumum moschatum temulentum edens.

CASSIA FISTULA. *Cassie.* *Kassia.*

*Cassiae Fistulae*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., SILIQUA arboris Arabiae et utriusque Indiae; nigrieans, teres, cylindracea, cubitalis, sub putamine lignoso nigro interne dissepimentis transversis interstincto, continens semina compressa, fulva, et pulpam subdulcem, nigredinis splendentis. Seligatur recens ponderosa, a scarabaeis non exesa, concussa sonum a feminibus non edens, medulla dulci scatens, non valde acida aut amariuscula, neque odorem spargens mucidum. Indica, quae vere efficax est, rarissime ad nos pervenit. Accedit ad eam Alexandria, vilior est Americana, in Americae insulis luxurians. Prior cortice laevi, tenuiore, obscurioris coloris tecta, pulpam continet dulciorem, parum nauseosam. Posterior externe rugosa, aspera, crassior, pulpam sovet acidam magis, et nauseosam. Quidam e deteriore Cassiae specie pulpam melle syrupisque conditam extrahunt, sub floris Cassiae nomine, quae vero mora temporis, mucorem et acredinem noxiam contrahit.

CASTOREUM. *Bævergeel.* *Biebergeil.*







*Castoris, Fiber dicti*, Linn. Cl. I. ord. Glires, FOLLICULI juxta anum et utrumque latus uretrae, prope praeputium haerentes, in quibus fecernitur humor pinguis, oleaginosus, sebaceus. Inde exempti infumatione contra corruptionem defensi, substantiam fuscā siccā, sed non acidā (quae semper rejicienda est) continent. Aestumatur Dantiscanum, Prussicum, Polonicum, Germanicum, durum, ponderosum, rufum, in faccis majoribus ovi magnitudinem aequantibus, tenuibus membranulis intermixtum. Odoris penetrantis ingrati; saporis amari subnauseosi. Inferioris quidem notae sed satis bonum est Castoreum Russicum, ut et Anglicum ex America septentrionali allatum, siccius, minus fortioris odoris, minoribus magisque nigris contentum facculis, qui tunicae cellulosae tenaciori interjacent. Saepe etiam corrumpitur Ammoniaco, Sagapeno, Arenis, Melle; odore et sapore fraus detegitur.

CATAPUTIA MAJOR; RICINUS VULGARIS. *Purgeerhorn.*  
*Purgierkörner; Wunderbaumsamen.*

*Ricini communis*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., SEMEN, ovalis figurae quodammodo compressum, fabae minoris magnitudinis; coloris albi et cinerei, ex nigro variegati, sub putamine tenui nucleum condens album; saporis acris, urentis, quae acrimonia tamen haeret in putamine, non autem in nucleo; odoris nullius. In hortis colitur, ac sponte in India utraque provenit. Ex seminibus a putamine purgatis, per expressionem, Oleum Ricini obtinetur.

CATECHU TERRA; CATECHU; TERRA JAPONICA. *Jap. Jap. Jord. Catechu.*

*Arecae Catechu?* Linn. e palmarum familia; *Pinanga* Rumphio dicta, vel *Mimosa Catechu*, Linn. Cl. XXIII. ord. Monoic. succus inspissatus, si ex drupis arboris primae speciei, vel extractum aquosum, si ex ligno frequentis speciei obtinetur. Utraque arbor copiose crescit in India orientali. Optimum Catechu sed rarum, coloris est spadicei, purissimum, lamellatim dispositum, lenissime adstringentis primum, deinde subdulcis gratique saporis. Vulgare bonae notae Catechu, coloris est e badio nigri, intus pauxillum

laetioris et cum splendore nitidi; saporis non ingrate adstringentis, totumque in ore deliquescit nullis relictis faecibus. Nigrum adustum, cum nidore ingrate fapidum et acerbum, recrementis terreis spurcatum, in aqua non omne solubile, rejiciatur.

CENTAURIUM MINUS. Tusindgylde; Algerum. Tausendgylde.

*Gentianae Centaurii*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., COMA florens in apricis praesertim maritimis proveniens, floribus rubentibus: odoris fere nullius, saporis amarissimi, mense Julio et Augusto colligenda. Flor. Dan. Tab. 617.

Cepa. Log. Zwiebeln.

*Allii Cepae*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RADIX bulbosa tunicata. Planta perennis in hortis culta. Odoris fragrantis, alliacci, graveolentis; saporis subdulcescentis, acris. Radix conscissa oculos ferit volatili suo principio.

Cera. Bex. Wachs.

*Apis melliferae* e florum staminibus et nectariis collecta et elaborata SUBSTANTIA GLUTINOSA, ex favis, expresso prius omni melle, igne liquatis, adjecta aqua lotis et in panes fufis, parata, sub Cerae flavae nomine: quae repetita ad ignem fusione purificata, lota, aëre, sale aliisque artificiis dealbata, Ceram albam exhibet.

CERASA ACIDA. Sure Kirsebær. Saure Kirschen.

*Pruni Cerasi*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., FRUCTUS. Arbor in hortis frequentissima. Drupa rubosa, rubra, carne valde acida, succo sanguineo: odoris nullius; saporis dulcis acidi. Non modo ex recentibus, sed etiam e ficcatis succus exprimitur. Cerasorum nuclei aquae destillandae inserviunt.

CERUSSA ALBA; PLUMBUM CARBONICUM. Bleghvidt. Bleynweis.

E plumbo vaporibus vegetabilium acidorum exposito aut iisdem soluto, paratur. Sit ponderosa, alba et gustu dulcis. Habet lamellas friabiles,





quae est sincerrima, et praefertur illae, quae sub forma panum conicorum charta involutorum prostat, quaeque dicitur Veneta vel Belgica. Odoris est cretacei et saporis adstringentis.

CETI SPERMA. *Hvalraff. Walrath.*

*Physteris Macrocephali*, Linn. Cl. I. ord. Ceti; e ventriculis cerebri Liquor unctuosus, coctione aridus redditus. Eligatur album dulce, recens, sebaceum, solidum, fragile, nitidum, lubricum, tenerum, mole quasi e parvis fursuraceis squamulis aggregata, in spiritu vini calido solubile, tactu pingue. Odorem habet debiliorem, piscinum, minus ingratum; saporem oleosum subdulcem non ingratum. Eligatur albissimum, tenue, semipellucidum, lubricum, in oleo facillime liquefscens. Rejiciatur flavum, rancidi saporis et odoris, et cera adulteratum, quod lixivio caustico ad saponis speciem coctum, dein in aqua rursus solutum, ceram deponit insolubilem. In lagena clausa servandum, ne rancidum evadat.

CHAMOMILLA ROMANA. *Romerske Cameelblomster. Römishe Camillen.*

*Anthemidor nobilis*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., FLORES, five simplices, five pleni in hortis provenientes. Odoris fragrantis, balsamici, grati; saporis aromatico-amaricantis, calidiusculi.

CHAMOMILLA VULGARIS. *Cameelblomster; Cameelblom; Munkeskone. Camillen.*

*Matricariae Chamomillae et suaveolentis*, Linn. Cl. XXI. ord. Polygam. superfl., FLORES. Plantae annuae in agris cultis crescentes, mense Julio colligendi, qui a cotulae foetidae floribus dignoscuntur, tum odore, tum paleis fetaceis in cotulae receptaculo reperiundis. Odor florum fragrans, gratus, fortis; sapor amarus calidiusculus.

CHAEREFOLIUM; CHEROPHYLLUM. *Korbel. Körbel; Kerbel.*

*Scandicis Ceresolii*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., HERBA annua in hortis



omni, qua fieri potest, tempestate colenda, sicca etiam fervanda. Odor recentis gratus, balsamicus, debilis nisi fricetur; sapor balsamico-aromaticus ad foeniculum accedens.

CHELIDONIUM VULGARE MAJUS. Store Svaleurt; Se-  
lidon. Groß Schellkraut.

*Chelidonii majoris*, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., RADIX perennis fibro-  
sa, miniati coloris, succo croceo intensiori turgens. Planta perennis locis  
rudcratis, umbrosis et ad sepes copiosissima. Odoris graviusculi; saporis  
acris, subamaricantis, inhaerentis. Flor. Dan. Tab. 542.

Ejusdem HERBA recens cum radice.

CHINA PONDEROSA; CHINA. Chinarod. Chinawurzel.

*Smilacis Chinae*, Linn. Cl. XXII. ord. Hexagyn., RADIX nodosa ex In-  
diis advecta, ponderosa, solida, firma, difficulter scissilis, pallide rubens, ten-  
tata digitum, manducata linguam pinguedinis aliquo sensu afficiens; prac-  
fertur occidentali seu Americanae, quae coloris est obscurioris et medullae  
spongiosioris ponderisque minoris. Haec uti et radices cariosae, quorum  
foramina rubris terris bolaribus vel Lithargyrio replentur, merito ex mate-  
ria pharmaceutica excluduntur.

CHRYSOCOLLA. Vid. *Borax*.

CICORIUM. Bægartrod. Wegwartwurzel; Hindlaufwurzel.

*Cichorii Intybi*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., RADIX biennis,  
raïnosa, pedem longa, pollicem crassa, obliqua et fibrosa, succo lactescen-  
te turgida, verno tempore colligenda. Sapor grate amaricans; odor radicis  
recentis nullus; lignosa et ingrate amara rejiciatur. Sponte crescens hor-  
tensi praefenda. Flor. Dan. Tab. 907.

CICUTA AQUATICA. Bandpastinak; Selbnape; Spreng-  
rod. Wasserschierling; Wüterich.

*Cicutae virosae*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., HERBA in paludibus et ad  
margines lacuum proveniens, mense Junio ante florescentiam colligenda; fo-





lia composita, pinnulae omnes longae, lanceolatae, argute ferratae. Odor foliorum contusorum recentium gravis, in apium graveolens incidens; sapor fere Petroselini haud ingratus; siccae debilior. Flor. Dan. Tab. 208.

CICUTA TERRESTRIS. Sfarntyde. Schierling.

*Conti maculati*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., HERBA in agris ruderatis crescens, mense Junio et Julio antequam flores protrudit, colligenda, caule laevi, glabro, maculato, foliis obscure viridibus, singularis foetoris, a reliquis Cicutae speciebus distinguenda. Pro emplastro conficiendo, merito a Linnaeo praefertur Cicuta virosa seu aquatica Wepseri. Odor foetidus murinus: deficiente hoc odore, planta ut inefficax rejicienda est; sapor leniter aromaticus subnauseosus.

CINA; SANTONICUM. Ormesroe. Wurmsaamen; Zitwersaamen; Severfaat.

*Artemisiae Judaicae et Artemisiae Santonicae*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., SEMEN. Planta perennis Palaestinae et Arabiae. Rejiciatur impurum, discolor, et longiore feminum specie intermixtum. Sit e gilvo viridescens, crasse granulatum; saporis acris amaricantis; odoris Zedoariae validi. Saepius adulteratum est, unde illi forte non errant, qui partem non vera femina referentem, abjicere curant.

CINNAMOMUM. Raneel. Zimmet; Canel.

*Lauri Cinnamomi*, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., CORTEX interior. Laudantur cortices tenelli, tenues, longi, cannulati: coloris e croceo lacte fulvi, fragrantis; saporis acris aromatici, cum multa dulcedine, parco adstrictionis sensu. Arbor quoad corticem praestantissima, in Ceilone habitat. CLAVELLI CINNAMOMI sunt germina fusca, colore Caryophyllorum aromaticorum profundiore tincta, pedunculo concolori oblongo sensim crassiori striato infidentia, rotunda, calyce sexfido: laciniis striatis ad germen adeo incumbentibus, ut ejus nonnisi apex brevissimo stylo pateat, praedita, odore et sapore Corticis Cinnamomi sed debiliore. Qui inodori et insipidi, rejiciantur.



## CINERES CLAVELLATI seu KALI CARBONATUM CRUDUM.

Potasse. Potasche.

Est Sal alcalinum vegetabile, fixum impurum, e crematis arboribus durioribus, Fagis imprimis paratum, Kali sulphurico, Kali muriatico et partibus terreis inquinatum. Quare nova in aqua frigida solutione, filtratione et exsiccatione, ad Kali purum obtinendum indiget. Germanici cineres, quo puriores sunt, magisque albentes levesque, (Perlasche vocant) eo purius largiuntur Kali. Ad mechanicos vero usus præstant cineres Russici, in massis grandibus duris, obscurioris coloris, non facile humidum ex aëre attrahentibus allati, ob interpolata inter cremandum segmenta abiegena, acido vegetabili scatentes, et re vera diversum a vero Kali sal exhibentes. Odorem habet nullum, saporem lixiviosum. De Kali carbonico depurato inter præparata suo loco dicitur.

CITRULLUS. Angurier; Bandmeloner. Angurien; Wassermelonen.

*Cucurbitae citrulli*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., in hortis cultae, SEMEN recens non rancidum. Cucurbitinis sunt similia, nisi quod extus sint atra.

CITRUM. Citron. Citron.

*Citri medicae*, Linn. Cl. XVIII. ord. Icosandr., MALUM; ex quo caro seu pulpa. Arbor in Media et Persia spontanea est, copiose crescit in Italia, Hispania et Lusitania. Eligantur majores, cortice tenui vestiti et ponderosiores, recens siccati cortices citrini, non virides, nec fusci vel situ corrupti. Odor flavedinis recentis fragrans, gratissimus; sapor aromaticus calidiusculus, subamarus. Succus intense acidus purus.

Eorundem succus recens expressus. Saporis acidi grati; cum Kali puro saturatus succus citri, terram præcipitat calcaream, in majori quantitate succi citri iterum solubilem, qua indole ab omnibus aliis acidis distinguendus. Aceto adulteratus, saturatione cum Kali in sal neutrum mutatus, ex







instillatione aliquot guttularum, odorem spargit aceti; Kali sulphuricum praecipitatur, si acidi sulphurici, Kali tartaricum vero, si acidi tartarici ei aliquid admixtum fuerit; sal neutrum e liquoris evaporatione obtentum prunis superpositum, detonando acidum nitricum enunciat; solutum vero si argento nitrico praecipitetur, acidum muriaticum prodit. Genuini et fortis succi citri drachmae duodecim Kali drachma una perfecte saturantur. Methodum acidum citri purum ac crystallisatum praeparandi vide inter praeparata. Exprimitur succus in officinis ipsis, plerumque vero e locis, quae citris abundant, v. c. ex Sicilia et ex India transmittitur. Corruptelae valde obnoxius est, quam ad praecavendam, succus per chartam bibulam filtratus, in vasis vitreis longi et angusti colli probe repletis et arcte clausis, in cella fervetur; adhaerescens vero per moram suberi cuticula, sedulo et caute separatur, ab omni agitatione ne sedimentum ascendat, sollicito caveatur.

Eorundem CORTICES in usum trahuntur tam recentes quam siccati, amborum vero solummodo exterior flava pars, ab interna fungosa alba liberata, quae in pharmacopoliis sub nomine Flavedinis corticum citri afferatur. Cortices citri siccati et in frusta dissecati ovato-accuminata, extus coloris profunde lutei, intus substantia fungosa albicante adhuc inducti, plerumque ex Italia et Sicilia afferuntur, fragrantia recentiorum et sapore aromatico privati. Eligantur saporis subamari calidi, nec obsoleti nec situ corrupti.

Eorundem e fructibus OLEUM ESSENTIALE, expressione aut destillatione, aut extemporaneo affricu Sacchari albi paratum, Essentia seu *oleum de Cedro* dictum; sit flavum pellucidum, graveolens non turbidum.

CLAVELLI CINNAMOMI. Vid. *Cinnamomum*.

COCCINELLA. Carmosinorm; Cuzzinel. Koechenille.

In *Cocco cacti* coccinelliferi collecta Insecta, certa Encheiresi in grana abeuntia. Advehuntur e nova Hispania et regno Mexicano. Sint integra, granulata, externe albicantia, trita vero purpurea, ponderosa. Saporis sunt acris, amaricantis, adstringentis.

COCHLEARIA. Skeeurt; Strandskceurt; Skiorbugsur; Cochlearia; Finmarkesaal; Stort Griskgræs. Røffelkraut.

*Cochleariae officinalis*, Linn. Cl. XIV. ord. Silicul., HERBA annua, ad littora maritima Europae borealis frequens, quoque in hortis culta. Herba florens, principio acri volatili praedita. Odor subnasturcinus, debilis; sapor amaricans, os et fauces mordens. Flor. Dan. Tab. 135.

COLCHICUM AUTUMNALE. Nøgne Bomfrue. Zeitslose; Lustblumen.

*Colchici autumnalis*, Linn. Cl. VI. ord. Trigyn., RADIX substantiae geminae, tuberosa carnosae, quarum una exterior sterilis est et marcescens, altera intra priorem latens, in fibras porrigitur. In pratis humidioribus reperitur. Odor recentis tempore aestivo hircinus; sapor acris.

COLLA PISCIIUM. Vid. *Ichthyocolla*.

COLOCYNTHIDES. Coloquinder. Coloquinten.

*Cucumeris Colocynthidis*, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenes., POMAE ex Oriente allatae, candidae, leviae, fungosae, peramarae, integrae, acriusculae; odoris debilis nauseosi, cortice duro ex albo luteo cincta.

COLOPHONIUM. Vid. *Terebinthina*.

COLUMBO. Columbo. Columbo.

Columbae seu Columbo RADIX. Habitat in continenti Asiae versus Ceilonam. Odor frictae radiceis aromaticus est; sapor ingrate amarus, modice pungens.

CORIANDRUM. Coriander. Coriander.

*Coriandri sativi*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN, recens rotundum, ponderosum; odoris grati quando jam sicca sunt; saporis perinde grati aromatici. Rejiciatur leve, pulverulentum, a vermiculis exesum. Planta Italiae inquilina in hortis colitur.

CORNU CERVI. Hjortetasse. Hirschhorn.

Cervi Elephas cornu.







CORTEX CARIBAEUS. Caraibifſe Chinabarſ. Caraibiſche Stinde; Jamaicanifche China.

*Cinchonae Caribaeae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., CORTEX in fruſſis variae magnitudinis et craſſitiei ex inſulis Caribaeis allatus; optimus convolutus, craſſitudine unguis, externe cinereo - olivaceus, Lichenibus cinereo-albidis maculatus, interne laevis, rubro vel fuſco-brunneus, fractura laevis. Odor debilis; ſapor amarus, acris, ſubnauſeoſus.

CORTEX PERUVIANUS; CHINCHINAE CORTEX. Sina; Sinabarſ. Chinarinde; Sieberrinde.

*Cinchonae officinalis*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., CORTEX ex America australi advectus. Varias dantur ſpecies: e rubro ferruginea (*Cascarilla colorata*): e Cinnamomeo ruſa (*Cascarilla amarylla*): alba, craſſa, fungoſa (*Cascarilla blanda*): externe denique alba, intus cinnamomea, quae viliffima ſpecies frigidiori ſub coelo germinat (*Cascarilla criſpilla*). Utraeque priores adhibeantur, rejiciantur vero duae poſteriores. In ſelectu autem cauiffime verſandum eſt. Sapor ſit amarus cum adſtrictione aliqua diu linguae inhaerente, inprimis vero ſapore ſuo ſpecifico mucido ſe diſtinguat; non ſit parum ſapidus, neque ſaporis viſcidi, neque impenſe ſtypticus et nauſeoſe amarus, uti occurrit in ſpecie viliori, aliarum arborum corticibus remixta, et ſubinde Aloës ſolutione imbuta. Odor ſit paulum aromaticus, ſpecificè mucidus, quem notabilem exhibet affuſa pulveri aqua bulliens. Non vero nullus ſit, neque putridus nauſeoſus odor, quem ſpargit haud rite ſiccatus, aut in navi madefactus et corruptus cortex. Tenuis ſit, certe craſſitudinis mediae, gravis tamen pro voluminis ratione. Neque laevis ſit facies externa et quaſi polita, ſed ſcabra, ſubfuſca, et Lichene albo cinereo hinc inde obducta; non nigra, qui corrupti corticis color, neque pallide flava, qui *Blancae* et *Criſpillae* eſſe ſolet; neque laete rutilans, cujuſmodi de aliis arboribus deglubitur. Internus color ſit paucillum Cinnamomo obſcurior, magisque obſoletus aut ferrugineus. Digito tentatus non tenax ſit aut fungo-

fus, neque in fibras lignosas decerptus, aut in farinam cariosam deliſcens; ſed compactus ſit, aequaliter fragilis, et ad ſolem moleculis micantibus reſplendeat. Decoctum corticis aquoſum adhuc calidum, vitro inditum ruſceſcat, frigefactum vero palleſcat. Lignum cortici forte adhaerens ſtudioſe ſeparandum eſt. Qui in pulvere aliunde advehitur, propter admixtas particulas lignoſas fibroſas pilorum inſar, ſuſpectus rejiciatur.

CORTEX PERUVIANUS FLAVUS; CORTEX PERUVIANUS REGIUS; CORTEX CHINCHINAE FLAVUS ſ. REGIUS. Gaul Chinabarſ; Rongens Chinabarſ. Gelbe Chinarinde; Königs Chinarinde.

Cortex Cinchonae, ſpeciei nondum ſatis definitae. Cortex ex eadem regione ut prior allatus, craſſior et magis lignoſus, qui colore cinnamomeo et principio amaro ſubaromatico, omnibus aliis Cinchonae corticibus antecellit.

CORTEX PERUVIANUS RUBER; CORTEX CHINCHINAE RUBRAE. Red Chinabarſ. Rothe Chinarinde.

Ex truncis et ramis craſſioribus ejusdem arboris, quae corticem vulgarem erogat, detrahitur. Saporis eſt magis adſtringentis ac aliae ſpecies. Principio reſinoſo et adſtringente prae caeteris Cinchonae corticibus eminet.

CREMOR TARTARI. Vid. *Tartarus vini*.

CREPITUS LUPI. Vid. *Boviſla*.

CRETA ALBA. Hvid Kride. Weiße Kreide.

*Terra macra*, Linn. Cl. III. ord. Fossil., alcalina, in Siaelandia noſtra reperitur. Praeſtantiſſima alba, levis, non arenosa, heterogeneis libera, ex inſula Moen adfertur. Odore gaudet nullo; ſapore terreo.

CROCUS. Safran. Saffran.

*Croci ſativi officinalis, varietas autumnalis*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., PISTILLORUM STIGMATA. Praeſtat Crocus Anglicus in maſſas orbiculares preſſione coactus, itemque Hiſpanicus. Plerumque vero Gallicus e provincia Gaſſinois, aut Auſtriacus ad nos pervenit. Sit coloris aurantii, recens,

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...



neque marcidus tactu neque humidus; sed tenax, mollis, pinguis, digitum tamen oleo non inquinans, sequax, ejusdem intus ac extus coloris: saporis amariusculi; odoris gravis, circumquaque se defundentis, insignis ratione voluminis levitatis. Adulteratur imprimis gallicus, flore Carthami tinctorii, qui colore dilutius luteo facile dignoscitur. Qui mucidi odoris est, rejiciatur.

CRYSTALLI TARTARI. Vid. *Tartarus vini*.

CUBEBAE. Cubeber. Cubeben; Schwindelsérner.

*Piperis caudati* Bërg., Linn. Cl. II. ord. Trigyn., FRUCTUS. Baccae subrotundae, fuscae, plicis elevatis reticulatae, magnitudinis feminis Pisi, pedunculatae; parenchymate albido, oleoso. Odor fragrans; sapor aromaticus, acris, dein in ore et faucibus calidus. Ex Java et aliis regionibus Indiae orientalis adfertur.

CUCUMIS. Agurf. Gurke.

*Cucumeris sativi*, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenef., FRUCTUS. Pomum viride, cylindricum vel ovatum, subincurvum, torulosum: toribus inaequalibus subaculeatis. Parenchyma carnosum-fucculentum, albido-virescens. SEMINA MATURA ovato-oblonga utrinque obtusa, compressa albido-pallescentia. Odor pomi crudi subfatuus proprius, feminum nullus. Sapor pomi, odori congruus, subdulcescens, feminum amygdalinus.

CUPRUM; AES. Robber. Kupfer.

Est purum ex solutione cupri sulphurici obtentum. Odorem habet proprium, si manu teratur; saporem metallicum valde nauseosum, vix ex ore vel lingua delendum; acido carbonico in oxydum viride mutatur.

CUPRUM ACETICUM. Vid. *Aerugo*.

CUPRUM SULPHURICUM. Vid. *Vitriolum coeruleum*.

CURCUMA. Gurfemeje. Curcumei; Gelber Ingfer.

*Amomum Curcumae* Jacq., Linn. Cl. I. ord. Monogyn., RADIX orientalis, extus lutea, intus e luteo rufa, dura, densa, ponderosa, defracta particulas resinosas micantes exhibens; saporis amaricantis leviter aromatici, odoris fere nullius.

CYDONIA. Quæder. Quitten.

*Pyri Cydoniae*, Linn. Cl. XII. ord. Pentagyn., SEMINA ex arbore Cretenſi in hortis culti. Sunt oblongo-acuta et ſpadiceo fulca, et quo magis nitida ſunt, eo meliora habentur. Multa mucilagine cincta ſunt. Rejiciantur vetuſta, nigra, fordida.

CYNARA. Artiſſoc. Artiſchocken.

*Cynaræ Scolymi*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., HERBA RECENS. Folia ſubſpinofa pinnata vel indiviſa, odoris debilis, ſaporis amari. In hortis colitur et tempore vernali æſtivalique colligenda.

CYNOSBATA. Hyben; Nyper. Hanbitten.

*Rosæ caninae*, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., FRUCTUS ovatus, obtuſus, coronatus, magnitudine glandis quercinae vel ultra, coccineus, intus cavus, feminibus pallidis lanato-hiſpidis repletus, odoris nullius, ſaporis aciduli. Frutex in dumetis et apricis ubique proveniens. Flor. Dan. Tab. 555.

**D**AUCUS VULGARIS ſ. SATIVUS. Gulerod. Carotten; Gelbe Wurzeln; Möhren.

*Dauci Carotæ*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX fuſiformis, craſſa, aurantia vel ex flavo rubens, ſucco grate dulci repleta; in agris hortisque colitur. In cellis ſabulo humido ſervanda. Flor. Dan. Tab. 723.

DATURA STRAMMONIUM. Galurt. Stechapfel; Tollkraut; Stachelnußkraut.

*Daturæ Stramonii*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA magna ſaturate viridia, odoris viroſi. Annua, in ruderatis ad ſepes, ad vias, ad foſſas ſpontanea, etiam in hortis culta. Flor. Dan. Tab. 436.

DENS LEONIS. Vid. *Taraxacum*.

DIGITALIS PURPUREA. Rod Fingerhut. Rother Fingerhut.

*Digitalis purpureæ*, Linn. Cl. XIV. ord. Angyoſp., FOLIA. Planta biennis in campis apricis auſtralibus creſcit. Uti quoque in Norvegiae pro-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



vinciis, Christiansandia et in Bergensi. Odore gaudet nullo; sapore autem amaro, ingrato, acri. Brevi ante florescentiam colligenda. Flor. Dan. Tab. 74.

DULCAMARA. Bittersede; Hundebær; Troldebær; Knipslyng. Bittersüß; Allraufen.

*Solani Dulcamarae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., STIPITES. Ad fossas et in locis paludosis habitat. Ramuli biennes vel triennes longi, calamus crassi, ligni, medullofi, cortice ex flavo viridescente, vel e cinereo fusco tecti; odoris, si recentes sint, gravis, nauseosi; saporis amaricantis postea subdulcescentis. Odor siccorum stipitum nullus; sapor magis amarus. Flor. Dan. Tab. 607.

ELECTRUM. Vid. *Succinum*.

ELEMI. Elemi. Elemi; Wildes Delbaumgummi.

*Amyridis Elemiferae*, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., RESINA. Celebratum olim Elemi aethiopicum, coloris ex albo lutei et languido viridis variegati, externe durum, interne tenax, molle, odoris Foeniculi, arundine involutum, non nisi rarissime invenitur. Sed ejusdem fere virtutis, Elemi vulgare Amyridis, modo probum fit, ejusdem ac aethiopicum coloris, semipellucidum flavescens, fere instar cerae cum immixta viridine, inter digitos frigidos friabilis, calefactum vero tenax et sequax, calore lentescens; odoris subvinosi ad acetum accedentis, fragrantis; saporis gravis amaricantis. Reji-ciatur, fuscum, cinereum. Sunt qui resinam flavam cum oleo Spicae et Terebinthinae commiscent, indeque Elemi artificiale componunt, quod facile ignis calore, quo odor Terebinthinae patescit, detegitur. E factitio Ele-mi paratum unguentum Araeci, mox in superficie contrahit pelliculam ari-dam duriusculam, gilvam: probum vero Elemi cum reliquis aequabiliter commistum manet. Non pro vero sed spurio Elemi habendum est Elemi Surinamense, ex arbore a Breynio descripta; quare illa Refina, Gummi



Chibou nonnullis appellatur. Eligatur odoratum, purum, pingue. Arbor Americae meridionalis.

Resina Elenii orientalis, quae in lacrymis luteo virescentibus, diaphanis, odoris grati foeniculacei, e cortice trunci Amyridis Zeilonicae Retz sponte destillat, melior est et efficacior.

ELEUTHERIUM. Vid. *Cascarilla*.

ENULA; HELENIUM. Ålandbrod; Sanct-Elensbrod. Ålandwurzeln.

*Inulae Helenii*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., planta perennis. RADIX biennis, crassa, carnosae, multifida, extus fusca, intus alba, odoris subaromatici violacei; saporis amari aromatici pungentis. In locis humidis, paludosis reperiunda, quae efficacior. Flor. Dan. Tab. 728.

ERUCA. Hvid Sennep. Weißer Senf.

*Brassicae Erucae* seu *Sinapis albae*, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., plantae annuae in hortis cultae SEMEN rotundum, parvum, flavescens; odoris grauiusculi; saporis acris et feminibus *Sinapis nigrae* similis, sed longe remissioris.

EUPHORBIIUM. Euphorbiumgummi. Scharfes Euphorbiumgummi.

*Euphorbiae officinalis*, Linn. Cl. XI. ord. Trigyn., GUMMI RESINA. Concreta in guttas vel lacrymas ex pallido flavescences, haud coloris aurei, splendidas, modo rotundas, modo oblongas ramosas et cavernosas. Odoris haud ingrati dum prunis injicitur: saporis acerrimi, urentis, nauseosi. Affertur ex Africae regionibus.

FAGUS. Bog. Büchen.

*Fagi sylvestris*, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., FRUCTUS, compositus e nucibus duabus, argute triquetris, rufo-badiis, unilocularibus, involucri quadrivalvi extus hispido inclusis. Semina triquetra, pallida; odoris nullius; saporis vix dulcescentis, subadstringentis. Arbor procerus in sylvis frequenter reperitur.





FARFARA; TUSSILAGO. Hæstehov; Follefod; Hovblad; Hovurterod; Skreppe; Leerskreppe; Leersivel. Brandlettich; Hufslattich.

*Tussilaginis Farfarae*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., FOLIA, in humidis provenientia, non adeo adulta, Majo mense colligenda. Flor. Dan. Tab. 595.

Ejusdem RADIX teres, longa, ramosa, fibrillosa, pallida. Odor vix ullus; sapor substypticus leniter amaricans. Primo vere ante deflorescentiam colligenda.

FEL TAURI. Dregalde. Ochfengalle.

*Bovis tauri domestici* cystica, viscosa, BILIS, ex flavo viridis; odoris ingrati; saporis peramari; in putredinem prona, statim inspissanda et in vitro clauso servanda.

FERRUM. Zern. Eisen.

*Ferrum* selectum, e cinereo nigrescens Metallum, Magneti obediens, quod acidis solutum, adstringente principio adhibito, nigricans praecipitatur. Odoris et saporis est proprii adstringentis.

FERRUM SULPHURICUM. Vid. *Vitriolum martis*.

FILIX. Bregne; Heedbregne; Skiærbregne; Grøfte Mølsoor; Mølsoorblom; Alojæske; Bujæske; Skorv; Hænbloom; Rystebloom; Trepeek; Cassa Gaiske. Jærnkraut.

*Polypodii filicis maris*, Linn. Cl. XXIV. ord. Filic., RADIX perennis, crassa ramosa, foris squamosa badio-nigricans, intus pallida. Odoris dum recens est subnauseosi; saporis primum subdulcis, deinde amariusculi, subadstringentis. Autumno colligenda.

FLAMMULA JOVIS; CLEMATIS ERECTA. Brændhurt. Brennkraut.

*Clematidis erectae*, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., FOLIA pinnata, foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis; odoris recentium debilis; saporis acris



saucis linguamque urentis, diutius retenti cam rubefacientis, vesiculas excitantis et exulcerantis; siccorum vero mitioris, acido-subdulcis, leniter adstringentis, parum stimulantis. In Germania meridionali reperitur.

Ejusdem FLORES. Sapor constanter acris est.

FLAVEDO CORTICUM CITRI. Vid. *Citrium*.

FLORES ANTHOS. Vid. *Rosmarinus*.

FLORES NAPHAE. Vid. *Aurantia*.

FOENICULUM. Fennikel. Fenchel.

*Anethi Foeniculi*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis, digitalis, recta, alba; odoris grati, saporis subdulcis, aromatici. In hortis colitur; pars corticosa in usum vocatur.

Ejusdem SEMEN ponderosum, oblongum, subviride, striis semieminentibus spadiceo albicantibus aut pallide flavescentibus distinctum. Oleo dives, grati odoris, calidiusculi et dulcescentis saporis.

FOENICULUM AQUATICUM. Vid. *Phellandrium*.

FOENUM GRAECUM; FOENU GRAECUM. Busckhorn; Fœnugræc. Bockshorn.

*Trigonellae Foenugraeci*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., SEMINA quadrangularia vel rhombea, subplana, utrinque fulcata, vitellina; odoris fortis ingrati, saporis mucilaginosi, ex Europa australi advecta.

FORMICA. Myrer. Ameisen.

*Formicae rusae*, Linn. Cl. V. ord. Hymenopt. In campis et silvis frequentissimae. Insectum hymenopterum, acido volatili proprio praeditum.

FRAXINUS. Nßß. Eschenbaum.

*Fraxini excelsioris*, Linn. Cl. XXIII. ord. Diocc., CORTEX, e cinereo pallescens ad viriditatem inclinans. Odoris nullius, saporis acris, amari, adstringentis. Flor. Dan. Tab. 969.

FUMARIA. Jordrog; Aafersissel. Gedrauch; Taubenkropf.

*Fumariae officinalis*, Linn. Cl. XVII. ord. Hexandr., PLANTA, recens in agris reperiunda, mense Majo colligenda. Inter segetes frequens est. Odo-







rem habet nullum, sed saporem peramarum, salinum, ingrátum. Flor. Dan. Tab. 940.

FUNGUS QUERCINUS. Vid. *Agaricus chirurgorum*.

**G**ALANGA MINOR. Galange. Galgant.

*Marantæ Galangæ*, Linn. Cl. I. ord. Monogyn., RADIX tuberosa, nodosa, geniculata, dura, minimum digitum crassa; feligantur ponderosae non cariosae, extus e spadiceo rubrae, intus rubellae; odoris, praesertim dum contundantur fragrantis, aromatici; saporis fervidi acris, subamari, subadstringentis. Ex Oriente advehuntur.

GALBANUM. Galbanum. Galbanum.

*Bubonis Galbani*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., GUMMI RESINA e Syria advecta, recens ex albo lutca; vetustior e luteo subrusa, ad ignem flammam concipiens. Eligatur Gummi recens, siccum quidem, sed calore manus lentescens et ductile, intense et nauseose specificè olidum, saporis calidi, amaricantis. Praefertur in granis allatum, quamvis variis interdum quicquiliis interpolatum. Neque tamen, quod in massis ad nos pervenit rejiciendum est, modo copiosas particulas albicantes parum splendentes, spiritum vini aureo colore tingentes, contineat. Abjiciatur vero impurum coloris luridi, fusci, crassitudinis cereae. Adulteratur variis vilioribus resinis, Ammoniaco aut Gummi subrufo Ferulae galbaniferae, quae in Sicilia crescit, variisque ramentis vegetabilium, quod e debiliore odore et defectu splendoris, colorisque variegati patefcit.

GALLA. Galæbler. Galäpfel.

*Quercus Cerris*, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., a puncturis Cynipis querci natae EXCRESCENTIAE fungosae, globosae; ex albo flavescentes vel cinereae, saepe foramine parvo perforatae, tuberculatae, principio adstringente repletae. Praeferendae ex Aleppo allatae, coloris nigro-caerulefcantis et imperforatae.

GAMBOGIA. Vid. *Gummi Guttae*.

**GENTIANA RUBRA.** Sode; Sodrod; Sodfonge; Skiar-  
søde. Røther Enzian.

*Gentianae purpureae*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis, longa, pollicem unum aut alterum crassa, extus fusca, intus e flavo rufescens, odoris debilis, saporis intense amari, in Norvagiæ Alpibus habitans: quæ luteæ præferenda. For. Dan. Tab. 50.

**GEOFFROYA JAMAICENSIS.** Jamaikansk Drumbarktræ.  
Jamaicanischer Wurmwindenbaum.

*Geoffroyae inermis*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., CORTEX, ex Jamaica et aliis insulis Caribæis advectus, extus cinereus vel ferrugineus, intus nigricans, fibrosus, tenax, sectione transversali minus splendens. Odor præsertim recentis nauseosus; sapor amaricans, subausterus.

**GEOFFROYA SURINAMENSIS.** Surinamsk Drumbarktræ.  
Surinamischer Wurmwindenbaum.

*Geoffroyae Surinamensis*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., CORTEX, in fructibus longis, planis, crassitie diversæ pro arboris ætate, vel parte a qua separatus fuit. Genuinus CORTEX extus lichenibus cinereis ablatis, purpureo-fuscus, intus atro-purpureus vel variegatus, vel punctis albicantibus inspersus, filamentoso lamellosus, sectione transversali splendens et punctulatus. Odor sicci fere nullus, recentis vero nauseosus; sapor leviter amaricans, subausterus. E Surinamia affertur.

**GEUM URBANUM.** Vid. *Caryophyllata*.

**GLYCYRRHIZA; -LIQUIRITIA.** Lakrits. Süßholz; Liquiritien.

*Glycyrrhizae glabrae* f. *echinatae*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., RADIX ramosa, late serpens, perennis. Sit recens, tenax, flexilis, dissecta lacte flavâ; odoris debilis, dulcis gratique saporis, sed coctione ingrate amarescens. Ex Franconia plerumque adfertur.

**GRAMEN CANINUM.** Hundegræs; Kroppegæs; Knægæs; Taggræs; Tægræs; Årrod; Åring; Skingræs; Qvifte-tæen; Qvifurt. Queck; Graswurzel.







*Tritici repentis*, Linn. Cl. III. ord. Digyn., RADIX perennis, repens, geniculata, e farmentis tenuibus constans. Pestis est vulgaris agrorum et hortorum. Odorem habet frumentaceum; saporem debiliter dulcescentem. Verno et autumnali, non aestivo, tempore colligatur. Flor. Dan. Tab. 748.

GRANATORUM CORTICES; MALICORIUM. Granatæbleskaf. Granatåpfelschaale.

*Punicae Granati*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., cortices fructuum, externe e fusco rubicundi, interne flavi, crassi, coriacei, tenaces, saporis amaro austeri, adstringentis. Ex Europa meridionali advecti.

GRATIOLA. Gudånaadeurt. Gottesguadenkraut.

*Gratiolæ officinalis*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA, quotannis recens ac florens colligenda, in uliginosis et humidis crescens, saporis peramari, acris. Flor. Dan. Tab. 363.

Ejusdem RADIX cylindrica geniculata, extus pallide cinerascens, intus pallide lutescens; odoris debilis haud ingrati; saporis intense amari, nauseosi, inhaerentis.

GUAJACUM; LIGNUM SANCTUM. Poffenholt; Guajaf. Franzosenholz.

*Guajaci officinalis*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., LIGNUM et CORTEX. Illud extus fulvum, intus obsolete viride; hic e cinereo fuscus et e viridi variegatus, minus ligno efficax. Utrumque quo magis est ponderosum et resinosum, eo melius est. Saporis sit amari, subacris, parum aromatici. Carbonibus injectum non ingratum spargat et aromaticum odorem. Subfidat in aqua. Quod coloris dilutioris est, exfoletum et vetustum habeatur. Adfertur e nova Hispania et insulis Americanis.

Ejusdem e ligno RESINA ex America allata, fragilis, friabilis, subpellucida; saporis acris pungentis; odoris nullius, grati vero si prunis injiciatur. Coloris externe e viride pulli aut obscure rufi, interne albicantis subrubelli. Adulteratur additione aut Colophonii aut Balsami Sulphuris Smal-

caldici. Fraus detegitur facile super ignem, qui Sulphuris odorem extricat. Distinguenda est Resina, quae mediante spiritu vini e ligno extrahitur; haec vero nativa est, et ex arbore, quae Guajacum lignum suppeditat, exsudat. Eligatur illa, quae in minoribus frustis advehitur et corticibus adhaeret Guajaci. Quae soluta in spiritu vini, si instilletur spiritus nitri dulcis, coeruleo colore tingitur, sincera esse concluditur.

GUMMI ADSTRINGENS FOTHERGILLI. Vid. *Gummi Kino*.

GUMMI ARABICUM; GUMMI SENEGAL. Arabisch Gummi.  
Arabisch Gummi.

*Mimosa Niloticae*, Linn. Cl. XXIII. ord. Monoec., GUMMI, e Guinea et ore Nigritarum in frustis conspicuae molis, foris asperis allatum, quod utpote minoris pretii, ejusdem tamen virtutis, in officinis prostat loco Gummi arabici (mimosae sive acaciae Aegyptiacae et Arabicae) pallide lutei, fragilis, fracti splendentis, pellucidi. Odorem et saporem nullum habet. Bdellii frustula, Senegal Gummi nonnunquam interpolata, odore se produnt.

GUMMI GAMBIENSE. Vid. *Gummi Kino*.

GUMMI GUTTAE, GUTTA GAMBA; GAMBOGIA. Gummi-  
gut. Gummigutt.

*Stalagmitis Cambogioides* Murayi, GUMMI RESINA, e regno Chinae et Siam, ut et Ceylone allata, in officina forma placentarum largarum prostat, opaca, nitens, friabilis. Coloris e flavo rufi, aurantii, extus multo obscurioris, humectata in pallidam flavedinem abiens. Odorem et saporem habet initio nullum, verum deinde acris fit cum siccitatis faucium sensu. Rejiciatur impura sordida nigricans.

GUMMI GUTTA GAMBA. Vid. *Gummi Guttarum*.

GUMMI KINO f. GAMBIENSE f. RUBRUM ADSTRINGENS.  
f. ADSTRINGENS FOTHERGILLI.

Arboris Africae interioris adhuc ignotae, massa gummi-resinosa, rubro nigricans, friabilis, opaca, fractura granulosa nitente, in aqua subsolubilis, reliqua in spiritu vini. Odor nullus; sapor adstringens.







GUMMI RUBRUM ADSTRINGENS. Vid. *Gummi Kiuo.*

GUMMI SENEGAL. Vid. *Gummi Arabicum.*

**H**ELENIIUM. Vid. *Enula.*

HELLEBORUS NIGER; MELAMPODIUM. Sort *Nyserod.*  
Christwurzel; Schwarze Nieswurzel.

*Hellebori nigri*, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., RADIX fibrosa, maximam partem in Laalandia, insula Moen, Germaniae australis et Helvetiae alpebus collecta. Probae radiceis caput tuberosum, nigrum, nucem Moschatani aequat et sulcatum est. Fibræ sint extus tenues, laeves, intus albae, parum tenaces. Sapor nauseosus sit, acer et amaricans cum odore nauseoso; rejiciantur radices vetustae, fragiles, pulverulentae.

HELMINTHOCHORTUM. Strandmoos. Korallenmoos; Wurmmoos.

*Conseruae dichotomae*, Linn. Cl. XXIV. ord. Alg. In mari circa Corficam colligitur. Est subfusca, dichotoma; odore marino et nauseoso; sapore subsalfo, nauseosoque praedita.

HIPPOCASTANUM. Hestecastanier; Wilde Castanier.  
Roskastanien.

*Aeschyli Hippocastani*, Linn. Cl. VII. ord. Monogyn., CORTEX. Arbor ubique fere frequens est. Cortex ramorum saporem habet adstringentem, grate amarum, odorem nullum, colorem subluteum, albugine vero adhaerente liberandus est. Colligatur ex ramis aetate non nimis proVectis, nec nimis teneris.

HIRUDO. Blodigle. Blutigel.

*Hirudo medicinalis* depressa fusca, lineis longitudinalibus flavis dorsalibus sex, intermediis maculatis, subtus cinerea, nigro maculata.

HIRUNDINARIA; VINCETOXICUM. Swalerod. Schwalbenwurzel; Giffwurzel.

*Asclepiadis Vincetoxici*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX biennis tuberosa fibrosa, in sabulosis et montosis reperiunda; subacris fervidique saporis et validi nardini subaromatici odoris. Flor. Dan. Tab. 849.

HYDRARGYRUM. Vid. *Mercurius*.

HYOSCYAMUS. Fandenblosser; Fandenbpunge; Hensebane; Bulmeurt; Horseland; Sodbonne. Bilsenkraut.

*Hyoscyami nigri*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., HERBA, in rudcratis pinguibus proveniens: mense Julio colligenda. Odor herbae recentis, narcoticus, ingratus: contusae tabacinus, sapor fatuus.

Ejusdem SEMEN exiguum subcinereum, subrotundum rugosum, compressum.

HYPERICON. Perikum; Hyperikum; Jordhumle; Blodblomster; Sanct-Hansurt; Mandebloed; Apothekerperikum. Johanniskraut.

*Hyperici perforati*, Linn. Cl. XVIII. ord. Pentandr., COMA florida, in pratis proveniens, antequam flos sese explicuerit, mensibus Junio et Julio decerpenda; sapore subacri, balsamico, subadstringente, et odore svari praedita. Quod ejus loco non raro substituitur Hypericum quadrangulum, caule quadrato herbaceo, dignoscitur. Flor. Dan. Tab. 1043.

HYSSOPUS. Isop. Isop.

*Hyssopi officinalis*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., COMA florida. Odorem habet sicca et recens fragrantem, saporem calidiusculum aromaticum, amaricantem.

JALAPPA. Jalap. Jalappe.

*Convolvuli Jalappae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX vel potius taleoli radice zonulis cincti, externe e lurido fusci, interne e fusco cinerei, ex America allati. Radix sit compacta, dura, ponderosa; igni admota in-







flammabilis, diffracta particulis resinosis resplendens. Odoris est, cum in pulverem teritur, nauseosi; saporem habet acriusculum, diutius inhaerentem, ingratum. Admissa Bryoniae segmenta, colore albo, textura spongiosa, annulisque illico se produnt.

JASMINI OLEUM. Jasminolie. Jasminöl.

*Jasmini officinalis*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., florum OLEUM infusum, aliunde ad nos perveniens.

ICHTHYOCOLLA s. COLLA PISCIIUM. Huusblas. Hausenblase.

*Acipenseris Sturionis*, *Huffonis stellati*, aliarumque specierum hujus generis GLUTEN, ex vesica aërea praecipue, nec non ex intestinis coctione extractum, refrigerio in pelliculas condensatum, et deinde in varias figuras convolutum et siccatum. Optima in frustis albidis, subdiaphanis, solidis, ponderosis, in aqua facile ac perfecte solubilibus, et maximam partem ex Moscovia advectis, habetur.

IPECACUANHA. Amerikanst Brekrod. Amerikanische Brechwurzel; Ruhrwurzel.

*Psychotriae emeticae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX repens, nodosa, geniculata: Brasiliensis fusca, aut Peruviana cinerea, quae priori praeferenda. Quae externe albicant radices, aut coloris gilvi sunt, spongiosae et sulcis haud notatae, rejiciantur. Eligantur, quae colorem exhibent e cinereo obsolete castaneum, quae rugosae sunt annulisque et incisuris profundis conspicuae. Odor corticis nullius, pulverisati nauseosus; sapor amari-cans, acriusculus, inhaerens, cum sensu mucilaginis. Cortex crassus sit, durus, densus, fragilis, fractus particulis resinosis resplendens. Rejiciantur fibrae adhaerentes cum medulla lignea alba, insipida, subflavescente.

IRIS FLORENTINA. Fiolrod. Violenwurzel.

*Iridis florentinae*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., RADIX tuberosa, sublato cortice ex Italia advecta, ponderosa, densa, candida, pollicem crassa, punctis e gilvo fuscis distincta, Violae Martiae odorem spirans; saporis



leviter amaricantis, subacris, diutius in ore remanentis. Radices minores majoribus praestant.

**JUGLANS.** Balnodbetræ. Welscher Nußbaum.

*Juglandis regiaë*, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., fructus CORTEX exterior parenchyma carnosum, succulentum viride, habet. Odor corticis non admodum gratus; sapor adstringens amarus. Arbor in hortis colitur.

**JUNIPERUS.** Enebær; Jenbærtræ; Ene; Ener; Eine; Briss; Bruse; Rædka; Gossas. Wachholder.

*Juniperi communis*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BACCAE grandes nigrae, resinosae, ponderosae. Odoris gravis; saporis subamari, subdulcis resinosi. Arbusculum in solo sterili spontaneum. Flor. Dan. Tab. 1119.

Ejusdem LIGNUM album, solidum, fragrans, saporis amaricantis, aut trunci aut radicis. Lignum radicis, quippe odoratum magis et efficax, priori praeferendum est.

Ejusdem e ligno et cortice destillatum OLEUM, e sylva Hercynia allatum, non raro Oleo Pini et Terebinthinae adulteratur.

**KALI CARBONICUM.** Vid. *Cineres clavellati*.

**KALI NITRICUM.** Vid. *Nitrum crudum*.

**LACCA; GUMMI LAC.** Gummilack. Gummilack; Stangenlack.

*Fici religiosae et Indicae* vel alius arboris Indiae orientalis Massa resinoso ceracea e laeso cortice ramulorum exsudans et totum obducens, in qua Cocci Fici, Infecta haemiptera, nidulant. Sit rubra; fragilis, subpellucida, odoris et saporis vix ullius; masticata salivam tingit purpureo colore; aquam calidam chermosino, subsidente pulvere nigricante; spiritui vini impertit saporem subamarum, subadstringentem; accensa odorem primo gratum, deinde foetidum animalis substantiae spargit. Haec Lacca ramulos





adhuc involvens sub nomine *Laccae in baculis*, ex Bengalia adfertur, et quæ profundius rubra est; eo melior censetur. Vilioris pretii est pallida et perforata in granis solitariis, quae *Lacca in granis* dicitur. Ejusdem census est *Lacca in tabulis*, e granulata fusa et a foecibus purgata confecta, e flavo rubens pellucida et fragmentis Vitri Antimonii similis.

LAPATHUM ACUTUM. Hestesyre. Grindwurzel.

*Rumicis acuti*, Linn. Cl. VI. ord. Trigyn., RADIX perennis, pollicem crassa, octo vel decem pollices longa; coloris extus obscure rubelli, intus flavescentis; odor levis: sapor manifeste austerus et amarus. Planta fere ubique occurrit.

LAURUS. Laubætræe. Lorbeerbaum.

*Lauri nobilis*, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., FOLIA recentia. Arbor Europae calidae propria. Folia fortiter sint olida non effoeta; odoris aromatici, balsamici gravioris; saporis aromatici subamaricantis; coloris obsoleto flavi, e gilvo olivaris.

Ejusdem BACCÆ. Fructus recentes nigricantes, olcosi, aromatici; sapore et odore fortiores, quam Lauri folia.

Earundem e baccis contusis, affusaque aqua coctis, expressum OLEUM ex Italia, maximam vero partem e Gallia australi allatum. Plerumque adipe Suilla; Terebinthinâ et colore viridi (Sasigrøn) adulteratum, ad nos pervenit.

LAUROCERASUS. Laubærbladet Kirssebærtræe. Kirschlorbeerbaum.

*Pruni Laurocerasi*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., arbor, Orientis et Europae australis; FOLIA sempervirentia, succulenta, coriacea integra, nitide viridia, odoris fragrantis, nucleo Persicæ similis; saporis velut amygdalarum amararum. Pulveratâ sternutationem moventia, principio narcotico abundant; siccata fere insipida.

LAVENDULA. Lavendel. Lavendel.

*Lavendulae spicae*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnospi., SPICA FLORENS.



Habetur *Lavendula latifolia* et *angustifolia*. Hujus utpote gravioris, ficcandus flos est, illius pro oleo inservit. Odor recentis et siccae fragrans, fortis, cephalicus, svaveolens; sapor aromaticus, amaricans, calidiusculus.

**LEVISTICUM; LIGUSTICUM.** *Levstik; Lobstik. Liebstöckel; Bedfraut; Saukraut.*

*Ligustici Levistici*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX, in hortis culta, praelonga, crassa, grandis, ramosa, torosa, extus nigricans, intus alba, in medio subflava. Odoris speciei, gravis; saporis subdulcis, acris, aromatici, ingrati.

**LICHEN ISLANDICUS; MUSCUS ISLANDICUS.** *Islandsk Moss; Fjeldgræs. Isländisch Lungenmoos.*

*Lichenis Islandici*, Linn. Cl. XXIV. ord. Alg., HERBA foliacea adscendens, lacinjata, in Islandiae, Norvagiae, Lapponiae montanis et Alpinis, uti et aliarum regionum montibus ad terram et saxa proveniens; supra cinereus est, subtus fuscus. Odoris nullius; saporis amari, subadstringentis. Flor. Dan. Tab. 155.

**LIGUSTICUM.** Vid. *Levisticum*.

**LINUM SATIVUM.** *Her. Lein.*

*Lini usitatissimi*, Linn. Cl. V. ord. Pentagyn., SEMEN. Planta apud nos conferitur in agris. Odor seminis recentis debilis; sapor fatuus, mucilaginosus.

Ejusdem OLEUM expressum recens, vid. Pars II.

**LIQUIRITIA.** Vid. *Glycyrrhiza*.

**LITHARGYRIUM ARGENTI; PLUMBUM OXYDATUM.** *Solbergglöd. Silberglätte; Bleiglätte.*

Plumbum inter depurationem argenti oxydatum, semivitrificatum, ponderosum, ad attactum pingue, squamosum, e rubello flavicans, nunc magis pallidum, nunc propius in rubrum vergens. Odoris nullius; saporis metallici dulcis. Praestat quod e puro acquiritur plumbo, cujus solutio cum



The first of these is the fact that the United States is a young nation, and that its history is a history of growth and development.

The second is the fact that the United States is a nation of immigrants, and that its history is a history of the struggle for a better life for all.

The third is the fact that the United States is a nation of free men, and that its history is a history of the struggle for freedom and justice.

The fourth is the fact that the United States is a nation of peace-loving people, and that its history is a history of the struggle for peace and harmony.

The fifth is the fact that the United States is a nation of progress, and that its history is a history of the struggle for progress and improvement.

The sixth is the fact that the United States is a nation of hope, and that its history is a history of the struggle for hope and optimism.

The seventh is the fact that the United States is a nation of faith, and that its history is a history of the struggle for faith and belief.

The eighth is the fact that the United States is a nation of love, and that its history is a history of the struggle for love and compassion.


The ninth is the fact that the United States is a nation of justice, and that its history is a history of the struggle for justice and equity.

The tenth is the fact that the United States is a nation of peace, and that its history is a history of the struggle for peace and tranquility.



Aminonio (alcali volatili) coeruleum non inducit colorem, quod contingit si cuprum admixtum fuerit.

LUPULUS. Humle. Hopfen.

*Humuli lupuli*, Linn. Cl. XXII. ord. Pentandr., ad sepes in dumetis crescentis,  NI. Amenta florum foemineorum subrotunda vel oblonga, ovata, stramineo-spadicea, odoris fragrantis subnarcotici, gravis, saporis peramari inhaerentis. Flor. Dan. Tab. 1239.

LYCOPODIUM. Jordmoß; Ilvesod; Lusegræs; Kraakestiig; Kraakesod; Soenkraakesod; Rævereber. Bårlipp; Streuspulvermoß.

*Lycopodii clavati*, Linn. Cl. XXIV. ord. Musc., in montosis et silvosis reperiundi, SEMEN vel potius Pollen subtilissimum, coloris flavi. Odorem et saporem habet nullum; instar cerae ad flammam ardet et quasi fulgurat, aquam autem respuit. Flor. Dan. Tab. 126.

MAGNESIA SULPHURICA. Vid. *Sal anglicanum*.

MAGNESIA VITRIARIORUM. Vid. *Magnesium oxydatum nativum*.

MAGNESIUM OXYDATUM NATIVUM; MAGNESIA VITRIARIORUM. Brunsteen. Braunstein.

Metallum magna cum quantitate oxygenii unitum, cinereo nigrescens, inquinans, in vase clauso ignitum gas oxygenium largiens. Rejiciendum illud, quod ferrum carbonicum aliaque heterogenea admixta habet.

MAJORANA. Mairan; Merian. Majoran.

*Origani Majoranae*, Linn. Cl. XV. ord. Gymnosperm., HERBA annua in hortis culta; foliis ovatis obtusis ex viridi albicantibus; odoris fragrantis fortis; saporis aromatici, subamaricantis.

MALICORIUM. Vid. *Granatus*.

MALTHUM. Malt. Malz.

*Hordei vulgaris, distichonis, hexastichonis*, Linn. Cl. III. ord. Digyn., SEMINA post primam germinationem ficcata.

MALVA. Ratteost. Râsepappel.

*Malvae rotundifoliae* v. *sylvestris*, Linn. Cl. XV. ord. Polyandr., FOLIA. Planta annua ubique ad vias, sepes, in locis ruderalis proveniens. Odoris nullius; saporis mucilaginosi: mense Majo colligenda, non multum adulta. For. Dan. Tab. 721 et 1223.

MANNA. Manna. Manna.

*Fraxini orni varietatis rotundifoliae*, Linn. Cl. XXIII. ord. Dioec., dum junior est aut LACRÝMA sponte stillans, aut succus ex arbore vulnerata elicitus, gummoso melleus; maximam partem e Calabria ac Sicilia advectus. Multa circa Mannam fraudulenter aguntur. Laudatur vulgo cannulata (en Marrons) reliquisque jure praefertur. Sed in ipsa Mannae patria rarior et pretiosa est, et quae nobis sub hoc titulo obtruditur, factitia esse solet, e Manna fordida exoleta, Amylo, Saccharo et Scammonio in varias formas efficta. Ejusdem farinae venditur tabulata, quae e variis compacta non nisi pondere majore a sincera dignoscitur, et merito repudiatur. Rejiciatur itidem omnis Manna in glebis majoribus iisque fordidis allata; nec non, quae crassitudinis melleae (Manne grasse) aut impura est, pinguis, tenax, coloris rufi fusci (Manne rousse). Adulteratur enim variis supra dictis, Melle, Glauberi sale, variis succis purgantibus Tithymali vel Esulae speciebus, quibus Manna imprimis Brigantina (Manna de Briançon) scatere dicitur, quae, si sincera, lacryma est Laricis, Mannae aemula, virtutis laxantis. Eligatur autem, si non Bombycina alba, dura et in vermium figuram contorta sed rarior, certe Mastichina, in granulis lacrynnis aut grumis majoribus minoribusque (Manne en larmes) pallide lutei coloris, allata. Sit vero recens, diffracta paucillum mannae liquidae mellis instar exsudans, levis, pura, parum pelucida, ab actu in grumos minores diffiliens, non tenax aut sequax; saporis dulcis subacrescentis specifici, absque odore; super linguam plane deliquescentis. Sicco calidoque fervetur loco, in humidis enim dissolvitur in laticem ingratum inertem.

MARCASITA. Vid. *Bismuthum*.







MARRUBIUM. Marrube. Andorn.

*Marrubii vulgaris*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA in ruderatis proveniens. Caulis erectus, tetragonus, albido-tomentosus. Folia opposita, subrotunda, rugosa, pubescentia, profunde crenata, obtusa. Odor fragrans, subvinosus; sapor amarus, inhaerens. Flor. Dan. Tab. 1036.

MASTIX. Mastix. Mastix.

*Pistaciae Lentisci*, Linn. Cl. XXII. ord. Pentandri., cicuris et ferae, in Europae australi et Archipelagi insulis crescentis, in Chio praecipue cultae LACRYMA, e fauciatum cortice stillans, resinosa. Eligantur grana, coloris albi, citrini, pellucida, fragrantia, splendentia. Dentibus tentata Mastix fragilis est, cerae instar lentescit, et pressione in pastam compingitur. In terram stillans resina sordes contrahit, unde his abundantes grumi, (Mastix infertis dicti) merito rejiciuntur, aut saltem puriora ex his frustra studiose feliguntur. Suspecta pariter est, quae in sic dictis panibus offertur, cum ex vulgari impura, aqua bulliente ut candidior fiat, soluta compingatur. Addunt etiam verae Mastichi, quam Masculam incolae vocant, Foemininam, quae est lacryma Pistaciae verae et Terebinthi opaca, viscosa, Terebinthinae non absimilis. Haec cum vera Mastiche confusa, ficos externa specie panes refert, qui vero diffracti, non perspicuis particulis, viscosa indole, et mollitie fraudem patefaciunt.

MATRICARIA. Matrum. Mutterkraut.

*Matricariae Parthenii*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA cum FLORIBUS, in ruderatis et cultis crescens. Caulis erectus, bipedalis, striato-angulatus, glaber, ramosus. Folia alterna petiolata, pinnatifida; pinnis suboppositis, ovato-oblongis, inciso-ferratis. Flores corymbosi, terminales, compositi radiati: radio albo, disco flavo. Odor fragrans, graviusculus, in Chamomillam et Tanacetum incidens; sapor amaricans, aromaticus, calidiusculus. Flor. Dan. Tab. 674.

MEL. Honning. Honig.

*Apis melliferae* Linn., e neetario et polline florum PRODUCTUM resi-

noso mucilaginosum, spissioris consistentiae, tum album, tum pallide flavescens vel etiam saturatius; odoris grati, saporis dulcissimi. Præter plantarum, e quibus mel colligitur, diversitatem, unde salubritas, odoris saporisque differentia pendet, adhuc magnum ratione coloris, consistentiae, puritatis, bonitatis discrimen patitur. Optimum est virgineum (Somfruehønning, Jungfernhønig) nulla adhibita arte, e favis juniorum apium diffRACTIS, craticulae impositis, destillans. Delicatus deprehenditur mel Narbonense, ubi Rosmarinus aliaeque nobiliores plantae occurrunt. Deterius est expressum, ceram redolens, deterrimum elutum coctum. Adulteratum farina, magis albidum est, vix odorum, glutinosum: consistentia, color, odor, sapor aliarum fraudum criteria sunt. *Mel despumatum* (flæret Hønning, gældeter Hønig) in vase fictili, moderato calore, lente parandum est.

MELAMPODIUM. Vid. *Helleborus niger*.

MELILOTUS. Amur; Meloten; Steenklover. Steinflee. Meleloten.

*Trifolii Meliloti officinalis*, Linn. Cl. XVI. ord. Decandr., COMA, in campestribus habitans, floribus sive albis sive luteis, mense Julio colligenda. Odor siccae longe fragrantior, quam recentis; sapor subamarus, herbaceus. Flor. Dan. Tab. 934.

MELISSA CITRATA. Citron-Melisse; Citron-Hiertens-fryd. Citron-Melisse.

*Melissae officinalis*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA junior et antequam verticillos florentes emittat, colligenda, in hortis culta. Odorem recens et sicca fragrantem, fere flavedini corticis citri similem; saporem sicca acrem, aromaticum habet.

MELO. Melon. Melone.

*Cucumeris Melonis*, Linn. Cl. XXI. ord. Syngenes., SEMEN, in hortis colligitur, mense Julio et Augusto maturefcit. Sunt ovata, oblonga absque odore, et sapore dulciuscula.







MENTHA CRISPA. Krusemynte. Krausemünze.

*Menthae crispae*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA, colligenda antequam spicam florentem protrudat. In hortis provenit; odorem recens ac sicca fragrantem habet, fortem non admodum gratum, spirituosum; sapore in calidum aromaticum, cum levi amaritie.

MENTHA PIPERITA. Pfeffermynte. Pfeffermünze.

*Menthae Piperitae*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA, in hortis culta. Odorem sicca et recens fragrantem, spirituosum, subcamphoratum habet; saporem recens aromaticum, fervidum, camphoraceum, linguam calefacientem, subsequente sensu frigidiusculo; sicca fortiolem.

MERCURIUS; ARGENTUM VIVUM; HYDRARGYRUM. Quicksilber. Quicksilber.

*Hydrargyrum virgineum* est metallum fluidum, in summo frigoris gradu solidescens, malleabile, coloris splendidi argentei, valde ponderosum et in igne mediocri totum evaporans. Purum et adulterationis non suspectum, facillime globulis exacte rotundis, levissime iterum coeuntibus currens in charta, in cursu nihil relinquens impuri, acetum minime dulcificans, vel plumbeas particulas per reagentia detegendas minime prodens, per corium expressum fere nihil impuri sive pulverulenti reliquens dignoscitur. Invenitur sive nativum, Mercurius virgineus dictus, sive sulphure in Cinnabarim versus, in quem ubi vertitur, pro variis quibus inhaeret terris, varias mineras efformat. Sit purum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in Cochleari ferreo supra carbones detegitur, ubi avolat mercurius, relicto metallo admisso. Cujus superficies non nitet, sed fusca et quasi membranula obducta apparet, tardius et globulis quasi caudatis currens, nigra vel cinerea vestigia relinquens, adulteratus est. Sapor dulcis aceti cum mercurio digesti, et color obscurus ex admisto liquore vini probatorio Hahnemannii, denotat depravationem cum plumbo: acidum nitricum mercurio affusum, Stannum commissum in oxydum album corrodit. Bismutho inquinatus, in aqua forti pura

solutus mercurius, affusa aqua destillata, albo praecipitatur colore, quod praecipitatum est oxydum Bismuthi. Pro usu medico optime instituitur revivificatio mercurii via humida, coctione cum ferro in aquae sufficienti quantitate, e sublimato corrosivo albo. Ex Idria, Hispania, India orientali et Palatinatu obtinetur.

MEZEREUM. Kielderhalb; Lissbast; Riussbast. Kellershalb; Sendelbast.

*Daphnes Mezerei* et *Daphnes Laureolae*, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., CORTEX tenuis striatus, subluteus, epidermide ex viridi fusca superinductus, intus viridescens. Saporis peracris urentis: odoris nullius. Fruticis Hispaniae, Galliae et Germaniae meridionalis, nobis hortensis.

MILLEFOLIUM. Kollife; Harbons; Barbes; Jordhumle. Schaafgarbe; Röllf.

*Achilleae millefolii*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., HERBA cum floribus, per campos et in pascuis vulgaris; odoris subaromatici, balsamici; saporis subadstringentis, amaricantis; mense Julio colligenda. Flor. Dan. Tab. 737.

MINIUM. Monnie. Mennich; Rother Mennich.

Praeparatum plumbi, seu plumbum usione in oxydum rubrum conversum, valde ponderosum squamulisque minutissimis nitidis conspicuum. Purum carboni impositum, ope tubi ferruminatorii prorsus in globulum metallicum redigitur. Saporem dulcescentem habet.

MORUS. Morbartræ. Maulbeerbaum.

*Mori nigrae*, Linn. Cl. XXI. ord. Pentandr., BACCAE compositae, in hortis cultae; odoris vix ullius, saporis acido dulcis.

MOSCHATA NUX; MYRISTICA NUX. Muskatnuss. Moschaten; Nuß.

*Myristicae Moschatae*, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr.? NUCLEUS, ex insulis oceani indici advectus. Nux rotunda vulgo foemina, praestat oblongae vulgo mari, non adeo efficaci. Sit grandis, ponderosa, extus e murino fusca,







intus e fusco et rufo variegata, fragrans admodum et saporis aromatici, subpinguis, linguam blande pungentis et os grato calore replentis; acu puncta multum olei exsudans. Rejiciatur cariosa et vilior species, Mümpse Germanis vocata.

Ejusdem OLEUM expressum, ex Indiis allatum, fragrantissimum, consistentiae melleae, coloris ex aureo cinnamomei. Rejiciatur durum, pallide coloratum, non admodum fragrans, varia pinguedine interpolatum. Vid. Pars II.

Flores MACIS. Müßatblommer. Moschatenblumen.

Super nucleum expansus CORTEX interior, reticularis laciniatus. Sit recens, tenax, pinguis, fragrans, coloris nitide e cinnamomeo aurei, magnis frustis et laciniis conspicuus; odoris fortis, balsamici; saporis calidi, aromatico-amaricantis, grati. In insula moluccensi Banda, arbor reperitur. Qui e laciniis parvis compositus, fragilis est, albicans aut dilutius flavescens, rejiciatur.

MOSCHUS. Desmer. Bisam.

Substantia animalis sebacea, unctuosa, in folliculo ad umbilicum animalis sito, collectus. Optimus, rarus vero est Tunquinus, vesicam magnitudinis ovi columbini replens, instructam cute, pilis radiatis ex albo subfuscis obsita. Ordine bonitatis succedit e Bengalia et Agria allatus: pessimus est Moscoviticus, Cabardinus sive Tabargus, odore et efficacia debiliore, folliculo pilis albicantibus obsito, notabilis. Optima species Moschi adfertur in vesicis tenuibus, rotundis, magnitudinis ovi columbini, crinibus rufis brevibus tectis, integre repletis. Moschus ipse ficcus est, parum unctuosus, obscure rubri, rufi aut e ferrugineo nigricantis coloris, in parvis rotundis granis, perpaucis duris nigris frustulis intermixtus, sine ulla aut fabuli aut aliarum substantiarum admixtione. Manducata aut cultro abrasa frustula, particulis quasi resinosis micantia, flavescunt; saporem amaricantem, odoremque fragrantem produunt; et lamina candente imposita tota evaporant, relicto cineris



gryfei pauxillo. Adulteratus enim est Moschus, qui aliquid carbonis instar adustum relinquit.

MUSCUS ISLANDICUS. Vid. *Lichen islandicus*.

MYRISTICA NUX. Vid. *Moschata*.

MYRRHA f. GUMMI MYRRHAE. Myrrha. Myrrha.

Arboris nondum cognitae in Aethiopia et Abyssinia habitantis, GUMMI RESINA. Laudant Stactem, sive sponte exsudentem, quae vero rarissime, si unquam occurrit. Optima est, quae in Granis sive Lacrymis adfertur. Eligatur vero pura, fulva aut e fulvo ferruginea, spiritu adflato magis rubescens, levis, fragilis, tactu pinguis, pellucidula, splendens, fracta strias semicirculares, albas, caesias exhibens, in ore omnis fere deliquescens, odoris validi specifici; non adeo ingrati; saporis multum amari, aromatici. Rejiciatur fusca, nigra, tenax, tota resinosa, albicans, impura, et odore nauseoso praedita.

NASTURTIIUM AQUATICUM. Bandfarse. Brunnenskresse.

*Sisymbrii Nasturtii aquatici*, Linn. Cl. XV. ord. Siliquosf., HERBA biennis, crescens ad rivos et fontes spontanea. Odoris, si recens teratur, volatilis, proprii; saporis subamaricantis leviter acriusculi. Flor. Dan. Tab. 690.

NATRUM CARBONICUM. Vid. *Soda*.

NATRUM MURIATICUM. Vid. *Sal Gemmae*.

NICOTIANA. Vid. *Tabacum*.

NITRUM CRUDUM; KALI NITRICUM. Salpeter. Salpeter.

Nitrum nativum, SAL NEUTER ex acido nitri et Kali constans, ex propriis terris peculiari ratione-excoctum, depuratum, Crystallus prismaticos hexaedros efformans. Eligatur purum, album, crystallus longos exhibens, in manu clausa crepitationis sonum edens, carbonibus ignitis inspersum absque crepitatione cum obliqua et rubra flamma et strepitu prompte deslagrans, atque in aqua, maxime calida, facile solubile; saporis acris amaricantis, refrigerantis, quale ex India orientali nativum adfertur. In nitrariis nostris





quoque gignitur. Terram calcaream, Kali muriaticum et Magnesium muria-  
ticam, plerumque continet nondum depuratum.

NUX VOMICA. *Brandboine. Kráhenaugen; Kranzaugen.*

*Strychnos nuxis vomicae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., NUCLEUS, com-  
presse ovatus, tenax, cinereus, corneae duritiei, villis ex cinereo splenden-  
tibus obsitus, saporis summe amari. Ex Malabaria advehitur.

OLEUM ASPHALTI. Vid. *Asphaltum*.

OLEUM DE CEDRO. Vid. *Citrus*.

OLEUM JUNIPERI. Vid. *Juniperus*.

OLEUM LAURI. Vid. *Laurus*.

OLEUM PETRAE ALBUM. Vid. *Petroleum album*.

OLEUM RICINI. Vid. *Cataputia major*.

OLEUM TEREBINTHINAE. Vid. *Terebinthina*.

OLIBANUM; THUS. *Biraf. Weihrauch.*

*Juniperi Thuriferae* v. *Juniperi Lyciae*, Linn. Cl. XXII. ord. Monandr.,  
RESINA, ex Oriente vel Aegypto advecta, ex albo sublutea, semipellucida,  
dente tentata friabilis, deinde lenta, sequax, non tamen uti Mastix in pastam  
conglutinata; odoris fragrantis, saporis amari non ingrati; super ignem  
non liquefscens, sed cum luculenta flamma deflagrans. Opacum, rufum,  
impurum, ramentis corticosis et quisquiliis intermixtum, rejiciatur. Adul-  
teratur resina Pini et Laricis, inprimis lacryma Pini Piceae, quae Thus vul-  
gare vocatur. Est vero haec coloris e flavo et rufo variegati; saporis amari  
non adeo grati, et super ignem explorata, Terebinthinam redolet.

OLIVARUM OLEUM. *Somolie. Baumöl.*

*Olei Europaeae*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., in Europa australi cultae,  
e fructibus expressum OLEUM UNGUINOSUM. Praestat e Lusitania, Italia  
et Gallo-provincia allatum, ex albo leviter viridescens, sine amurca, abs-  
que sapore aut falso, aut rancido, et dum recens est inodorum. Frigore  
in massam penitus albam coit, et quo citius hoc facit, eo praeslantius.



Quod secunda obtinetur expressione, magis flavescit, et cum sordibus mucilaginosi quid praecipitat, unde facilius rancescit.

ONONIS SPINOSA. Kragerorn; Hestegilding; Langsien-derod. Haubehel.

*Ononidis spinosae* nec non *Ononidis arvensis*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., RADIX spithamea, pedalis vel ultra, crassitie pennae cygneae, digiti vel pollicis; fibrillosa, extus fusca, intus albida. Recentis odor Pisi siccati, sapor consimilis subamaricans; masticata admodum tenax. Ubique in arvis et campis invenitur. Flor. Dan. Tab. 783.

OPIUM. Opium; Balmuesast. Mohnsast.

*Papaveris somniferi*, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., succus gummeo-resinosus. Primaria ex incisuris Papaverum capitibus exsudans Lacryma, verum antiquorum opium, Affion inquilinis dictum, ac solis calore in massulas obscure fulvas rufasque coactum, ad nos non pervenit. Adfertur vero succus posthac expressus, aut e capitibus contusis coctus, et ignis ope in massas majores inspissatus, quem tamen ab admixtis succis heterogeneis, affinis inprimis (*Chelidonii glaucae* et *corniculati*) non plane immunem esse perhibent. Forma glebae aut panis foliis involuti, externe fusci, subinde pulli coloris advehitur. Thebaicum vulgo expostulatur Opium; sed perinde est qua patria gaudeat, Aegypto, India orientali, Persia, Anatolia, quae praeter reliquis est papaverifera; modo sequentibus se commendat dotibus. Sit densum, ponderosum, coloris externe e fulvo, rufo, vel spadiceo fusci, fractum particulis splendentibus micans, comminutum coloris fulvi, digito diutius tractatum paucillum tenax, purum; odoris validi, tetri, virosi; saporis amari, acris, fervoris aliquo sensu fauces adurentis; prompte flammam concipiens; omnino fere aqua solubile et rubicundam exhibens tincturam. Quod variis vegetabilium fragmentis, fabulo et quisquiliis scatet, colorem obsolete pullum, aut e murino pullum exhibet, et odoris adusti vel exigui est atque friabile, rejiciatur. Extractum totius plantae Meconium antiquorum fuisse dicitur. Quod e Bengalia et America adfertur rejiciatur.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations, is a non-profit corporation organized under the laws of the State of New York. It is a successor to the New York City Library, which was established in 1808. The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.

The Library is a public institution, and its collections are open to all. It is a member of the Association of Research Libraries, and it is a part of the New York City Department of Cultural Affairs.



OPOPANAX. Panargummi. Panargummi.

*Pastinacae Opopanacis*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., GUMMI RESINA granulosa, rufo-lutescens, intus pallidior; odoris gravis, nauseosi; saporis subamaricantis nauseosi, plerumque in glebulis nucis Avellanae vel Juglandis magnitudinis conglutinata. Rejiciantur glebae fuscae, nigrae, multis quisquiliis commixtae. Adfertur praesertim ex Asia nec non ex Europa australi.

ORIGANUM. Bild Mairan; Tostkonning; Rosponz Skaarefonge; Bergfonge; Bergmynte; Skovmynte; Skar-mynte; Klevhumle; Bildmynte. Brauner Dosten; Wintermajoran.

*Origani vulgaris*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA cum floribus, in dumetis crescens, mense Julio colligenda. Odorem habet tam sicca quam recens fragrantem, ad Majoranum accedentem; saporem acrem aromaticum. Flor. Dan. Tab. 638.

OVA GALLINAE. Hønsæg. Høneræg.

*Phasiani Galli*, Linn. Cl. II. ovi Gallinae ALBUMEN. Saporis fatui, gelatinosi.

Ejusdem VITELLUS. Pars flava ovi, saporis gelatinosi.

OXYCOCCOS. Tranebær. Moosbeeren.

*Vaccinii Oxycocci*, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., BACCÆ sphaericae, laeves, eleganter coccineae. Odor nullus; sapor acidulus substypticus. Planta in paludibus ubique proveniens. Flor. Dan. Tab. 80.

PAPAVER ALBUM. Hvid Balmue. Weisser Mohr; Mohrsaamen.

*Papaveris somniferi*, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., SEMEN, varietate album, globosum, minimum, reniforme, oleo dulci repletum.

PASSULAE MAJORES. Rosiner. Rosinen.

*Vitis viniferae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., UVÆ, solem passae et siccatae. Eligantur longae, pauca continentia semina, torosae, pingues, tenera cuticula tectae, lumini admotae paucillum pellucidae, in fictilibus sub

denominatione *Petrosuæ* allatae. *Damascenæ* et *Syriacæ* præstant præ *Hispanicis* et *Italicis*. Saporem habent subacidulo dulcem.

PASSULÆ MINORES; CORINTHIACÆ. *Corender*. *Kleine Rosinen*; *Corinthen*.

*Vitis apyrenæ*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FRUCTUS. *Uvae* maturæ et siccatae, magnitudine feminis *Pisi*, subrotundae, rugosae, molles, subaccharatae, undique lucidiusculæ, fuscae; parenchymate pulposo. Odor vix ullus. Sapor dulce-acidulus. Frutex in variis Insulis Maris mediterranei proveniens.

PECHURIM f. PECURIM-FABA; PECAIRO. *Pichurimbonne*. *Pichurimböhne*; *Brasilianische Bohne*.

*Lauri Pechurim?* Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., FRUCTUS. *Amygdalæ* majoris per longitudinem dissectae et excavatae, similitudinem referens; coloris nigricantis, tenui epidermide tectus, longitudinis unius, latitudinis dimidii pollicis; intus coloris fusci instar nucis *Moschatae*; odoris et saporis ex nucis *Moschatae* et ligni *Sassafras* mixti. Expressione spissum et album oleum, odoris *Sassafras* largitur. Ex *Brasilia* et *Paraguai* adfertur. Spuria faba *Pechurim* verae substituitur, longe majoris magnitudinis: extus est rugosa et pallidior, intus vero obscurioris coloris, uti et durior atque amarior, sed minus aromatica, adeoque est rejicienda.

PETROLEUM ALBUM; OLEUM PETRAE ALBUM. *Hvid Steenolie*; *Peterolie*. *Weisses Stein- oder Bergöl*.

*Bitumen Petroleum* est bitumen liquidum levissimum et fluidissimum, *Naphta* dictum, e terra aut rimis saxorum exsudans, aquae et spiritibus, si purum sit, supernatans, facillime inflammabile, celerrime avolans, cum flamma ex flavo coerulecente, et spisso multum fuliginis deponente fumo ardens, in aethere aliisque, non autem in spiritu vini et aqua solubile. Odoris et saporis est penetrantis, haud ingrate aromatici, Oleo *Succini* rectificato similis. Adfertur ex insula *Sumatra*, *Persia* et ducatu *Modenensi*, sed rarissimum est.







PETROSELINUM. Persille. Petersilien.

*Aprii Petroselini*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN recens, viride, oblongum, striatum, parvum, graveolens, odoris et saporis calidi et aromatici. Sufficit nostras, et recens praestat prae vetusto Petroselini Macedonici (Bubonis Macedonici) semine.

PHELLANDRIUM; FOENICULUM AQUATICUM. Wandsennel. Wasserfennikel; Peersaat.

*Phellandrii aquatici*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., SEMEN oblongum, striatum, odoris gravis ingrati, saporis aromatici, acris, medium inter Angelicam et Levisticum tenentis. Planta biennis, in fossis, ad lacos haud infrequens. Flor. Dan. Tab. 1154.

PIMPINELLA ALBA. Quæscurt; Biergroed; Pimpinelle. Bibenell.

*Pimpinellae saxifragae*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., RADIX perennis, tenuis, fibras minores maxime e capite crassiore emittens; coloris extus pallide flavescens, intus albicans; odorem habet recens Radix fragrantem, sternutationem facile inducentem, saporem intense acrem, calidum; in siccis, sabulosis ac saxosis affatim germinans. Eligatur recens, tenax, saporis eximie pungentis. Inertior est quae in pratis humidisque crescit locis. Flor. Dan. Tab. 669.

PIPER INDICUM V. HISPANICUM. Spanisch Peber. Spanischer, Indischer oder Türkischer Pfeffer.

*Capfici annui*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FRUCTUS, bacca exsucca plerumque turbinata, subincurva, coccineo rubra, nitida. Semina minuta utrinque compressa, glabra, pallida, sapore acerrimo pungente diu inhaerente, ex America meridionali allata.

PIPER NIGRUM. Sort Peber. Schwarzer Pfeffer.

*Piperis nigri*, Linn. Cl. II. ord. Trigyn., Sirium Rumphio dicti, BACCÆ monospermae. Eligantur grana magna, compacta, ponderosa, non

rugosa. Aliquem odorem specificum, et vehementer calidum vel igneum saporem habent. Est immatura et viridis bacca, cujus color sub exsiccatione obscuratur, cum e contra *Piper album* sit bacca plane matura et cortice spoliata.

PIX LIQUIDA. Vid. *Terebinthina*.

PIX SOLIDA. Vid. *Terebinthina*.

PLUMBUM. Blye. Bley.

Plumbum, metallum ex albo coerulescens, ductile, molle, via sicca oxygenium facile attrahens, et acido acetico nuptum sapore subdulci praeditum.

PLUMBUM CARBONICUM. Vid. *Cerussa alba*.

PLUMBUM OXYDATUM. Vid. *Lithargyrium*.

POLYGALA AMARA. Korsblomster. Kreuzblumen.

*Polygalae amarae*, Linn. Cl. XVII. ord. Octandr., PLANTA perennis, in regionibus australibus crescens. Odor nullus; sapor amaricans, acidulus, mucilagineus.

Ejusdem RADIX. Odoris et saporis ejusdem, nisi quod sapor in radice emineat. Flor. Dan. Tab. 1169.

POLYPODIUM. Engelsødt; Gegebregne; Mariebregne; Steensøte; Sysselroet; Heilsøta. Engelsøf.

*Polypodii vulgaris*, Linn. Cl. XXIV. ord. Filic., RADIX, in silvis et ad muros antiquos frequens, perennis, fibrosa, geniculata, ad radices quercuum et in rudetis locisque ficcis germinans; extus e spadiceo fusca, intus obsolete viridis; compagis tenacis; odoris nullius; saporis praedulcis, remissioris quam Liquiritiae. Flor. Dan. Tab. 1060.

POPULUS. Poppelspil. Pappelbaum.

*Populi nigrae*, Linn. Cl. XXII. ord. Octandr., OCULI. Gemmae nondum evolutae, succo flavesciente balsamico turgidae, odoris fragrantis, saporis amari, Aprili mense decerptae. Praestant recentes.







PRUNA. Blommer. Pflaumen.

*Pruni domesticæ*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., DRUPAE siccatae, torosae et carnosae, sine ingrato a fumigatione odore. Pulpam acido-dulcescentem largiuntur.

PRUNEOLA. Bruneller. Prunellen.

*Pruni Brignolensis*, Linn. Cl. XII. ord. Monogyn., DRUPAE. A nuce separatur caro. Sint recentia, semipellucida, coloris e buxco spadicei, mollia, humidula; odoris debilis; saporis acidulo dulcescentis. Afferuntur e Gallo-provincia.

PTARMICA. Hvid Regusan. Weißer Bertram; Weißer Reinsfarren; Wiesendragum.

*Achilleae Ptarmicae*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., RADIX. Planta perennis, in pratis subhumidis crescens, lignosa, capillata, inodora; saporis acris ad radicem Pyrethri accedens. Flor. Dan. Tab. 643.

PULSATILLA NIGRICANS. Sort Roebielde. Schwarze Kückenschelle.

*Anemomes pratensis*, Linn. Cl. XIII. ord. Polygyn., PLANTA perennis vernalis, in sterilibus campis crescens; odoris vix ullius; saporis acris, inhaerentis, masticando linguam corrodentis. Flor. Dan. Tab. 611.

QUASSIA. Bestindisch Bittertræ; Quassietræ; Quassiebarck. Surinamisches Bitterholz; Westindisch Bitterholz; Quassienholz.

*Pitcramiae excelsae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., LIGNUM subalbidum, compactum et valde amarum, praecipue Radicis. Arbor in insulis Antillis ad oras fluviorum crescens. Nullius est odoris; saporis autem intense amari, praesertim in cortice radice.

QUERCUS. Egetræ. Eidenbaum.

*Quercus roboris*, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., FOLIA tenella. Arbor ad nostrates pertinet; saporem acerbum stypticum habet.

Ejusdem CORTEX sit extus cinereus, hinc inde albescente musco obfi-

tus, intus autem ex albo flavescent, a ficcatione fuscus evadens. Odorem satis notum habet, et saporem adstringentem amarumque.

GLANDES Quercus. Hujus arboris fructus maturi absque cupula. Nux ovalis cupulâ triplo longior; testa pergamena, laevis, nitidiuscula, fragilis, coloris straminei; nucleo extus rugoso, bipartibili, solido, pallido. Odor nullus; sapor acerbus stypticus.

**R**APHANI OLEUM. Noe: Olie. Rüb: Del.

*Brassicae Rappae*, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., OLEUM e seminibus expressum, recens non rancidum.

RAPHANUS RUSTICANUS. Vid. *Armoracia*.

RESINA COMMUNIS. Vid. *Terebinthina*.

RESINA ELASTICA; CAOUTCHOUC. Elastisch Harz. Lederharz; Elastisches Harz; Federharz.

*Jatrophae elasticae* vel aliarum arborum Indiae occidentalis, RESINA, obscure spadicea vel lutea, opaca vel pellucida, mollis, elastica; odoris nullius; saporis debilis, facillime et plane in aethere sulphurico solvenda.

RESINA GUAJACI. Vid. *Guajacam*.

RESINA JUNIPERI. Vid. *Sandarach*.

RHABBARBARUM; RHEUM. Rhabarber. Rhabarber.

*Rhei palmati*, Linn. Cl. IX. ord. Trigyn., RADIX tuberosa, cum duritie aliqua fragilis, levis, probe sicca, externe dilute lutea, digitum flavedine non inficiens, interne dilute crocea cum albis et rubellis venulis, nucis Moschatae instar. Eligatur variegata, ex Asia advecta. Odorem habet sicca gravem, specificum, subnauseosum; saporem amaricantem, subnauseosum, subacrem, cum adstrictionis aliquo sensu, salivam flavedine tingentem. Quae ex China adfertur, est RADIX *Rhei undulati* Linn.

RHAMNUS CATHARTICUS; SPINAE CERVINAE BACCÆ. Rorsbær; Brietorn; Viebær; Hiortebær; Teitelbær. Kreuzbeeren; Weichsdoornbeeren.





*Rhamni cathartici*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., BACCAE, femine triangulari et succo e purpureo viridescente, ab aliis baccis admixtis distinguedae. Odoris recentium baccarum, Padi similis; saporis primum dulcescentis nauseosi, odori congrui, deinde substyptici. For. Dan. Tab. 850.

RHEUM. Vid. *Rhabarbarum*.

RIBESIA NIGRA. Soelbær. Gichtbeeren.

*Ribium nigrarum*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA, tenera, subcordata, trilobata, subtus punctis elevatis, luteis, aspersa; odore fragrante peculiari, odorem lotii felis haud male referente; sapore subaustero.

BACCAE ejusdem nigrae, odoris debilioris ac saporis dulcescentis acidulo-subsalis. Flor. Dan. Tab. 556.

RIBESIA RUBRA. Rode Ribb. Rothe Johannisbeeren.

*Ribis rubrae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., BACCAE. Odoris vix ullius; saporis subvinosi, dulcescentis aciduli, globosae, rubrae, subdiaphanae.

RICINUS VULGARIS. Vid. *Cataputia major*.

ROSA INCARNATA. Rød Rose; Syldrose. Rothe Rosen.

*Rosae centifoliae*, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., FLORES. Petala pallide rubentia, odoris gratissimi et saporis subadstringentis, evitacione flaminum, germinum atque calycum, ante plenam evolutionem colligantur.

ROSA RUBRA. Ediferosc. Essigrosce.

*Rosae Damascenae*, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., PETALA, ex fusco rubentia, odoris grati, saporis adstringentis. Rejiciantur stamina, germina, uti etiam folia calycina.

ROSMARINUS. Rosmarin. Rosmarin.

*Rosmarini officinalis*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA; odoris fragrantis, fortis; saporis calidi, acris, camphoracei.

Ejusdem FLORES.

ROSMARINUS SYLVESTRIS. Wild Rosmarin. Wilder Rosmarin; Heidebienenkraut; Post.



*Ledi palustris*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., FOLIA, in paludibus uliginosis provenientia, mense Junio colligenda; odorem habent gravem, subaromaticum, saporem subamarum, subadstringentem. Flor. Dan. Tab. 1031.

RUBIA TINCTORUM. Rrap. Kreppe; Färberröthe.

*Rubiae tinctorum*, Linn. Cl. IV. ord. Monogyn., RADIX perennis, repens, geniculata, recens, non nigra aut maculis interspersa, sed eleganter et dilute rubens, atque, quantum fieri potest, a parenchymate lignoso liberata. Odor contusae fere incidens in corticem Sorbi; sapor subamarus.

RUBI CHAMAEMORI BACCAE. Multebær; Myrebær; Læmanaf; Latoch; Laddoch. Pautkenbeeren.

*Rubi Chamaemori*, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., FRUCTUS, e Norvania advecti. Odoris vix ullius; saporis aciduli. Flor. Dan. Tab. I.

RUBUS IDAEUS. Himbær; Hindbær; Bryngebær. Himbeeren; Hindbeeren; Hohlbeeren.

*Rubi Idaei*, Linn. Cl. XII. ord. Polygyn., BACCAE rubrae vel pallide luteae, conico hemisphaericae, ex acinis succulentis subrotundis, monospermis, serie triplici vel quadruplici annulari dispositis, constructae; odore fragrantē, sivecolente, gratissimo; sapore grate acidulo, odori congruente. Flor. Dan. Tab. 788.

RUTA. Rude. Raute; Weinraute.

*Rutae graveolentis*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., HERBA, in hortis culta; odorem habet fortem, gravem; neque tamen ingratum; saporem amarum, gravem, acrem. Uterque in ficcata herba debilior. Recens inprimis adhibenda.

SABADILLA. Sabadillehorn. Sabadillhörner; Mexicanischer Lausesaamen.

*Veratri Sabadillae?* Linn. Cl. XXIII. ord. Monocc., SEMEN oblongum, subcylindricum, figura et colore nigricante Muscerdam referens, propria





tanica obvelatum, e regno Mexicano allatum. Odor vix ullus, sed pulverisati vehemens errhinus; sapor capsulae ipsius nullus, seminum vero acerri-  
mus, amarissimus, acrimonia diu inhaerente, etiam si fauces aqua frigida  
probe eluantur, cum sensu intermixto subdulcis saporis.

SABINA. Sevenbom. Sadenbaum; Serwenbaum.

*Juniperi Sabinae*, Linn. Cl. XXII. ord. Monadelph., FOLIA, vel potius  
frondium apices, verno inprimis tempore collecti, siccati. In hortis colitur.  
Odoris gravis, resinosi, ingrati; saporis amari, calidi.

SACCHARUM. Suffer. Zucker.

*Sacchari officinalis*, Linn. Cl. III. ord. Digyn., SAL essentiale, ex Indiis  
et America allatum. Crudum neque denuo depuratum, farinaceum, Pud-  
dersuffer, Moscovade; repetita solutione, addita calce crystallisatum, *Canariense*,  
*Fünfsin*; in grandiores denique crystallos redactum, *Candum flavum*,  
Suffer-Candis vocatur. Sal essentiale dulcissimum, sapidissimum, solubi-  
le; solvitur in aqua, difficiliter in vino, difficillime in spiritu vini.

SACCHARUM LACTIS. Melksuffer. Milchzucker.

Seri lactis, quod sponte e lacte secessit, SAL essentiale, ex Helvetia  
plerumque allatum, constans crystallis parvis, semipellucidis, aegre solubili-  
bus, coloris laetei, saporis debilis saccharini et terrestris. Advehitur in fru-  
ctis variae magnitudinis, supra crystallisatis, infra glabris, praestans venali  
pulverato, saccharo communi intermixto.

SAGAPENUM. Sagapen-Gummi. Sagapen.

*Ferulae?* cujusdam GUMMI RESINA, in Media, Persia, aliisque orien-  
talibus regionibus proveniens. Eligatur granulatum, translucidum, extus  
fulvi aut rufi coloris, intus dilutioris; odoris fortis, ingrati, alliacei; sapo-  
ris gravis, amaricantis, calidi et acris, ad Porrum accedentis. Rejiciantur  
glebae coneretae et veluti fusae, coloris obscuri, sordidi.

SAL ACETOSELLAE. Vid. *Acetosella*.



SAL ANGLICUM; SAL CATHARCTICUM; SAL EBSHAMENSE; MAGNESIA SULPHURATA ANGLICA. Engelsf Lagersalt. Englisches Lagersalt.

Est *sal medium terrestre*, e pura Magnesia et acido sulphurico constans. Elicitur e fonte Ebshamensi v. Seidlitzensi, vel ex ultimo salis marini lixivio. Cryсталlos habet teneros aciculares. Solubile est in triplo aquae purae. Saporem habet falsum amaricantem.

SAL GEMMAE; SAL CULINARE; NATRUM MURIATICUM. Steensalt. Steinsalt.

*Muria fossilis* pura, ex acido muriatico et natro constans, semipellucida, post longum satis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans, percussa in cubos minores, attamen regulares, diffiliens. Saporem habet falsum, sali communi perfecte similem. Coloris rubelli vel alius alieni rejiciatur.

SAL SEIDLICENSE. Seidligersalt. Seidligersalt.

Ex iisdem, quibus Anglicum, partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album et crystallifatum.

SALAB; SALEB. Salab; Salaprod. Salapwurzel.

*Orchidis morionis, militaris, maculatae, pyramidalis, latifoliae*, Linn. Cl. XX. ord. Diandr., RADICES perennes, figurae ovalis vel palmatae, semipellucidae, coloris e griseo-albi. Odoris, dum recentes sunt, hircini; saporis vix ullius, bulbus masticatus mucilaginosus, fere insipidus. Orchis morio Flor. Dan. Tab. 253. maculata Tab. 933. latifolia Tab. 266.

SALIX. Piiß. Weiden.

*Salicis albae, pentandrae, fragilis, vitellinae*, Linn. Cl. XXII. ord. Diandr., CORTEX levis; odoris balsamici et saporis adstringentis amari. Salix pentandra Flor. Dan. Tab. 943.

SALVIA. Salvie. Salbey.

*Salviae officinalis*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., FOLIA adultiora effica-







ciora. Planta perennis, hortensis; odoris fortis, graviusculi; saporis amaricantis, aromatici, calidi.

SAMBUCUS. *Hylb.* *Hollunder*; *Slieber*.

*Sambuci nigrae*, Linn. Cl. V. ord. Trigyn., CORTEX, verno tempore detrahendus, melior qui externum cinerei coloris sequitur, viridis; odor recentis ingratus, virosus; sapor primum dulcescens, deinde amaricans, acris, nauseosus. Arbor in Dania frequentissima.

Ejusdem FLORES odorem habent fortem, non ingratum, saporem amaricantem mucilaginosum. Siccentur celerrime.

Ejusdem BACCAE, magnitudinis feminis Pisi minoris. Recentium odor debilior; sapor acidulus. Succum viridescentem, rubicundum, non ingratum largiuntur. Flor. Dan. Tab. 545.

SANDARACH; SANDARACA; GUMMI JUNIPERI. *Enebær*; *Gummi*. *Wachholderhar*; *Firnif*.

*Juniperi vel communis vel Oxycedri* (secundum Cl. Schousboe *Thujae articulatae*), Linn. Cl. XXII. ord. Monadelph., RESINA, ab ora Africae advecta. Eligantur grana pura, albicantia, ex albo citrina, splendida, pellucida, odoris grati, mastigini; saporis debilis. In spiritu vini perfecte solvitur, sed non in aqua; in oleo expressio solvitur imperfecte.

SANGUIS DRACONIS. *Drageblod*. *Drachenblut*.

*Calami Rotang.*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RESINA, e fructibus exsudans, iisque superinducta indurefcens, quae deinde calore emollita in baculos oblongo-compressos vel in globulos oviformes, magnitudine nucis Myristicae formatur, qui singulatim concatenatimque arundine involuti, ex India orientali advehuntur. Genuina est fragilis, externe obscure badia, interne dilutior, trita eleganter Kermesina, fractura laevis, subgranulosa, nitens, opaca, in frustis minoribus autem subdiaphana; odoris et saporis nullius. Carbonibus ignitis injecta liquefcens, ebulliens, nigrescens, odorem substoracinum spargens. Masticata et in aqua insolubilis; in spiritu vini

rectificato vero solvitur. Vilior est, quae decoctione e nucleis contusis extrahitur. Quae e variis resinis composita, sanguine hirci aut pigmentis terreis commixta, ligno brasiliensi aut Draconis resina tincta, et in tabulis vel in massis informibus redacta, rejicienda.

SANTONICUM. Vid. *Cina*.

SAPO ALICANTINUS. Spanst Sæbe. Spanische Seife.

Ex oleo olivarum atque lixivio, quod e binis Sodae, una calcis vivae partibus paratur, coctione inspissatus SAPO, maximam partem Marfiliae confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos pinguedine non inquinans, neque ingrato rancidoque odore, corruptam pinguedinis adhibitae indolem prodens. Rejiciatur variegatus, nec unquam usibus internis inserviat, quippe Auripigmenti non exiguam quantitatem admixtam habens. Praestat vero Sapo Alicantinus prae Veneto.

SAPONARIA. Sæbeurt. Seifenkraut.


*Saponariae officinalis*, Linn. Cl. X. ord. Digyn., RADIX perennis, ramosa, geniculata, repens, ad rivos, fossas et in humidis habitans, verno tempore collecta. Saporis sit dulcis primum et glutinosi, deinde acris, amaricantis. Non confundatur cum radice Lychnidis Dioicae aut Cucubali Behen. Flor. Dan. Tab. 543.

SARSA; SARSAPARILLA. Sarsaparil. Sarsaparill.


*Smilacis Sarsaparillae*, Linn. Cl. XXII. ord. Diandr., RADICES tenues, longae, ex America australi advectae, parum rugosae; sub cortice ex rubello viridescente, materiam albam ramentosam, quae medullam ligneam cingit, continentes. Sapor farinosus est, vix amaricans, obvolvens. Durae fragiles, lignosae, farinaceae, rejiciantur.

SASSAFRAS. Cassafraß. Fenchelholz.

*Lauri Sassafras*, Linn. Cl. IX. ord. Monogyn., LIGNUM cum CORTICE. Lignum sit obsolete rubrum, leve, spongiosum; odoris foeniculi, tectum, cortice ferrugineo aspero; saporis foeniculi, sed validioris. Prunis injectum







crepitet instar falis communis. Vis major inest frustis ramusculorum, inprimis radicunt parvarum dilutioris coloris, quam truncis majoribus. Advehitur ex America.

SCAMMONIUM. Scammonium. Scammonium.

*Convolvuli Scammoniae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., succus gummoso-refinosus, ex Oriente allatus. Eligendum Scammonium Aleppense, leve, spongiosum, friabile; e gilvo aut murino pullum cum splendore aliquo; in pulverem redactum ex albo cinereum; aqua aut saliva solutum, ex obsoleto viridi aut cumatili lactescens; odoris ingrati, vinosi; saporis acris, nauseosi. Rejiciatur Smyrnense e variis aliis Convolvuli speciebus plantisque lactescentibus, *Efulae*, *Tithymaloides*, *Apocyni*, *Periplocae* etc. sobole coactum, impurius, gravius, nigricans, non adeo friabile, parum olidum. Sed neque Aleppense castum semper purumque, verum callidis artibus ita adulteratum adfertur, ut contracta labes cognosci nequeat. Hoc solum scimus, nonnunquam interponi Scammonium Monspeliacum (*Cynanchi Monspeliaci* succum lactescentem, coctione inspissatum) paulo gravius magisque nigrum, sed virtutis catharticae debilioris.

SCARABAEUS UNCTUOSUS MAJALIS. Oliebille. Maywurm; Maykäfer.

*Meloë Proscarabaeus*, Linn. Cl. V. ord. Coleopter., corpore violaceo, in apricis campis habitans, vivus melli immerfus, capite detruncato.

SCORDIUM. Logurt. Fackenfneblaudh.

*Teucrii Scordii*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA, in paludosis germinans, mense Junio colligenda; odorem habet Allium cum levi Aromate spirantem; saporem intense amarum. Flor. Dan. Tab. 593.

SENEGA. Senega. Senega.

*Polygalae Senegae*, Linn. Cl. XVII. ord. Octandr., RADIX, ex America septentrionali advecta, tenuis, fusiformis, vertice nodoso, crista laterali acuta; saporis primo farinacei, mox subacidi, denique acris pungentis.

SENNA. Senne. Semsblätter.

*Cassiae Sennae*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., FOLIA, ex Arabia aut Alexandria advecta. Sint e luteo subviridia, parva, subovata, in apice multum acuminata, molliuscula tactu, non ingrante olentia; saporis subacris amari, aliquantum nauseosi. Alexandrina folia sunt optima, viridia cum suffuso flavo. Impura, maculata, e rufo flava rejiciantur. Virtute ad Sennam Alexandrinam accedit, sed eam nullo modo aequat Senna Tripolitana, cujus folia elegantius sunt viridia, non adeo acuminata, et digito tentanti subhirsuta videntur, sunt majora, plane viridia, superius obtusa. Deterioris adhuc notae est Senna Italica et Gallica, cujus folia latiora et obtusiora, laetius virentia et magnis venis praedita, caeteris debiliora; saporis subdulcis sunt et glutinosi. Saepe cum Colutea arborescente Linn. adulterantur.

SERPENTARIA VIRGINIANA. Slangeurt. Virginische Gifswurzel.

*Aristolochiae serpentariae*, Linn. Cl. XX. ord. Hexandr., RADIX, e capite nodoso, fibroso praemorsa, in Virginia et Carolina habitans; coloris extus e gilvo viridescens, intus pallide lutei; odoris fragrantis, gravis, e Valerianae Camphoraeque odore confusi; saporis acris pungentis.

SERPILLUM. Bild Thymian; Bor Frue Sengehalm. Quendel; Marien Bettstroh.


*Thymi Serpilli*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA florens, mense Junio et Julio colligenda. Suffruticulus in apricis et aridis habitat. Odorem habet fragrantem, gratumque; saporem aromaticum subamarum. Flor. Dan. Tab. 1165.

SEVUM BOVINUM. Dyretalg. Rindstalg.

SEVUM CERVINUM. Hiortetalg. Hirschstalg.

SEVUM OVILLUM f. VERVECINUM. Faaretalg. Schaaftalg.

Pinguedo solida ex omento et capsulis adiposis praesertim renalibus et lumbalibus horum animalium eliquata.







SILIQVA HIRSUTA. Klsende Bonne. Zuckende Jasel; Kuhfräse.

*Dolichi prurientis*, Linn. Cl. XVII. ord. Decandr., LEGUMINA, ex utrisque Indiis advehuntur, coriacea, longitudine trium ad quinque pollicum, crassitie digiti, extus fetis rigidis e rubro fuscis undique obsita.

SIMARUBA. Simarube. Simarube; Kührinde.

*Quassiae Simarubae*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., CORTEX, e Guajana, Jamaica et aliis insulis Americae meridionalis advectus, tum truncò, tum radici detractus. Qui a radice deglubitur praestantior est, et fibris succifis distinguitur. Est coloris dilute gilvi, tenax et flexilis fere, ac sequax; saporis amaricantis et leniter adstringentis. Pars lignosa adhaerens, ut iners abjiciatur; neque vetustior, lignosus et obscuri coloris cortex, servandus est.

SINAPIS. Sennep. Senf.

*Sinapis nigrae et albae*, Linn. Cl. XV. ord. Siliquos., SEMEN exiguum, globosum; odoris debilis; saporis subamari, acris, fervidi. Planta annua, fera et hortensis, maxime in Anglia colitur.

SODA; NATRUM-CARBONICUM. Soda. Soda; Glaschmalz; Aschsalz.

*Soda Hispanica* concrementum refert cinereum, e combustis plantis maritimis ortum. Natrum carbonicum elixando inde obtineri solet.

*Soda Hungarica*, quae nativa est, in Hungariae nonnullis lacubus siccatif sponte efflorescens, depuratione Natrum carbonicum praebet.

SOLANUM. Swineurt; Soebær. Nachtschatten; Saukraut.

*Solani nigri*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA recentia, mense Junio colligenda. Odorem habent foetidum; saporem herbaceum, subfatuum. Flor. Dan. Tab. 460.

SOLANUM FURIOSUM. Vid. *Belladonna*.

SOYMIDA. Soymidatræ. Soymidenbaum.

*Swieteniae Soymidae* f. *febrifugae*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., CORTEX,

in frustis variae magnitudinis subconvolutis ex india orientali allatus, crassus, durus, brunneco-rufus, externe cinerascens, interne cinereo-rufescens, fractura subfibrosa. Odor debilis, gratus; sapor primo adstringens, deinde amarus, diu inhaerens.

SPATUM PONDEROSUM; BARYTA SULPHURICA NATIVA.  
Lungspat. Schweerspat.

*Sulphas Barytae* est SAL medium terrestre, acido sulphurico et Baryta pura constans. In metallifodinis Hercyniae, Saxoniae aliisque, venas implet. Eligantur frustulae albae, lamellofae, heterogeneis minus inquinatae. Baryta acido sulphurico nupta, in aqua plane insolubilis est.

SPIGELIA ANTHELMIA. Amerikanfß Ormeurt. Amerikanisches Wurmkraut oder Spigelia.

*Spigeliae anthelmiae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX CUM HERBA. Radix fibrosa. Caulis simplex erectus. Folia oblongo lanceolata, quaterna. Racemus terminalis. Odor nullus; sapor amaricans. Ex insulis Caribaeis adfertur.

SPIGELIA MARILANDICA. Marilandfß Ormeurt. Mariländisches Wurmkraut oder Spigelia.

*Spigeliae marilandicae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., RADIX CUM HERBA. Radix nodulosa, fibrosa. Caulis simplicissimus, obsolete tetragonus. Folia ovata, oblonga, sessilia, opposita, remota. Racemus terminalis. Odor et sapor, vasis lignei aqua corrupti. Ex America septentrionali advecta.

SPINA CERVINA. Vid. *Rhamnus catharticus*.

SPIRITUS VINI. Brandevin. Brandtwein.

Spiritus inflammabilis, destillatione e Vino; Vini foecibus, Cerealibus, Syrupo de Saccharo defluente etc. prolicitus. Ad Tincturas aliaque Medicamenta paranda, non nisi spiritus vini gallicus, isque probe rectificatus, adhibeatur.





SPONGIA. Swamp. Schwamm.

*Spongia officinalis*, Linn. Cl. VI. ord. Vermes, Zoophyta. Est habitaculum vermis ZOOPHYTI vel POLYPTI cellulofum, in mari Mediterraneo et Rubro magna quantitate reperiundum album, vel coloris citrini, pluribus exiguis foraminibus pervium, elasticum, leve; odoris proprii minus grati; faporis expers.

SQUILLA f. SCILLA. Strandfog. Meerzwibel.

*Squillae maritimae*, Linn. Cl. VI. ord. Monogyn., RADIX bulbosa, tunicata, recens, torosa, ponderosa, intus albicans; odoris vix ullius; succo, acri, glutinoso, peramaro dives; non decolor, neque attrita, neque defricata. In ora maris Mediterranei sponte provenit.

STANNUM. Zinn. Zinn.

Stannum est omnium metallorum levissimum, parum tenax, facile malleabile, vix elasticum, molle, flexile; in acidis ac alcalibus solubile. Odor inter manus fricti, peculiaris, fapor metallicus. Cum Acido nitrico Oxydum album valde refractarium constituens.

STIBIUM. Vid. *Antimonium*.

STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM. Vid. *Antimonium*.

STORAX CALAMITA. Storax. Storax.

*Styracis officinalis*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., GUMMI RESINA, e Syria et vicinis locis allata, cujus optima species, arundine excepta, Canulata vel Calamita dicta, rarissime prostat et valde pretiosa est. Nostri in officinis vulgo illa tantum species occurrit, quae e lignorum ramentis et ferragine, Styracis ope conglutinatis constat, et *Scobs Storacina* dicitur, cui vero styracis paucum inest, cum jam maximam partem expressa, pro conficiende Storace granulata, ad nos perveniat. Pro usu medico praeferenda Storax in granis, scil. lacrymis albicantibus, luteis, rubentibus, variegatis, faveo-lentibus, compagis densae, in ore tenacibus pinguiusculis; faporis grati pungentis, in grumos vel massas e flavo rubroque fuscas coalitis, nullo tamen



ferragine intertextis. Storax liquida vera, lacryma arboris nativa, ad nos non pervenit, sed e Storace, vino aut oleo soluta, cum Terebinthinae additione effingitur.

STYRAX LIQUIDA. *Styraxbalsom.* *Styraxbalsam.*

*Liquidambaris Styracifluae*, Linn. Cl. XXI. ord. Polyandr., LACRYMA resinosa, e nova Hispania et America septentrionali advecta. Quod in officinis Storacis liquidae titulo insignitum proflat, magnum est, factitium, e cinereo spadiceum aut pullum, opacum, unctuosum, e Terebinthinae oleo vinoque compositum, cui storacis ficcae pauxillo addito, ambrosiacus ejus odor conciliatus fuit. Sincera et nativa Storax liquida, veteribus celebrata, nunquam ad nos pervenit. Colligitur in maris rubri insula Cobro, Moccamque adfertur, quo ipso loco rara est et praecara. Est vero pelucida, coloris rubelli aut e murino fulvi, et valde fragrans. In hac genuinae Storacis inopia, Americana accipitur, limpida, coloris ad lucem aurei, et fragrantissima.

SUCCINUM, ELECTRUM; CARABE. *Bernsteen;* *Nav.* *Bernstein.*

Substantia bituminosa, flava et alba, e terra effossa, aut ad littora maris Baltici collecta. Est densa et fragilis, propter suam duritiem tornari, caedi, et poliri sese finit. Prunis injecta gratum dispergit odorem. Fractura splendens; insipidum; quando fricatur attrahit corpora levia, et fit electricum. In aqua nullam habet solubilitatem, et spiritus vini exiguum portionem Resinae extrahit. In aethereis et pinguibus oleis non solvitur, nisi pro parte in carbonem mutatum. Ex Jutia, Insula Moën, Prussia, Polonia et Pomerania adfertur.

SULPHUR CITRINUM f. VULGARE. *Gul Schwel.* *Gelber Schwefel.*

Comburendo oxygenio nuptum acidum sistit sulphuricum. Occurrit in Islandia, Italia, Hispania, Germania, Helvetia et aliis locis nativum. Recipi





debet flavum in cylindris fufum, quod quidem *citrinum* dicitur, aut vivum aut in flores fublimatum. Eft folidum, friabile, leni igne liquetfcens, colore rubro, ardens flamma coerulea vapore forti fuffocante. Odor, nifi fricetur, nullus: accenfus acidus, penetrantiffimus; fapor, modo purum fit, nullus.

SWITENIA MAHAGONI. Mahagonitræ. Mahagonibaum.

*Swieteniae Mahagoni*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., CORTEX, flratis alternantibus rubris et albidis variegatus, epidermide flavefcence rugofa fubcoriáceo obductus. Odor debilis, fubaromaticus. Sapor valde adstringens et amarus. Arbor procerus in infulis Indiae occidentalis copiofe crefcens.

LIGNUM ejusdem badium, durum, ponderofum; odoris vix ullius; faporis amaricantis.

TABACUM; NICOTIANA. Tobak. Toback.

*Nicotianae Tabaci*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FOLIA probe ficca, flava, nondum contorta; faporis peramari, odoris fubnaufeofi. Exficcata fufcum induunt colorem.

TACAMAHACA. Haf og Taf. Haf und Taf.

*Fagarae octandrae*, Linn. Cl. IV. ord. Monogyn., in Curacao Americae et in infula Francia crefcentis, GUMMI RESINA aromatica, vel lutefcens, vel e luteo viridefcens, e cortice vulnerratae arboris exfudans, et in pericarpis cucurbitinis collecta. Odorem habet gratum, fragrantem, validum; in flores Lavendulae incidentem; faporem leniter amaricantem, naufeofum.

TAMARINDUS. Tamarindetræ. Tamarindenbaum.

*Tamarindi indicae*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., ex filiquis deprompta PULPA, e fufco nigricans, vifcida et quafi fubpinguis, filamentis lignofis, feminibus compreffis, duris, quadratis, fpadiceis, fplendidis permixta; fa-



poris acidi vinosi, pungentis, parumque nauseosi, quibus notis facile a prunorum pulpa, ubi larga manu admixta fuerit, dignoscitur. Eligatur recens, tenax, spissa, et subrufo nigricans; saporis acrioris. Vitanda est, quae in cellis locisque humidis diu fuit recondita, quod patebit e superficie externa uda, feminibusque emollitis tumidulis, neque adeo splendentibus.

**TANACETUM.** Reinsan; Ormekrud; Landsue; Raufan; Ringesfan; Roskonge; Roud-Rollif. Reinsahren.

*Tanacetum vulgare*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. superfl., COMA florens, in aggeribus proveniens, mense Julio colligenda. Planta perennis; odorem habet fortem, gravem, acutum; saporem valde amarum aromaticum.

Ejusdem SEMEN. Reinsanfrøe; Ormekrudfrøe. Reinsahrensaamen; Gemein Wurmsaat. Flor. Dan. Tab. 871.

Istud Semen cum Cinae femine et cum herba quoad odorem et saporem convenit.

**TARAXACUM; DENS LEONIS.** Lovetand; Præstekrone; Munkehoved; Fivel; Rabbelaup; Læyerblomster. Psaffenrøhrlein; Löwenzahn; Löwenfrau; Hundebäumen.

*Leontodi Taraxaci*, Linn. Cl. XIX. ord. Polygam. aequal., HERBA. Planta perennis lactescens, ad vias et in pascuis vulgaris. Odorem nullum; saporem initio obscure dulcescentem, tum amarum habet. Herba omnis cum radice, recens in usum vocanda.

Ejusdem RADIX subfusiformis, ramosa, minimi digiti crassitie; extus subfusca, intus pallida; saporis amaricantis. Recens verno colligatur tempore. Flor. Dan. Tab. 514.

**TARTARUS VINI.** Biinsteen. Weinstein.

Succi baccarum vitis viniferae aliarumque plantarum SAL nativum, neutrum, acidulum, proprio acido et Kali constans. Spontaneo ex Vinis







secessu obtinetur, a partibus extractivis et colorantibus, coctione cum argillis et crystallifatione mundatis; vocantur Crystalli tartari. Tartarus crudus albus est aut ruber. Praestat e Rhenano vino albus, plus salis continens. Sit autem purus, ponderosus, solidus non spongiosus, externe crystallis multis puris resplendens.

TEREBINTHINA. Terpentiu. Terpentiu.

Est Balsamum resinofum naturale, coeteris resinis liquidis spissius, sponte vel e fauciato vel terebrato trunco arboris affluens, et pro arboribus, unde obtinetur, diversum.

TEREBINTHINA CANADENSIS f. BALSAMUM CANADENSE. Kanadisch Terpentiu eller Balsom. Kanadischer Terpentiu.

*Pini balsameae et Canadensis*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BALSAMUM omnium nobilissimum et praestantissimum, liquidum, pellucidissimum, albidum, aetate lutescens, in fila ductile; odoris balsamici, grati, ad balsamum Meccae accedentis; saporis mitis vix amaricantis. E Canada et aliis locis Americae septentionalis adfertur.

TEREBINTHINA LARICINA f. VENETA. Benedisch Terpentiu. Benedischer Terpentiu.

*Pini Laricis*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BALSAMUM liquidum diaphanum, consistentiae mellis vel syrapi spissioris, pallide lutescens, tenax, in fila ductile; odoris subfragrantis; saporis amari, acriusculi, resinosi, faucibus inhaerentis. Ex Europa meridionali advectum.

TEREBINTHINA COMMUNIS. Gemeen Terpentiu. Gemeiner Terpentiu.

*Pini sylvestris*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., BALSAMUM omnium vilissimum, butyraceum, opacum, sordidum, pallidum; odoris et saporis valde ingrati, non raro impurum; pro usibus medicis non adhibeatur.

Per defillationem hujus Terebinthinae communis cum aqua sufficiente, obtinetur OLEUM TEREBINTHINAE liquidum, limpidum, colore aqueo, odore fragrante.

E vulnerato vel terebrato trunco hujus arboris vel pini abietis, succus resinofus effluit, tempore hiemali rigescit, crustamque pallidam cerae haud abfimilem format, quae instrumento idoneo separatur, et super ignem lenem funditur, a fordibus purgatur, et RESINA COMMUNIS dicitur.

Si resina haec absque aqua super ignem modice coquatur, et postea coletur, COLOPHONIUM vocatur: fit fusco rubens, subdiaphanum, splendens, fragile, fractura plana nitente, odoris debilis pini, insipidum, pulveratum lutescens.

PIX LIQUIDA s. NAVALIS, quae ex ramis et lignosis partibus hujus arboris, ope defillationis per descensum obtinetur, est oleum empyreumaticum spissiusculum, consistentiae mellis vel syrupi, nigro-rubicundum, subdiaphanum, in filum subductile, odoris balsamici fumosi, saporis pinguiusculi amaricantis.

Hoc oleum sub perpetua agitatione ad siccitatem coctum, est PIX NIGRA atra, lucida, fragilis, fractura vitriformis, in calore tenax, digitis fortissime adhaerens.

TERRA JAPONICA. Vid. *Catechu*.

THUS. Vid. *Olibanum*.

THYMUS VULGARIS. *Thymian*. *Thymian*.

*Thymi vulgaris*, Linn. Cl. XIV. ord. Gymnosperm., HERBA aromatica suffrutex, in hortis colitur; colligenda mense Junio.

TILIA. *Lindetræe*. *Lindenbaum*.

*Tiliae Europaeae*, Linn. Cl. XIII. ord. Monogyn., FLORES; recentes sunt e viridi albicantes; odoris fragrans in flores Naphae incidentis, subdulcis, subnarcotici; saporis dulcis, subviscidus. Flor. Dan. Tab. 553.

TINCAL. Vid. *Borax*.







TRAGACANTHA. Tragant. Dragant.

*Astragali gummiiferi*, Linn. Cl. XVI. ord. Decandr., ex Oriente Graeciaeque insulis advectum GUMMI, vermiculorum instar contortum, purum, candidum. Rejiciatur flavescens, obscurioris coloris, in massis impuris fordidis allatum, super linguam non deliquescentis.

TRIFOLIUM FIBRINUM. Bitterblade; Bitterklover; Gedeeflov. Bitterflee; Dreyblatt.

*Menyanthis trifoliatae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., HERBA, locorum paludosorum et lacustrium incola. Foliola tenera, adhuc convoluta, succo lactescente saponaceo turgida, mensibus Majo et Junio sunt colligenda. Odoris sunt nonnihil fatui; saporis amarissimi. Flor. Dan. Tab. 541.

TURIONES PINI. Fyrrefnopper. Fichtenknospen.

*Pini sylvestris*, Linn. Cl. XXI. ord. Monadelph., GEMMAE terminales plures aggregatae, ferrugineae, undique imbricatae, squamis angustis membranaceis adpressis, margine ciliato-laceris; undique (excepto apice) contaminatae resina tenui, in frigore solidiuscula, in calore molli, digitis se adglutinante; odoris fragrantis, resinosi, graviusculi; saporis non ingrati, debilis, resinosi, amaricantis. Mense Februarii vel Martii colligenda.

TUSSILAGO. Vid. *Farsara*.

ULMUS. Alm; Elm. Ulmenbaum; Roster; Ruster.

*Ulni campestris*, Linn. Cl. V. ord. Digyn., CORTEX intermedius, subfuscus, subvimineus, e lamellis tenuibus compositus. Odor nullus; sapor amaricans, masticati valde glutinosus. Ramulorum cortex magis amaricans et magis glutinosus. Arbor excelsa et ubique culta. Flor. Dan. Tab. 632.

URTICA. Brændeneide. Brennessel.

*Urticae dioicae*, Linn. Cl. XXI. ord. Tetandr., in ruderalis crescentis  
SEMEN parvum, compressum, spadiceum; saporis subacris. Flor. Dan.  
Tab. 746.

UVA URSI. Meelbær; Meelbærus; Mielbær; Mielne-  
bær. Sandbeere.

*Arbuti Uvae ursi*, Linn. Cl. X. ord. Monogyn., FOLIA obovalia, inte-  
gerrima, obtusa, utrinque glabra, lucidiuscula, supra rugosa, subtus venu-  
loso-subrugosa, petiolata; odoris nullius; saporis styptici. In arenosis eri-  
cetis Holsatiae, Jutiae obvia. Flor. Dan. Tab. 33.

VALERIANA HORTENSIS. Stor Baldrian. Grosser Baldrian.

*Valerianae Phu*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., RADIX, in Alsatia et  
Silesia sponte crescens, in hortis nostris bene proveniens. Forma et pro-  
prietates sequenti similes, sed major atque fortior, hinc efficacior.

VALERIANA SYLVESTRIS f. MINOR. Baldrian; Dienrod;  
Valerian; Wild Rardus; Belandsrod; Benderod; Bendmos-  
rod. Kleiner Baldrian.

*Valerianae officinalis*, Linn. Cl. III. ord. Monogyn., RADIX, in pratis  
depressis et humidis proveniens, praemorsa, annulis elevatis cincta, crassitie  
pennae anserinae, apicem versus fibrosa; fibris filiformibus, teretibus, de-  
scendentibus; ex albido-fusco-cineraescens. Odor graveolens, foetidus, urinae  
felinae congruens; sapor amaro-acris, ingratus. Radices crassiores vel tu-  
berosae, lignosae, fragiles, nigrescentes, rejiciantur. Cum subtilis radice  
hujus virtus facile in auras avolet, a squalore liberata et probe sicca, in vase







vitreo probe clauso arctissime compingenda, et loco sicco frigidoque servanda est. Flor. Dan. Tab. 570.

VANILLA. Vanille. Vanillie.

*Epidendri Vanillae*, Linn. Cl. XX. ord. Diandr., FRUCTUS f. Siliqua compressa, semipcdem longa, calami scriptorii majoris crassitie; coloris ex atro fusci; odoris grati, saporis aromatici, pulpam seu medullam, cum minutissimis acinis pinguem continens. Ex America et imprimis nova Hispania advehitur. Eligendae sunt siliquae mediae magnitudinis, pingues, recentes, aromatici odoris atque saporis.

VERBASCUM. Kungels; Stodders; Wollkraut; Königsferzen.

*Verbasci Thapsi*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., FLORES, in glaucosis, sterilibus crescentes, mensibus Julio et Augusto colligendi. Saporem habent melleum, odorem suavem. Flor. Dan. Tab. 631.

VERONICA. Veronica; Krenpriis; Barsleif; Flesme-græs; Morst Thee. Ehrenpreis.

*Veronicae officinalis*, Linn. Cl. II. ord. Monogyn., HERBA. Caulis decumbens, filiformis, teres, subsimplex, pubescens. Folia ovali-oblonga, serrata, pubescentia, opposita, subsessilia. Odor debilis; sapor amaricans, subadstringens. In sylvis, dumetis et ericetis habitat. Flor. Dan. Tab. 248.

VINCETOXICUM. Vid. *Hirundinaria*.

VINUM. Wein. Wein.

*Vitis viniferae*, Linn. Cl. V. ord. Monogyn., ex uvis succus expressus, calore temperato fermentatus, et a faecibus decantatus. In Pharmacopoliis praesto sint: VINUM GALLICUM ALBUM vetustius; GALLICUM RUBRUM, lignis tinctoriis aut Myrtilli baccis non imbutum; LUSITANICUM *Oporto* di-

ctum; HISPANICUM, uti et MADERENSE et MALLACENSE, nobilius; RHENANUM vetustius, gratum, non acidi crudique saporis. Syruporum aut mellis cum vino commixtio, noto cognoscitur experimento, ubi vino repletum angustioris colli vitrum, super vas aquam continens invertitur, unde dulcem aqua nanciscitur saporem. Deleteria vero illa, a praeparatis saturninis, Bismutho, ipsoque Arsenico vino inducta labes detegitur immisto liquore vini probatorio in Parte II<sup>a</sup> descripto; quo Vinum adulteratum nigricantem aut subflavum induit colorem: vel vinum ad siccitatem evaporatur, et tunc residuum metallum detegitur.

VIOLA MARTIA. Martssfioler. Blane Märviolon.

*Violae odoratae*, Linn. Cl. XIX. ord. Monogam., FLORES, in aggeribus atque vallis frequentes: flores intense coerulei; odoris gratissimi, specifici; saporis mucilaginosi, amaricantis. Flor. Dan. Tab. 309.

VIOLA TRICOLOR, JACEA. Stedmodersblomst; Floielsurt; Stismorsblom; Soulobat. Stiesmütterchen; Freysamkraut; Dreyfaltigkeitsblume.

*Violae tricoloris*, Linn. Cl. XIX. ord. Monogam., HERBA, in hortis et arvis sponte proveniens; caule triquetro, diffuso; foliis ovatis oblongis, crenulato-dentatis, petiolatis; stipulis pinnatifidis; odore subnullo; sapore mucilaginoso, subamaricante. Flor. Dan. Tab. 623.

VIRIDE AERIS. Vid. *Aerugo*.

VITIS IDAEA. Tyttebær; Krosingbær; Kroslinger; Tyttebær; Tytling. Preiselbeeren; Kranbeeren.

*Vaccinii Vitis Idaeae*, Linn. Cl. VIII. ord. Monogyn., FRUCTUS, e Norvegia ad nos pervenientes, passim quoque in Dania occurrunt. Saporis validi, aciduli, subacerbi. Flor. Dan. Tab. 40.





VITRIOLUM ALBUM; ZINCUM SULPHURICUM. *Solid Bitriol. Weisser Bitriol; Gallizenstein; Augenstein.*

Apud Goslarienses paratum, SAL metallicum, ex Zinco et Acido sulphurico, solutione repetita et crystallisatione conflatum. Cum raro purum et album sit, in aqua solvendum, cum Zinco granulato coquendum, filtrandum et crystallisandum est. Saporem ingrate acrem, adstringentem habet.

VITRIOLUM COERULEUM; VITRIOLUM DE CYPRO; CUPRUM SULPHURICUM. *Blauer Bitriol. Blauer Bitriol.*

Sal passim ex gleba cupri pyritosa, sive aes cum sulphure calcinando paratum. Saporis est nauseoso acris, valde styptici.

VITRIOLUM MARTIS I. VIRIDE; FERRUM SULPHURICUM. *Grön Bitriol; Jernvitriol. Grüner Bitriol; Eisenvitriol.*

Sal crystallisatum ex Hungaria, Germania et Anglia advectum, coloris herbacei. Cuprum admixtum prodit immixta lamina ferrea pura, cui cuprum adhaeret. Existit nativum, vel arte paratur e terris et Schistis hoc sale gravidis, potissimum ex Pyritibus satiscensibus atque usulatis. Saporis est adstringentis.

**ZINCUM.** *Zink; Spiauter; Zutenage. Zinef.*

Est METALLUM laniellosum, ex albido coerulescens, subtenax, malleo parum obediens. Ignitum sub aëris accessu flammam viridem concipiens, abit in Oxidum album, partim sub flocculorum levissimorum forma avolat. Chinense plerumque puritate antecellit illo, quod in officinis metallurgicis Goslariensibus producitur.

ZINCUM SULPHURICUM. *Vid. Vitriolum album.*



ZINGIBER. Ingeber. Ingfer.

*Amomi Zingiberis*, Linn. Cl. I. ord. Monogyn., RADIX, ex Indiis advecta, tuberosa, compressa, rugosa, lobata, lobis varie figuratis, obtusis, nodulosis; extus pallide cinerea, intus albida; odoris subaromatici; saporis valde acris, subaromatici. Eligatur ponderosa, minus fibrosa, non cariosa.

---





P A R S II.

COMPOSITA ET PRAEPARATA.









## ACETUM AROMATICUM.

(*Loco Aceti bezoardici et prophylactici.*)

*Recipe*    **H**erbae Absinthii,  
                  Roris marini,  
                  Salviae,  
                  Menthae piperitae,  
                          singularum Uncias duas,  
Cassiae cinnamomeae Unciam dimidiam,  
Caryophyllorum,  
Nucum moschatarum,  
                  singularum Drachmas duas,  
Aceti crudi Libras octo.

Post sufficientem macerationem in vase vitreo supra arenam tepidam, expreme et cola.

## ACETUM CONCENTRATUM.

(*Loco Aceti per frigus concentrati.*)

- R. Kali carbonici Uncias fedecim,  
Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam saturationem,  
evaporent ad Uncias quadraginta, quibus in retortam vitream immixtis, adde  
Acidi sulphurici concentrati Uncias duodecim, ,  
Aquæ fontanae Unciis octo dilutas.  
Retortae collum ablue, cum  
Aquæ destillatae Unciis quatuor.  
Tum adaptato recipiente et juncturis munitis, fiat destillatio ad siccum.

## ACETUM DESTILLATUM.

- R. Aceti Vini Gallici quantum libet.

Destilletur e retorta vitrea, aut e cucurbita cuprea flanno obducta munitaque capitello, una cum canali refrigeratorio e flanno puro parato, lento igne. Prodit primo Phlegma, quod abjiciendum. Quod sequitur, Acetum est. Continuetur Destillatio, donec e duodecim vel quindecim libris vix sesquilibra superfit, ne Aceto ad siccitatem abstracto, empyreuma contrahatur.

## ACETUM PROPHYLACTICUM.

Vid. *Acetum aromaticum.*

## ACETUM ROSARUM.

- R. Rosarum rubrarum siccarum quantum libet,  
Aceti Vini destillati octuplum ponderis.







Misce, in vase bene obturato digerantur frigide per octiduum circiter. Postea colentur et fortiter exprimantur.

## ACETUM LITHARGYRII.

Vid. *Acetum Saturninum*.

## ACETUM RUBI IDAEI.

R. Succi fructuum Rubi Idaci maturorum expressi, libras duas,  
Aceti Vini Gallici Mensurae quadrantem.

Committantur vase vitreo et stent per biduum. Exprimantur fortiter. Colaturae addatur

Sacchari albi Libra una cum dimidia.

Leni igne pro servando colore digeratur. Deinde frige fiat, subsideat et caute decantata committatur lagenis vitreis, probe obturandis.

## ACETUM SATURNINUM.

(*Acetum Lithargyrii*.)

R. Minii purissimi partem unam

Aceti vini partes quatuor

in vase figulino probe vitreato, coquantur lento igne, ad dimidiaae partis consumptionem, sub continua cum spatula lignea agitatione, et per chartam filtrentur.

## ACETUM SATURNINUM CONCENTRATUM.

(*Balsamum saturni, Extractum saturni*.)

Evaporatione aceti saturnini ad quartae partis consumptionem in vase figulino vitreato paratur.

## ACETUM SCILLITICUM.

R. Scillae praeparatae Uncias octo.

Minutim incisis affundantur

Aceti Vini Gallici optimi Librae octo.

Per octiduum in vase vitreo digerantur, deinde colentur.

## ACIDUM BENZOICUM.

(*Flores Benzoës.*)

R. Benzoës pulveratae Uncias viginti quatuor,

Natri carbonici crySTALLIFATI Uncias octo.

Misce, et decoque ex

Aquae communis Libris sedecim,

perpetue agitando, per horam dimidiam. Cola. Benzoën residuam de-  
nuo ex

Aquae communis Libris sex

decoque, et cola. Colaturam cum priori misce et évapora, donec supersint  
Librae duae. Filtra, et Acido sulphurico diluto satura.

Acidum benzoicum, sub forma pulveris levioris, ex cinereo albidum  
praecipitatum, in aqua bulliente solve. Liquorem adhuc ferventem cola  
per linteum, et ad crySTALLIFANDUM sepone. CrySTALLOS collectas, aqua fri-  
gida ablutas, sicca et ferva.

## ACIDUM CITRICUM.

R. Succu citri expressi, quantum vis,

stet per aliquot dies et filtretur. In vas vitreum immisso sub perpetua ebul-  
litione sensim adjiciatur







Cretae purae pulveratae

quantum sufficit ad perfectam saturationem. Vas ab igne remotum seponatur per horam, et liquor supernatans decantetur. Cretae citricae residuae, aqua frigida ablutae et siccatae addatur

Acidi sulphurici dimidia pars,

Aquae communis partibus sex diluti.

Digerantur per horas viginti quatuor. Liquor acidus decantetur, et calcaria sulphurica residua abluatur, donec insipida fiat. Liquores acidi commisti evaporent in vase porcellaneo ad consistentiam Syrupi; refrigerati filtrentur, et in crystallos redigantur, quae siccatae ferventur.

## ACIDUM MURIATICUM.

(*Spiritus salis acidus.*)

R. Natri muriatici Libras sex,

in retortam vitream capacem immixtis affunde

Acidi sulphurici concentrati Libras quatuor,  
caute antea dilutas cum

Aquae communis Libris totidem.

Adaptato vase recipiente amplo, cui insint

Aquae destillatae Librae duae,  
et juncturis clausis fiat destillatio, igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum. Liquidum elicatum supra

Natri muriatici Libram dimidiam,  
rectifica.

## ACIDUM MURIATICUM OXYDATUM.

(*Acidum salis dephlogisticatum.*)

R. Natri muriatici Uncias duodecim,

Magnesi oxydati nativi Uncias quatuor,

in retortam vitream tubulo munitam immixtis affunde

Acidi sulphurici Uncias sex,  
dilutas antea caute

Aquae communis Unciis totidem.

Applicato tubo recurvato sub aqua ducto, et juncturis probe clausis, ope ignis remissioris eliciatur Gas, in lagenis vitreis aqua frigida impletis excipiendum, usque dum in his tertia tantum aquae pars remaneat, cui quassando jungendum. In vase rite clauso servetur loco frigido.

## ACIDUM NITRICUM CONCENTRATUM.

*(Spiritus nitri fumans.)*

R. Kali nitrici pulverati Libras quatuor,  
in retortam vitream satis capacem, siccam, calefactam immixtis affunde successive et caute, ope infundibuli vitrei tubo muniti

Acidi sulphurici concentrati Libras duas.

Adaptetur vas excipiens amplum, tubulatum, vel tubus vitreus inter vasorum juncturas.

Fiat destillatio igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum.

## ACIDUM NITRICUM TENUE.

*(Spiritus nitri acidus.)*

R. Kali nitrici pulverati Libras octo,  
in retortam vitream satis capacem immixtis affunde

Acidi sulphurici concentrati Libras quatuor,  
dilutas antea caute

Aquae communis Libris totidem.

Applicetur excipulum amplum, cui





Aquae destillatae Librae quatuor.  
antea sunt immissae.

Fiat destillatio ex arena, igne primum remissiori, sub finem pedetentim aucto ad siccum.

Acido elicito infilla

Argentum nitricum solutum,  
quamdiu inde fit turbidum. Seponatur per aliquot dies. Tum liquorem limpidum decanta, et ex retorta fere ad siccum destillando, rectifica.

### ACIDUM PHOSPHORICUM.

*R.* Ossium ad albedinem ustorum Libras tres,  
subtilissime pulverifatis adde

Acidi sulphurici concentrati Libras duas,

Aquae communis Libris quindecim

dilutas. Ebulliant leniter per horam in lebetе flanneo, sub continua agitatione. Cola cum expressione, et liquorem ad mellis spissitudinem evapora. Residuum in aqua iterum solutum et colatum, cum

Ammonio carbonico

perfecte satura. Liquidum filtratum, et ad siccum evaporatum, praebet Ammonium phosphoricum; e quo, retortae vitreae satis amplae, aut vasi porcellaneo profundo commissō, Ammonium leni calore expellatur. Postquam spumescere cessavit, Acidum phosphoricum restans, igne modice aucto, adhuc per aliquot temporis momenta lente fluens detineatur; refrigeratum in triplo Aquae destillatae solvatur, et liquor filtratus limpidus fervetur.

### ACIDUM SUCCINICUM.

(*Sal succini.*)

*R.* Succini contusi, quantum vis.



Fiat destillatio, igne gradatim aucto. Prodebunt una cum oleo primum flavo, dein rubro, Liquor acidulus, et Sal concretum; quibus addatur Aquae calidae sufficiens quantitas, ad Sal solvendum. Liquor acidus ab oleo separatus leniter evaporet, filtretur, et ad crystallisandum seponatur. Crystalli collectae depurentur solutione in aqua calida, et crystallificatione repetita.

## ACIDUM SULPHURICUM CONCENTRATUM RECTIFICATUM.

*(Oleum vitrioli.)*

R. Acidi sulphurici venalis Uncias duodecim,  
e retorta vitrea ampla destilletur, et in vitris probe clausis usui asservetur.

## ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

*(Spiritus vitrioli.)*

R. Acidi sulphurici concentrati partem unam, cum  
Aquae destillatae partibus sex caute et gradatim misceatur.

## ACIDUM TARTARICUM.

*(Sal essentielle Tartari.)*

R. Cretae pulveratae, et Aqua calida  
saepius ablutae Libras duas,  
Aquae communis ferventis Libras viginti quatuor,  
in lebetem stanneum immixtis adjiciantur sensim

Tartari depurati Librae septem, vel quantum ad saturationem sufficit.  
Vase ab igne remoto stent per horae dimidium, dein in vas vitreum caute





transfundentur. Liquor limpidus supernatans Kali tartaricum continens decantetur, et residuum, aquam his vel ter affundendo, abluatur. Huic residuo addantur

Acidi sulphurici diluti Librae quatuordecim.

Spatula lignea saepius agitando, digerantur per horas viginti quatuor. Liquor acidus decantetur, et calcaria sulphurica residua aqua abluatur, donec insipida redeat. Liquores acidi commisti evaporent in vase vitreo aut porcellaneo, ad punctum fere crystallisationis, et fervidi per filtrum colentur. Post refrigerationem liquor a calcaria sulphurica per linteum separetur, et lenissimo calore crystallifcitur. Crystalli tandem post repetitam evaporationem collectae, loco sicco ferventur.

*Nota.* Ut cognoscatur, an filtrato huic liquori inhaereat Acidum sulphuricum, pauxillo hujus adduntur aliquot guttulae aceti saturni, ubi se prodat albido sedimento. Si liquor aliquot guttularum acidi nitrici affusione limpidus fit, acidum est purum, sin contra, inquinatus est acido sulphurico: in quo casu denuo illi addatur debita copia calcariae tartaricae.

## AETHER ACETICUS

(*Naphtha Aceti.*)

*R.* Natri acetici ficcati Uncias octo,

in retortam vitream immixtis affunde

Miscellani, praevio paratam ex

Acidi sulphurici concentrati Unciis quatuor, et

Spiritus vini rectificatissimi Unciis sex.

Vasorum juncturis probe clausis, fiat destillatio leni igne. Liquori destillato adde

Liquoris Kali caustici diluti, quantum requiritur ad separationem Aetheris promovendam: Aetherem blando calore rectifica, et in vase probe clauso usui serva.

## AETHER ACETICUS MARTIALIS.

Vid. *Tinctura ferri acetici aetherea.*

## AETHER PHOSPHORATUS.

(*Naphtha phosphorata.*)

R. Phosphori dissecti Grana octo,  
leni calore solue in  
Aetheris sulphurici Uncia una,  
et in vitro probe clauso ferva.

## AETHER SULPHURICUS.

(*Naphtha vitrioli.*)

R. Acidi sulphurici concentrati,  
Spiritus vini rectificatissimi,  
partes aequales.

Caute mixta destillantur in retorta vitrea tubulata, balneo arenae vel cineris, quousque nihil sulphureosi odoris ascenderit. Residuo iterum adde

Spiritus vini rectificatissimi partem dimidiam,  
fiat destillatio, uti antea, quae operatio, cum simili Spiritus vini quantitate, bis adhuc potest repeti. Liquori aethereo his destillationibus obtento adde

Aquae communis partem quartam,

Liquoris Kali caustici partem unam.

Aether supernatans e reliquo fluido separetur et calore blandissimo rectificetur.

## AETHIOPS ANTIMONIALIS.

Vid. *Hydrargyrum sibiato-sulphuratum.*







## AETHIOPS MINERALIS.

Vid. *Hydrargyrum sulphuratum nigrum.*

## ALCALI VEGETABILE AËRATUM.

Vid. *Kali carbonicum.*

## ALCALI VOLATILE SICCCUM.

Vid. *Ammonium carbonicum.*

## ALOË DEPURATA.

*(Extractum Aloës gummosum.)*

R. Aloës focotrinae Libram unam.

Solvatur in

Aquae fontanae calidae Libris quinque.

Committatur Solutio vasi vitreo per unum alterumque diem, ut resinosa substantia cum faecibus fundum petat. Tunc clarum, a spisso per decantationem atque colationem separatum, lento igne in aheni ferreo ad Extracti consistentiam evaporèt.

## ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi, quantum libet.

In olla fictili nova aut ferrea, ita capaci, ut ad tertiam modo partem repleatur, inter prunas calcinetur, donec totum effierbuerit, neque spumam amplius emittat, sed leve, siccum atque porosum evaserit.

## AMMONIUM CARBONICUM.

*(Alcali volatile siccum.)*

R. Ammonii muriatici pulverati ficci Libram unam,

Cretae purae pulveratae libras duas,  
mixta in retorta collo brevi, excipulo vero amplo munita, sublimentur.  
Sublimatum in vitris bene clausis affervetur.

## AMMONIUM CARBONICUM PYRO-OLEOSUM.

*(Sal volatile Cornu Cervi.)*

R. Cornuum Cervi vel aliorum Ossium contusorum, quantum vis.  
Immitte in retortam tubulatam ferream aut figulinam, et adaptato excipulo amplo cum tubo intermedio, igne aperto gradatim aucto fiat destillatio; adscendunt Liquor ammonialis, Ammonium concretum, et Oleum foetidum. Oleo separato, Sal et Liquor cum duplo cretae pulveratae siccae mixtus e retorta vitrea sublimetur, et sublimatum in vase rite obturato fervetur.

## AMMONIUM MURIATICUM DEPURATUM.

*(Sal Ammoniacum depuratum.)*

R. Sal Ammoniacum crudum solvatur in Aquae calidae quintuplo, in vase figulino vel stanneo. Filtrata solutio evaporetur ad pelliculam et in cella reponatur, ut concrecant Cryalli.

## AMMONIUM MURIATICUM MARTIATUM.

*(Flores salis ammoniaci martiales.)*

R. Ferri puri Unciam unam,

solve in quantitate sufficiente


Acidi muriatici.

Soluto admisce

Ammonii muriatici Uncias duodecim.

Eninn. Naa Talmud oflöskt 5 Gangs á dagum 42 arm.  
staud, at forvæltu, allu Condu. Of 60 ungum for-  
langað til hinna fimm þess, þess 8 sin 20  
þess 10 til fagfolliplean





Massa leni calore exsiccata et contrita, in cucurbita sublimetur. Sublimatum  
conteratur, et in vase clauso fervetur.

## ANIMA RHEI.

Vid. *Tinctura Rhabbarbari aquosa.*

## ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM.

Vid. *Stibium sulphuratum nigrum laevigatum.*

## ANTIMONII BUTYRUM.

Vid. *Liquor Stibii muriatici.*

## ANTIMONII VITRUM.

Vid. *Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum.*

## AQUA AËRIS FIXI s. AËRATA.

Vid. *Aqua carbonata.*

## AQUA ANISI.

℞. Seminis Anisi vulgaris partem unam.

Contusum Semen maceretur per noctem in

Aquae fontanae partibus novem.

Mane destillentur inde partes sex.

Eodem modo destillatur

AQUA FOENICULI,

PETROSELINI.

## AQUA ANTHOS COMPOSITA.

*(Aqua Hungarica.)*

- R. Florum Anthos Libram unam,  
Lavendulae Uncias quatuor,  
Spiritus Vini Gallici Libras sex.

Digerantur per noctem et destillentur inde Librae tres.

## AQUA BENEDICTA RULANDI.

*Vid. Vinum sibiatum.*

## AQUA CALCARIAE USTAE.

*(Aqua calcis.)*

- R. Calcariae purae recenter exustae partem unam,  
Aquaе fontanae partes octo.

Finita effervescentia, Liquor lacteus in vase clauso servetur, et post terrae subsidentiam in aliud vitrum decanthur, probe claudendum.

## AQUA CARBONATA.

*(Aqua aëris fixi, Aqua aërata.)*

Immitte aquam fluviatilem in apparatus vitreum a Doctore Nooth inventum (vel alium quemcunque huic scopo proprium) et gas acidum carbonicum, ex creta vel alia calcaria carbonica, mediante acido muriatico elicited, transire coge, usquedum eo saturata sit. Aquam sic paratam in vasis probe clausis usui serva.







AQUA CARMELITANA f. AQUA MELISSAE  
COMPOSITA.

R. Foliorum Melissae recentium Libram unam cum dimidia,  
Flavedinis Corticum Citri Uncias quatuor,  
Nucis Moschatae,  
Seminis Coriandri,  
singulorum Uncias duas,  
Caryophyllorum aromaticorum,  
Cinnamomi acuti,  
singulorum Unciam unam.

Incisis et contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati Librae sex,

Aquae Melissae Librae tres.

Digerantur per triduum; dein destillatione proliciantur Librae sex.

## AQUA CERASORUM.

R. Cerasorum nigrorum recentium partem unam.

In mortario lapideo cum nucleis probe contusis, addantur

Aquae purae Librae sex.

Destillantur inde Librae quatuor.

Eadem Norma paratur:

AQUA RUBI IDAEL.

## AQUA CINNAMOMI SIMPLEX.

R. Cinnamomi acuti partem unam,

Aquae fontanae partes novem.

Macerentur per diem unum aut alterum; dein destillantur inde partes sex.

Loco cinnamomi corticis adhiberi possunt Clavelli cinnamomi, utpote vilioris pretii.

### AQUA CINNAMOMI VINOSA.

R. - Aquae Cinnamomi simplicis,  
Spiritus Vini rectificati,  
singulorum partes aequales.

Misceantur.

### AQUA DESTILLATA SIMPLEX.

Destillant Aquae communis duae tertiae partes, rejecta prima stillantis aquae portiuncula.

### AQUA FORTIS.

Vid. *Acidum nitricum tenue.*

### AQUA HUNGARICA.

Vid. *Aqua Anthos.*

### AQUA KALINA CARBONATA.

(*Aqua mephitico-alcalina.*)

R. Aquae carbonatae Libram unam,  
Kali carbonici Drachmas duas.

Mixta in lagena vitrea bene obturata, loco frigido serva.

### AQUA LAXATIVA.

Vid. *Infusum Sennae compositum.*





## AQUA LAURO-CERASI.

- R. Foliorum recentium Lauro-Cerasi Libras duas,  
Aquae communis, quantum satis.  
E retorta vitrea destillando elice Libras tres, ferva sollicitè.

## AQUA MELISSAE.

- R. Herbae Melissae siccatae Libras duas,  
Aquae communis, quantum sufficit.  
Destillando elice Libras viginti.

Eadem ratione destillentur

AQUA MENTHAE CRISPAE,

PIPERITIDIS,

SAMBUCI.

## AQUA MELISSAE COMPOSITA.

Vid. *Aqua carmelitana*.

## AQUA MEPHITICO-ALCALINA.

Vid. *Aqua Kalina carbonata*.

## AQUA ROSARUM.

- R. Florum Rosarum recentium, sive, si hi deficient, sale conditorum, partem unam,  
Aquae fontanae partes sex.  
Leni destillatione inde proliciantur partes tres.  
Ad eandem normam paratur

AQUA FLORUM AURANTII f. NAPHAE.



## AQUA SATURNINA.

- R.    Aquae destillatae Libras duas,  
      Spiritus Vini Unciam dimidiam,  
      Aceti Saturni Unciam unam.

Mixta ferventur in vase vitreo.

## AQUA SULPHURATO-ACIDULA.

(*Liquor probatorius Hahnemanni.*)

- R.    Calcariae sulphuratae,  
      Acidi tartarici, singulorum Drachmas duas,  
      Aquae destillatae Uncias sedecim.

In vitro clauso mixta agitentur quassando. Postquam subsederint, Liquor limpidus decanthur in vasis vitreis quatuor, cui unicuique

Acidi tartarici Drachma una insit.

Obturentur statim.

## ARCANUM DUPLICATUM.

Vid. *Kali sulphuricum.*


## ARGENTUM NITRICUM FUSUM.

(*Lapis infernalis.*)

- R.    Argenti purissimi, quantum placet.    Solve in  
      Acidi Nitrici quantitate sufficiente,  
• deinde leni calore solutio ad ficcum evaporetur.

Massa in crucibulo argenteo aut porcellaneo calore leni liquatur, usquedum Olei instar fluat; subito effundatur in modulum ferreum calefactum, sevo illitum; refrigeratam massam in vitro clauso serva.





## BALSAMUM CEPHALICUM s. APOPLECTICUM.

R. Olei Nucis Moschatae expressi Unciam unam,  
immisceantur

Olei Caryophyllorum,

Lavendulae,

Rorismarini, ana semidrachma,

Succini, Scrupulus dimidius,

Balsami Peruviani Drachma una.

*Nota.* Qui velit, addet Moschi cum spiritu vini triti, grana decem.

## BALSAMUM COMMENDATORIS.

*Vid. Tinctura Benzoës composita.*

## BALSAMUM EMBRYONUM.

*Vid. Spiritus aromaticus.*

## BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

*Vid. Unguentum Hydrargyri rubrum.*

## BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus Vini rectificati Libras quatuor,

Saponis albi Hispanici Uncias decem,

leni igne ad solutionem digestis addantur

Camphorae tritae Unciae duae,

Olei Rorismarini,

Origani, singulorum semiuncia.

Misceantur agitando.

## BALSAMUM SATURNI.

Vid. *Acetum saturninum concentratum.*

## BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Sulphuris puri partem unam,

Olei Lini partes quatuor,

coquantur in vase terreo satis capaci, arena circumdato, lenissimo igne, spatula continue agitando, ad consistentiam Balsami spissioris.

*Nota.* BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM obtinetur, si simplicis parti unae olei terebinthinae partes octo addantur;

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM vero, si simplici eodem modo admiscetur olei anisi quintuplum.

## BALSAMUM TEREBINTHINATUM &amp; UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinae laricinae Drachmas duas,

Cerae citrinae Drachmam unam cum dimidia.

Leni calore colliquefactis addantur

Olei Terebinthinae Drachmae duae.

Misceantur.

## BALSAMUM TRAUMATICUM.

Vid. *Tinctura Benzoës composita.*

## BALSAMUM UNIVERSALE.

R. Olei Raparum recenter expressi Libram unam cum dimidia,

Cerae citrinae semilibram,







invicem solutis et frigefactis addantur sub continua agitatione,

Balsami Saturni Unciae tres.

*Nota.* Si desideretur, addi possunt

Camphorae Drachmae quatuor cum dimidia.

### BALSAMUM VITAE EXTERNUM.

R. Saponis Hispanici siccati et triti,  
Olei Terebinthinac, singulorum Libram unam,  
Salis Tartari Uncias duas.

Misceantur.

### BALSAMUM VITAE AD MODUM HOFMANNI.

R. Olei Lavendulae,  
Caryophyllorum,  
Macis,  
Cinnamomi,  
singulorum Scrupulum unum,  
Succini rectificati Guttas decem,  
Balsami Peruviani Drachmam dimidiam,  
Spiritus Vini rectificatissimi Uncias decem.

Tingantur radice Alcannae, committentur digestioni frigidae, et filtrentur per gossypium.

### BARYTA MURIATICA.

(*Terra ponderosa fusita.*)

R. Barytae Sulphuricae nativae electae et laevigatae partem unam,  
Kali Carbonici partes duas.

Coquantur per horam in lebete flanneo cum tribus ad quatuor partibus aquae communis, sub perpetua agitatione spatula lignea, aquam evaporatione consumptam subinde restituendo; et diluta filtrentur. Baryta carbonica obtenta, et probe abluta, lege artis in acido muriatico solvatur. Liqueor filtratus evaporetur ad perfectam siccitatem; massa residua in crucibulo excandescat. Refrigeratam et pulveratam aqua fervida solue, et Liqueorem filtratum cum paucis Barytae carbonicae digere. Denuo filtratum in crystallos redige, quae, antequam siccentur, aqua destillata frigida abluantur.

### BORAX TARTARISATA.

Vid. *Tartarus boraxatus*.

### BUTYRUM ANTIMONII.

Vid. *Liquor Stibii muriatici*.

### BUTYRUM CACAO.

Vid. *Oleum Cacao*.

### BUTYRUM MAJORANAE.

R. Foliorum Majoranae recentium Libram unam,  
contusa coquantur lenissimo igne cum

Butyri recentis infusae Libra una.

Consumpta humiditate colentur et exprimantur. Paulo refrigeratis addatur  
Olei destillati Majoranae semidrachma.

### CALCARIA SULPHURATA.

(*Hepar Sulphuris calcareum*.)

R. Calcariae ustae pulveratae Uncias duas,







Sulphuris Unciam unam;

mixtis sensim affunde

Aquae fervidae Libram unam.

Leni igne, frequenter agitando evaporent ad siccum. Massam siccam in vase vitreo clauso usui ferva.

## CARBO PRAEPARATUS.

(*Pulvis carbonum.*)

Carbones lignei urantur in vase clauso foraminulo instructo, ut partes omnes ope ignis volatiles abigantur, vel usque dum fumus definit. Carbo remanens in pulverem tritus fervetur vase clauso.

## CARBO SPONGIAE.

(*Spongia usta.*)

E Spongia marina mundata eodem modo Carbo est parandus.

## CERA AD LABIA.

R. Cerae albae Drachmas duas,

Spermatis Ceti Drachmas tres,

Olei Amygdalarum recentis Drachmas sex.

Colliquatis leni calore addatur

Radicis Alkannae spuriae, grossiuscule contusae, Drachma una cum dimidia.

Aliquoties ebulliant, deinde ab igne removeantur, colentur et additis

Olei Lavendulae Guttis triginta,

probe mixta effundantur in capsulas papyraceas, quae refrigerio committantur.

## CERA VIRIDIS.

- R. Ceræ citrinae Libram unam,  
Resinae Pini Uncias sex,  
Terebinthinae Uncias quatuor,  
Viridis Aeris triti semiunciam.

Liquentur invicem, colentur et effundantur more solito.

## CERATUM SATURNI.

- R. Olei Nucum Juglandum Unciam unam,  
Ceræ citrinae Uncias quatuor,  
Liquefiant leni igne et addantur  
Aquæ fontanae Unciæ duodecim,  
Extracti Saturni Unciæ una,  
misceantur exactissime et fiat ceratum.

## CEREOLI SIMPLICES.

(*Cereoli exploratorii.*)

- R. Ceræ flavae Uncias sex,  
Olei Olivarum Unciam unam.

Leni calore liquefactis et ab igne remotis immerge telas linteas tenues, ex quibus lege artis fiant convolvendo cereoli, superficie laevi et forma exacta.

## CHALYBS PRAEPARATA.

Vid. *Ferrum pulveratum.*

## CINERES CLAVELLATI DEPURATI.

Vid. *Kali carbonicum.*







## CONSERVA ROSARUM.

Flores Rosarum recentes a Calycibus liberati, duplici pondere Sacchari albissimi in mortario lapideo cum Pistillo ligneo triturentur, et in conservam redigantur.

## CORNU CERVI SINE IGNE PRAEPARATUM.

Cornua Cervorum in majora frusta secta coquantur in aqua fontana, donec mollescant. Medulla et cortex nigricans cultro separetur, cornua iterum abluta siccantur, et in mortario ferreo in subtilissimum redigantur pulverem.

## CREMOR TARTARI SOLUBILIS.

Vid. *Tartarus boraxatus.*

## DECOCTUM LAXATIVUM.

Vid. *Infusum Sennae compositum.*

## ELECTUARIUM APERIENS.

R. Pulpae Tamarindorum Drachmas sex,  
Foliorum Sennae in pulverem redactorum Drachmas tres,  
Kali tartarici Drachmam unam cum dimidia,  
Syrupi de Manna Unciam unam cum dimidia.  
Misceantur.

## ELECTUARIUM MUNDIFICANS.

R. Radicis Sarsaparillae Uncias tres,  
Ligni Guajaci Unciam unam,  
Foliorum Sennae Unciam unam cum dimidia,

Rhabbarbari Drachmas duas,

Corticis Sassafras,

Seminis Anisi, singulorum Drachmam unam.

In pulverem trita, redigantur in Electuarium cum Mellis despumati libra una.

## ELECTUARIUM THERIACA.

R. Radicum Angelicae Uncias sex,  
Serpentariae Virginianae Uncias quatuor,  
Valerianae majoris,  
Scillae,  
Cassiae Cinnamomeae, singularum Uncias duas,  
Cardamomi minoris,  
Myrrhae,  
Crocī,  
Caryophyllorum,  
Ferri sulphurici,  
Opī, singulorum Unciam unam,  
Mellis despumati Libras sex.

Melli paululum calefacto addatur Opium, vini Hispanici quantitate sufficiente dilutum; deinde admisceantur caetera in pulverem trita.

*Nota.* Quaelibet Uncia Theriacae hujus continet Opī grana circiter quinque.

## ELAEOSACCHARUM ANISI.

R. Sacchari albissimi Unciam unam,

Olei Anisi Guttas octo.

Terendo fiat Elaeosaccharum.





Eodem modo parantur:

ELAEOSACCHARUM CINNAMOMI,

CITRI,

FOENICULI,

MENTHAE PIPERITAE,

et reliqua.

### ELIXIR ACIDUM.

R. Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor.

Sensim et guttatim insilletur .

Acidi sulphurici pars una, adde

Coccinellae, quantum sufficit ad Tincturam saturandam.

Digesta per triduum filtrentur.

### ELIXIR AROMATICUM ACIDUM.

(*Elixir Vitrioli Mynsichti.*)

R. Essentiae aromaticae Libram unam,

insilla

Acidi sulphurici concentrati Unciam dimidiam.

### ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM

AD MODUM HOFMANNI.

R. Flavedinis Corticum Aurantium recentium,

Corticis Peruviani optimi, singulorum Unciam dimidiam,

Extracti Cardui benedicti,

Centaurei minoris,

Myrrhae electae, singulorum Drachmas duas,



Salis Tartari Unciam dimidiam.

Incisis et contusis affundatur

Vini Canariensis Libra una,

Per triduum digesta decanthentur.

## ELIXIR PAREGORICUM LONDINENSE.

R. Acidi Benzoici,  
Opii, singulorum Drachmam unam,  
Camphorae Scrupulos duos,  
Olei Anisi Drachmam dimidiam,  
Spiritus Vini rectificati Uncias viginti quatuor.

Mixta digere leni calore et cola.

*Nota.* Quaelibet Uncia Opii circiter grana duo continet.

## ELIXIR PECTORALE,

VULGO REGIS DANIAE SEU RINGELMANNI.

R. Extracti Liquiritiae Uncias sex,  
Aquae Foeniculi Libram unam,  
Seminis Anisi contusi Unciam unam,  
Liquoris Ammonii vinosi Libras tres.

Per viginti quatuor horas digesta colentur.

## ELIXIR VITRIOLI AD MODUM MYNSICHTI.

Vid. *Elixir aromaticum acidum.*





## EMPLASTRUM ADHAESIVUM.

*(Emplastrum Anglicum.)*

- R. Ichthyocollae optimae minutim incisae Unciam unam,  
Benzoës Drachmam unam,  
Spiritus vini Uncias duodecim,

immissa cucurbitae coquantur usque dum omnia fuerint dissoluta. Solutio colata adhuc fervida ope penicilli magni et mollis oblinetur panno serico tenso. Secundum non inducatur stratum, antequam primum fuerit exsiccatum. Eadem sub cautela fiat iteratio stratorum, usque dum emplastrum requisa crassitie gaudeat.

## EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

*Vid. Emplastrum Cerussae.*

## EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

- R. Ammoniacy, quantum libet,  
solvatur in  
Aceti Vini, sufficienti quantitate.  
Inspissetur ad consistentiam Emplastri et servetur.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO CUM ASA  
FOETIDA.

- R. Ammoniacy Uncias viginti quatuor,  
Asae foetidae Uncias octo,  
Saponis Hispanici rasi Uncias quatuor,  
Olei olivarum Uncias duas,  
coquantur ex aquae quantitate sufficienti, leni igne, ad emplastri spissitudinem.

## EMPLASTRUM CANTHARIDUM ORDINARIUM.

*(Emplastrum vesicatorium ordinarium.)*

R. Cerae flavae Uncias decem,  
Terebinthinae, ,  
Olei Olivarum, singulorum Uncias tres.

In vase figulino colliquantur leni igne, liquefacta ab igne removeantur, et sub agitatione perpetua sensim et exacte admisceantur

Cantharidum recenter grosso modo tritarum Unciae sex.

Formentur ex massa magdaleones et ferventur.

## EMPLASTRUM CANTHARIDUM PERPETUUM.

*(Emplastrum vesicatorium perpetuum.)*

R. Terebinthinae,  
Pulveris Mastiches, singulorum Uncias sex,  
leni calore liquatis innitte  
Pulveris Cantharidum Unciam unam cum dimidia,  
Euphorbii Unciam unam.

Fiat Emplastrum.

## EMPLASTRUM CERUSSAE.

*(Emplastrum album coctum.)*

R. Olei olivarum Libras duas,  
Cerussae tritae Libras quatuor.

Oleo calefacto injiciatur cerussa. Coquantur leni igne sub agitatione et jugi pauxilli aquae instillatione, ad emplastri consistentiam; tunc adde

Cerae albae Uncias sex,  
colliquecant, ut fiat Emplastrum.







## EMPLASTRUM CICUTAE.

R. Cerae flavae Libram unam,  
Colophonii,  
Olei olivarum, singulorum Libram dimidiam,  
colliquantis ac paulo refrigeratis admisce  
Pulveris Herbae Cicutae virosae Libram unam,  
ut fiat Emplastrum.

Eodem modo paratur

EMPLASTRUM HYOSCYAMI,

CONII MACULATI.

EMPLASTRUM COMMUNE s. DIACHYLON  
SIMPLEX.

R. Olei Olivarum Libras sex,  
Lithargyrii Libras tres.

Coquantur leni igne, adjecto jugiter pauxillo aquae, in Emplastrum.

## EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM.

Vid. *Emplastrum gummosum.*

## EMPLASTRUM DE EUPHORBIO.

(*Emplastrum Ischiadicum.*)

R. Picis nigrae Uncias quatuor,  
Euphorbii triti Drachmam unam cum dimidia,  
Terebinthinae Venetae Drachmas sex,  
colliquando misceantur in emplastrum.

## EMPLASTRUM FOETIDUM.

- R. Galbani Uncias duodecim,  
Tacamahacae tritae,  
Cerae flavae, singulorum Uncias sex,  
Asae foetidae,  
Seminum cumini contritorum,  
Terebinthinae Venetae, singulorum Uncias quatuor, colligando  
misceantur, ut fiat Emplastrum.

## EMPLASTRUM GRISEUM.

Vid. *Emplastrum de lapide calaminari.*

## EMPLASTRUM GUMMOSUM.

(*Emplastrum Diachylon compositum.*)

- R. Emplastri communis Libras duas,  
Cerae flavae Uncias quatuor.  
Colliquatis addantur  
Terebinthinae Venetae Unciae duae,  
Pulveris Gummi Ammoniaci,  
Galbani, singulorum Unciae duae,  
Crocii triti, in Spiritu Vini macerati et diluti, Drachmae duae.  
Commisceantur in Emplastrum.

## EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

(*Emplastrum mercuriale.*)

- R. Emplastri communis Libram unam.  
Leni igne in vase figulino vitreato liquefacto, sensim et sub continua agita-  
tione admisceantur







Hydrargyri Terebinthina extincti Uncia una cum dimidia.  
Mixture penitus peracta Emplastrum in magdaleones formatum fervetur.

## EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

Vid. *Emplastrum de Euphorbio.*

## EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI.

(*Emplastrum gryseum.*)

R. Emplastri communis,  
Lapis calaminaris praeparati,  
singulorum Libram unam cum dimidia,  
Cerae flavae Uncias sex,  
Sebi hircini,  
Terebinthinae,  
singulorum Unciam unam cum dimidia.

Debito ordine colliquantur et commisceantur, ut fiat emplastrum.

## EMPLASTRUM MELILOTI.

R. Sebi cervini Libras quatuor,  
Olei olivarum Libram unam,  
Resinae pini Libras sex,  
Cerae flavae Libras tres,  
Gummi Ammoniaci Uncias quatuor.  
Liquatis et femisrefrigeratis paulatim admisce  
Pulveris Herbae et Florum Meliloti Libras duas,  
Absinthii Libram unam,  
ut fiat emplastrum.

## EMPLASTRUM MERCURIALE.

Vid. *Emplastrum Hydrargyri*.

## EMPLASTRUM MINII CAMPHORATUM.

(*Emplastrum noricum*.)

- R.* Minii subtilissime triti Libram unam,  
Olei olivarum Libras duas,  
Aceti vini femilibram,  
ad emplastri mollioris consistentiam et colorem subfuscum coctis, addatur  
Cerae flavae Uncia una cum dimidia,  
non dum plane refrigeratis immisceantur  
Camphorae cum Oleo olivarum tritae Drachmae duae.

## EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

Vid. *Emplastrum saponatum*.

## EMPLASTRUM PICEUM.

Vid. *Emplastrum flecticum*.

## EMPLASTRUM SAPONATUM.

(*Emplastrum miraculosum*.)

- R.* Emplastri communis Libras tres,  
Cerae flavae Libram dimidiam,  
Saponis Hispanici Uncias tres,  
leni igne mixtis et aliquantulum refrigeratis adde  
Camphorae Unciam dimidiam in  
Oleo olivarum pauxillo solutam.







## EMPLASTRUM STICTICUM.

*(Emplastrum piceum.)*

R. Cerae citrinae,  
Resinae pini,  
Picis nigrae, singulorum Libram unam,  
Sebi hircini Unciam unam cum dimidia,  
liquata colentur, fiat Emplastrum.

## EMPLASTRUM VESICATORIUM.

*Vid. Emplastrum Cantharidum ordinarium.*

## EMPLASTRUM VESICATORIUM PERPETUUM.

*Vid. Emplastrum Cantharidum perpetuum.*

## ESSENTIA ABSINTHII.

R. Summitatum Absinthii concisarum partem unam,  
Spiritus Vini rectificati partes quatuor.  
Digerantur leni calore per triduum; fortiter exprimantur et filtrentur.

Ad hanc normam parantur

ESSENTIA CENTAUREI MINORIS,

TRIFOLII FIBRINI.

## ESSENTIA AMARA.

R. Herbae Absinthii Uncias duas,  
Foliorum Cardui benedicti,  
Radiciis Gentianae,  
Pomorum Aurantii immaturorum, singulorum Unciam dimidiam,

Seminis Anisi Drachmam unam,  
incisis et contusis affundantur

Spiritus Vini Gallici Librae tres,  
digesta per triduum exprimantur et filtrentur.

### ESSENTIA AROMATICA.

R. Cassiae Cinnamomeae Uncias duas,  
Cardamomi minoris,  
Caryophyllorum,  
Galangae,  
Zingiberis, singulorum Unciam dimidiam,  
contusa digerantur cum  
Spiritus Vini rectificati Libris duabus.  
Filtrata et ferva.

### ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

R. Asae foetidae electae et comminutae Uncias duas,  
Spiritus Vini rectificati Uncias duodecim.  
Leni calore per triduum digesta exprimantur et filtrentur.

Secundum hanc normam parantur

ESSENTIA CASTOREI,

MYRRHAE,

BENZOËS.

### ESSENTIA CANTHARIDUM.

R. Pulveris Cantharidum Drachmam unam,  
Spiritus Vini rectificati Uncias quatuor.  
Lenissimo igne digerantur per biduum et filtrentur.





## ESSENTIA CASTOREI AETHEREA.

R. Castorei genuini minutim concisi Unciam unam,  
Spiritus sulphurico-aetherei Uncias sex.

Macera in vitro clauso, per dies octo, saepius subinde agitando, tum filtra  
et ferva.

## ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticis exterioris Aurantium (Curassaviensium dictorum) Uncias duas,  
Spiritus Corticum Aurantium Uncias decem.

Per quatrimum digesta exprimantur et filtrentur.

## ESSENTIA CORTICUM CASCARILLAE.

R. Corticis Cascarillae concisae partem unam,  
Spiritus Vini rectificati partes quinque.

Per quatrimum digesta exprimantur et filtrentur.

Ad eandem normam parantur

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI SIMPLEX,

CINNAMOMI,

GENTIANAE,

PIMPINELLAE,

VINCETOXICI,

LIGNI QUASSIAE,

GEI URBANI.

## ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI COMPOSITA.

R. Pulveris Corticis Peruviani Uncias quatuor,  
Radicis Gentianae Uncias duas,

R



Flavedinis Corticum Aurantiorum concisae Unciam dimidiam.  
Misceantur et infundantur.

Spiritus Vini Gallici Libris quatuor.

Digerantur in balneo arenae per sex dies; deinde colentur.

### ESSENTIA SCILLAE.

R. Radicis Scillae ficcatae concisae Uncias sex,  
Spiritus Vini Gallici Libras duas.

Leni calore per quatrimum digesta exprimantur et filtrentur.

Ad eandem normam paratur

ESSENTIA CORTICIS VIRIDIS NUCUM JUGLANDIS.

### ESSENTIA STIBII.

Vid. *Vinum stibiatum*.

### ESSENTIA VALERIANAE AMMONIATA.

R. Radicis Valerianae minoris recenter pulveratae Uncias duas,  
Liquoris Ammonii vinosi Uncias duodecim,

digerantur frigide in cucurbita clausa per plures dies, vas saepius agitando.  
Tincturam saturatam et colatam in vitro obturato serva.

### EXTRACTUM ABSINTHII.

R. Summitatum Absinthii vulgaris minutim concisarum, quantum vis,  
Aquae simplicis octuplum,

coquantur in vase stanneo per horae quadrantem et exprimantur. Residuum  
ex Aquae quadruplo iterum per quadrantem horae leniter coque. Decocia  
prout subsederint colata, evaporent leni calore, ad extracti spissitudinem.





Pari modo parantur

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI.

CASCARILLAE.

CENTAURII MINORIS.

CHAMOMILLAE VULGARIS.

CORTICIS GEOFFREAE.

PERUVIANI.

FUMARIAE.

GENTIANAE.

HIPPOCASTANI.

MARRUBII.

MILLEFOLII.

RHEI.

TRIFOLII.

## EXTRACTUM ACONITI.

R. Herbae Aconiti recentis ante florum eruptionem collectae, quantum placet,

contunde in mortario ferreo seu lapideo, cum tantillo aquae, succum exprime, ac leni igne sub continua agitatione ad formam extracti redige.

Ad hanc normam parantur

EXTRACTUM BELLADONNAE.

CICUTAE VIROSAE.

CONII MACULATI.

CHELIDONII.

DATURAE.

HYOSCYAMI.

NUCUM JUGLANDIS.

## EXTRACTUM ALOËS.

Vid. *Aloë depurata.*

## EXTRACTUM CORTICUM AURANTIORUM.

R. Corticum Aurantiorum Libram unam,  
incisis affundantur

Spiritus Vini rectificati Librae duae,

Aquae communis Librae quatuor,

digesta in balneo aquae exprime, ex liquore colato Spiritum Vini e balneo aquae destillando elice, et residuum ad extracti consistentiam evapora.

Eodem modo para

EXTRACTUM COLUMBO.

HELLEBORI.

VALERIANAE.

## EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

R. Ligni Guajaci rasurae, quantum vis,

Aquae communis decuplum,

coquantur in vase clauso vel Olla Papini per horam, et liquor coletur. Eodem modo coctio bis terve ex aqua recenti repetatur. Decocta colata in balneo aquae, continuo sub finem spatula lignea agitando, evaporent ad extracti spissitudinem.

Eadem methodo paratur

EXTRACTUM QUASSIAE.







## EXTACTUM OPII.

*(Opium depuratum.)*

R. Opii crudi Uncias quatuor,  
in frustula minuta concisae immittantur cucurbitae vitreae, affundantur  
Aquae communis Librae quatuor.  
Solutio filtrata lenissimo balnei calore ad extracti consistentiam evaporetur.

## EXTRACTUM RHEI COMPOSITUM.

*(Loco Extracti catholici, panchymagogi et cathartici.)*

R. Extracti Rhei Uncias duas,  
Aloës Drachmas quinque;  
mixtis adde

Saponis Jalappini in Spiritu Vini rectificato soluti Unciam unam,  
In balneo aquae evaporet agitando, ad extracti spissitudinem.

## EXTRACTUM TARAXACI LIQUIDUM:

*(Mellago Taraxaci.)*

R. Radicum et Herbae junioris Taraxaci recentium Libras decem,  
concisis et contusis adde  
Aquae communis Libras sex.

Exprime succum, quem post unicam ebullitionem in vase flanneo cola, et  
leni calore ad fyrupi consistentiam evapora.

Eodem modo paratur

MELLAGO vel EXTRACTUM GRAMINIS LIQUIDUM.

## FEL BOVINUM INSPISSATUM.

Fel bovinum leni igne evaporetur ad Extracti consistentiam.

## FERRUM OXYDATUM FUSCUM.

(*Crocus Martis aperitivus.*)

R. Crystallorum Ferri sulphurici, quantum vis.

Solve in aqua calida, filtra, et instillando

Liquorem Kali carbonici praecipita;

praecipitatum Aqua calida sedulo edulcora, sicca et serva.

## FERRUM PULVERATUM.

(*Limatura Martis praeparata, vel Chalybs praeparatus.*)

Ferri purissimi in scobem redacti, quantum vis, in pulverem subtilissimum teratur, et in vitro obturato fervetur.

## FERRUM SULPHURICUM CRYSTALLISATUM.

(*Vitriolum Martis; Sal Martis.*)

R. Aquae communis Libras quatuor,

in cucurbita vitrea immixtis caute et gradatim instilla

Acidi sulphurici Libram unam,

dein successive adde

Ferri puri, quantum ad Acidi saturationem sufficit.

Effervescentia plane finita liquor decanthur, filtretur et lege artis in cry-

stallis redigatur. Crystalli ab accessu aëris seclusi usui ferventur.

## FLORES SULPHURIS.

Vid. *Sulphur depuratum.*







## GELATINA LIQUIRITIAE.

*R.* Radicum Liquiritiae exsiccatarum et excorticatarum. Unciam unam,  
incisae macerentur per noctem in

Aquae fontanae fervidae Libris quinque,  
in colatura solvantur

Gummi Arabici electi Librae quatuor,

Sacchari albi Librae duae.

Colata coquantur ad dimidias. Ablata spuma effundatur Gelatina in cap-  
fulas lamineas, Oleo Amygdalino illitas, et leni calore exsicceetur.

## GLOBULI TARTARI MARTIATI.

*R.* Ferri puri pulverati Libram unam,

Tartari depurati in pulverem redacti Libras tres,

Mixta in vase ferreo, aqua fervida humecta. Massam puliformem exsicca,  
ac iterum in pulverem redige repetitis vicibus, ut fiat solutio ferri perfecta.  
Denum formetur in globulos.

## HEPAR ANTIMONII.

*Vid. Kali sulphurato sibiati.*

## HEPAR SULPHURIS CALCAREUM.

*Vid. Calcaria sulphurata.*

## HEPAR SULPHURIS SALINUM.

*Vid. Kali sulphuratum.*

## HYDRARGYRUM MURIATICUM CORROSIVUM.

*(Mercurius sublimatus corrosivus.)*

- R. Hydrargyri puri Libras quinque,  
Acidi sulphurici concentrati Libras tres.

Abstracto per retortam liquore ad siccitatem, massae residuae in mortario vitreo admisceantur

Natri muriatici siccati Librae quatuor cum dimidia.

Sublimentur in cucurbita capaci, alembico instructa.

## HYDRARGYRUM MURIATICUM MITE.

*(Mercurius dulcis; Calomelas.)*

- R. Hydrargyri muriatici corrosivi partes quatuor,  
Hydrargyri puri partes tres.

Misce terendo in mortario vitreo aut lapideo, spiritus vini aliquot guttulas subinde inspergendo, donec globuli Hydrargyri penitus disparuerint. Immitte cucurbitae, et sublima. Massam sublimatam tere, et denuo sublima; dein in pulverem subtilissimum redige, aqua destillata fervida probe lava, sicca, et in vase clauso ferva.

## HYDRARGYRUM MURIATICUM PRAECIPITATUM.

*(Mercurius praecipitatus albus.)*

- R. Hydrargyri nitrici Uncias octo,  
solve in Aquae destillatae quantitate sufficiente, et filtra. Solutioni admisce  
Ammonii muriatici in aqua soluti Uncias quatuor.

Liquori diluto sensim insilla

Natrum carbonicum, in aqua solutum, quantum ad praecipitationem sufficit.

Praecipitatum aqua destillata lava et sicca.





## HYDRARGYRUM NITRICUM.

*(Mercurius nitrosus.)*

R. Hydrargyri puri Unciam unam,  
cucurbitae vitreae immisso affundatur

Acidi nitrici, quantum ad solutionem sufficit;  
cucurbita vasi imponatur aqua frigida repleto, et saepius agitetur, sic miscela solutioni per plures dies committatur. Cryalli, si quae formatae fuerint, solvantur, et liquido admisceantur. Liquor filtretur, in crysallos redigatur, quae loco frigido exsiccantur, et in vitro clauso ferventur.

## HYDRARGYRUM OXYDATUM RUBRUM.

*(Mercurius praecipitatus ruber.)*

R. Hydrargyri puri Libram unam,

Acidi nitrici, quantum sufficit ad perfectam solutionem.

Soluta ex retorta abstrahantur ad siccitatem, igne postremo in tantum aucto, ut Hydrargyrum in fundo retortae aequaliter induxerit rubrum splendendumque colorem.

## HYDRARGYRUM OXYDATUM NIGRUM.

*(Mercurius solubilis.)*

R. Hydrargyri nitrici, quantum volueris,

solve in aquae destillatae quantitate sufficiente, et filtra. Liquori diluto sensim infilla

Liquoris Ammonii caustici, quantum sufficit ad hydrargyrum praecipitandum.

Pulverem aqua destillata fervida ablue, sicca, et in vitro clauso ferva.



## HYDRARGYRUM STIBIATO-SULPHURATUM.

*(Æthiops antimonialis.)*

- R. Stibii sulphurati nigri pulverisati Unciam unam,  
Hydrargyri puri Unciam dimidiam.

Misce terendo in mortario ferreo vel vitreo, usque quo omnes Hydrargyri globuli disparuerint.

## HYDRARGYRUM SULPHURATUM NIGRUM.

*(Æthiops mineralis.)*

- R. Sulphuris depurati,  
Hydrargyri puri, partes aequales.

Terantur in mortario vitreo vel lapideo, donec Hydrargyrum plane disparcat.

## INFUSUM SENNAE COMPOSITUM.

*(Aqua laxativa, Decoctum laxativum Viennense.)*

- R. Foliorum Sennae electorum Unciam unam et dimidiam,  
Passularum minorum Drachmas sex,  
Seminis Coriandri Drachmas duas,  
Tartari solubilis Drachmas quinque.

Incisis et confusis adfundantur


Aquae fontanae bullientis Unciae viginti quatuor.

Per aliquot horas digesta bulliant leniter, ad colaturae expressae uncias quatuordecim, in qua solvantur

Mannae Calabrinæ Unciae quinque.

Iterum colentur.





## KALI ACETICUM.

*(Terra foliata Tartari.)*

R. Kali carbonici, quantum placet,

Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam saturationem.

Liquor in vase porcellaneo evaporatione ad minorem quantitatem redactus, ope pulveris carbonum filtratus, lenissimo calore inspissetur. In vase bene clauso, loco calido fervetur.

## KALI CARBONICUM.

*(Alcali vegetabile aëratum, Cineres clavellati depurati, Sal Tartari, Sal plantarum.)*

Tartari crudi frustula in retorta terrea, crucibulo, aut charta humectata tantummodo obvoluta, inter carbones ardentem urantur, quousque fumus penitus definit. Cineres remanentes contriti in aqua destillata solvantur, et liquor colatus ad ficcitatem evaporatur. Perfecte Acido carbonico saturatum Kali obtinetur, si iterum in aqua carbonata solvitur, et evaporando in crystallos redigitur.

## KALI CAUSTICUM SICCCUM.

*(Lapis causticus.)*

R. Lixivii Kali caustici, quantum placet.

In vase ferreo mundissimo eo usque lente coquatur, donec guttula in laminam metallicam frigidam effusa statim indururescat; tunc massa crucibulo immittatur, fortiorique igni committatur, donec instar olei, et colore rubicundo fluxerit; ita fluens subito effundatur in modulum peculiarem ferreum, antea calefactum, oleoque olivarum illitum, et antequam dure scat, in frusta

discindatur parva, quae adhuc calida in vitrum prius calefactum bene obturatum immissa, loco calido usui ferventur.

### KALI SULPHURATUM.

(*Hepar sulphuris, Hepar sulphuris salinum.*)

**R.** Sulphuris puri Uncias octo,  
Kali carbonici siccati Libram unam.

Mixta in crucibulo amplo tecto leni igne funde, ut in massam coeant; quae in laminam lapideam vel aeneam effundatur, et frige facta mox vasi vitreo probe claudendo imittatur.

### KALI SULPHURATO-STIBIATUM.

(*Hepar antimonii.*)

**R.** Stibii sulphurati nigri,  
Kali nitrici siccati, partes aequales.

Pulverata et mixta sensim immitte in crucibulum, inter prunas jam bene candentem: detonatione peracta, igne gradatim aucto, massa fundatur; quae frige facta usui fervetur.

### KALI SULPHURICUM.

(*Arcanum duplicatum, Tartarus vitriolatus.*)

Massa salina post defillationem Acidi nitrici remanens, in aquae quantitate sufficiente coquendo solvitur, et Acidum, si abundat, cum Kali carbonico saturatur. Liqueor filtratur, evaporetur, et ad crystallisationem in loco frigido seponatur. Collectae crystalli leniter exsiccantur.







## KALI TARTARICUM.

*(Tartarus tartarizatus.)*

*R.* Kali carbonici Uncias octo,  
Aquae communis Libras octo,  
coquantur ad solutionem, inter bulliendum inspergendo  
Tartari depurati triti, quantum ad perfectam saturationem sufficit.  
Liquor filtratus evaporetur leni calore ad siccum.

## LAPIS CAUSTICUS.

*Vid. Kali causticum siccum.*

## LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

*Vid. Tinctura opii crocata.*

## LAUDANUM LIQUIDUM WARNERI.

*Vid. Tinctura opii ammoniata.*

## LINIMENTUM AMMONIATUM.

*(Linimentum volatile.)*

*R.* Olei Olivarum Uncias duas,  
Liquoris Ammonii caustici Unciam dimidiam.  
Misceantur.

## LINIMENTUM AMMONIATO-CAMPHORATUM.

*(Linimentum volatile camphoratum.)*

*R.* Olei Olivarum Uncias duas,  
Camphorae Drachmam unam,  
Liquoris Ammonii caustici Unciam dimidiam.  
Misce.

## LIQUOR AMMONII ACETICI.

*(Spiritus Mindereri.)*

R. Ammonii carbonici ficci Uncias tres,

Paulatim insilletur, subinde agitando,

Aceti concentrati, quantum sufficit, donec non amplius effervescent.

Diluatur postea aqua destillata simplici, ut totius pondus sit unciarum viginti quatuor.

## LIQUOR AMMONII CARBONICI AQUOSUS.

*(Spiritus Salis ammoniaci aquosus.)*

R. Kali carbonici Libram unam cum dimidia,

Ammonii muriatici Libram unam.

Immissis in retortam vitream, et probe mixtis adde

Aquae communis Libras octo.

Leni igne destillentur librae quatuor.

## LIQUOR AMMONII CAUSTICUS.

*(Spiritus Salis ammoniaci cum calce.)*

R. Calcariae ustae Libras duas,

asperge aqua, ut in pulverem fatiscat, dein misce in cucurbita vitrea cum

Ammonii muriatici probe ficcati et pulverati Libris duabus,

Aquae communis Libris tribus,

adaptetur alembicus, cum excipulo fatis capaci

Aquae destillatae Libram dimidiam continens, juncturisque bene clausis, instituaturn destillatio calore remissiori, qua Liqueoris Librae duae cum dimidia eliciantur, qui vase optime clauso fervetur.





## LIQUOR AMMONII PYRO-OLEOSI.

*(Spiritus Cornu cervi rectificatus.)*

Liquor ammonialis, ex destillatione cornu cervi aut aliorum ossium, una cum Ammonio sicco ac Oleo foetido obtentus et separatus, blando calore rectificetur.

## LIQUOR AMMONII PYRO-OLEOSI SUCCINICI.

*(Liquor Cornu cervi succinatus.)*

R. Acidi Succini, quantum placet,

Liquoris Ammonii pyro-oleos<sup>i</sup>, quantum satis ad saturationem.

Filtra, et in vase probe clauso usui ferva.

## LIQUOR AMMONII VINOSUS.

*(Spiritus Salis ammoniaci vinosus.)*

R. Liquoris Ammonii caustici partem unam,

Spiritus Vini rectificatissimi partes duas.

Misce, et in vitro probe clauso usui ferva.

## LIQUOR ANODYNUS MARTIALIS.

*Vid. Spiritus sulphurico-aethereus martialis.*

## LIQUOR ANODYNUS MINERALIS HOFMANNI.

*Vid. Spiritus sulphurico-aethereus.*

## LIQUOR BELLOSTI.

*Vid. Liquor Hydrargyri nitrici.*



## LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

Vid. *Liquor Ammonii pyro-oleosi succinati.*

## LIQUOR KALI ACETICI.

(*Liquor Terrae foliatae tartari.*)

R. Kali acetici ficci Libram unam,  
Aquae destillatae simplicis Libras duas.  
Solve et filtra.

## LIQUOR KALI CARBONICI.

(*Oleum Tartari per deliquium.*)

R. Kali carbonici ficci Libram unam,  
solve in  
Aquae destillatae simplicis Libris duabus.  
filtra et ferva.

## LIQUOR HYDRARGYRI NITRICI.

(*Liquor Bellosti.*)

R. Hydrargyri nitrici Drachmas duas,  
Aquae communis destillatae Unciam unam.  
Solvantur leni calore.

## LIQUOR Ꝣ LIQUAMEN MYRRHAE.

Myrrha electa solvatur in Hydromellite, quantum admittit.

## LIQUOR NERVINUS.

Vid. *Spiritus sulphurico-aethereo-camphoratus.*





## LIQUOR SAPONIS STIBIATI.

(*Sulphur auratum liquidum; Tinctura Antimonii Jacobi.*)

R. Saponis sibiati Uncias octo,

Tincturae kalinae,

Aquae destillatae simplicis, singularum Uncias duodecim.

Digerantur leni calore, subinde agitando liquorem; quem filtratum ferva.

## LIQUOR STIBII MURIATICI.

(*Butyrum Antimonii.*)

R. Stibii oxydulati fusci Uncias quinque,

Natri muriatici siccati Uncias sedecim.

Mixtis in mortario vitreo, et in retortam vitream tubulatam immixtis, affunde

Acidi sulphurici concentrati Uncias quatuor,

Aquae communis Unciis sex

antea dilutas. Fiat destillatio ex balneo arenae, igne gradatim aucto ad siccum.

## LIQUOR STYPTICUS LOFFII.

(*Oleum Martis.*)

Residuum salinum ex sublimatione Ammonii muriatici martiati patinae vitreae immittitur et in cella reponetur, donec in liquorem diffuit flavum, qui filtratus in vitro rite clauso fervetur.

## LIQUOR TERRAE PONDEROSAE SALITAE.

Vid. *Solutio Barytae muriaticae.*

## MAGNESIA CARBONICA.

*(Magnesia alba; Magnesia Salis amari.)*

R. Magnesiaë sulphuricae, quantum volueris.

Solvatur in Aquae ferventis quantitate sufficiente. Solutioni filtratae et in lebetæ stanneo immisssæ, coquenti, instilletur Liquor Natri carbonici, quamdiu inde lactescat; dein Aqua fervida diluatur, et per linteum coletur. Magnesia remanens sedulo edulcoretur, atque siccetur.

## MAGNESIA USTA.

*(Magnesia calcinata.)*

R. Magnesiaë carbonicae, quantum placet,

in crucibulo tecto expone igni tam forti, ut rubeat per bihorium, et Acidum carbonicum perfecte expellatur; quæ restat, frigesfacta in vitro obturato fervetur.

## MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum Aquae purissimæ quarta parte coctum, atque probe despumatum, per laneum colum trajiciatur, et ad Syrupi consistentiam coquatur.

## MEL ROSATUM.

R. Mellis despumati, quantum libet,

Aquæ Rosarum quartam partem.

Cocta et despumata colentur et ad Syrupi consistentiam coquantur.

## MELLAGO TARAXACI.

Vid. *Extractum Taraxaci liquidum.*

## NATRUM ACETICUM.

*(Terra foliata Tartari crystallisata.)*

R. Natri carbonici, quantum vis,

immittatur vasi vitreo majori, eique successive affundatur

Aceti vini destillati, quantum ad saturationem requiritur.

Liquor filtratus leniter ad punctum crystallisationis evaporetur, et loco seponatur frigidus; crystalli obtentae in vitro clauso ferventur.

## NATRUM PHOSPHORICUM.

*(Soda phosphorata.)*

R. Natri carbonici, quantum vis,

Acidi phosphorici diluti, quantum ad saturationem requiritur.

Liquor filtratus ad crystallifandum evaporet; crystalli collectae in vase clauso ferventur.

## NATRUM SULPHURICUM CRYSTALLISATUM.

*(Sal mirabile Glauberi.)*

Residuum salinum ex destillatione Acidi muriatici obtentum conteratur et in aqua communi solvatur. Solutio Natri carbonici addatur, donec hoc aliquatenus praevaleat. Liquor filtratus ad pelliculam evaporet, et loco frigido ad crystallifandum seponatur. Crystallinos collectas in vase clauso usui ferva.

*Nota.* Aëri expositum aquam in crystallis contentam perdit, et in pulverem album fatiscit.

## OLEUM ABSINTHII AETHEREUM.

R. Summitatum Absinthii recentium ante florum evolutionem decerptarum modiceque ficcatarum Libras decem,



Aquae communis Libras sexaginta,  
destillantur ex vesica, oleumque aquae innatans separetur. Aqua vero pro  
nova Absinthii copia iteratis destillationibus inservit.

Eodem modo parantur

OLEUM BACCARUM JUNIPERI,  
FLORUM LAVENDULAE,  
HERBAE MAJORANAE,  
MENTHAE CRISPAE,  
PIPERITAE,  
ORIGANI CRETICI,  
RORISMARINI s. ANTHOS,  
TANACETI,  
THYMI,  
SEMINIS ANISI,  
CARVI,  
FOENICULI,


nec non OLEUM CARYOPHYLLORUM,  
CINNAMOMI,  
MACIS,


quod e retorta vitrea destilletur.

### OLEUM ABSINTHII COCTUM.

R. Herbae Absinthii recentis contusae Libram unam,  
Olei Olivarum Libras tres;

coquantur sub continua agitatione Spathula lignea, ad omnem humiditatis  
consumtionem. Oleum exprime, cola et ferva.





Eadem methodo parentur

OLEUM CHAMOMILLAE VULGARIS,  
HYOSCYAMI,  
HYPERICI COCTUM.

### OLEUM AMYGDALARUM.

Ex Amygdalis recentibus dulcibus vel amaris contusis, et cilicio inclusis, preli laminis aqua fervida calefactis, exprime oleum.

Similiter parentur

OLEUM FRUCTUUM FAGI, }  
SEMINUM RICINI, } ablato antea cortice.  
LINI.

### OLEUM ANIMALE AETHEREUM.

(*Oleum animale Dippelii.*)

R. Olei animalis foetidi, quantum placet;  
infunde cucurbitae vitreae, ope infundibuli vitrei longo tubulo instructi, ne cucurbitae latera inquinentur. Tum alembico et excipulo, probe luto junctis, lenissimo balnei arenae calore, destilla tamdiu quam oleum limpidum transit. Oleum hoc eadem cautela, cucurbitae novae cum aquae quadruplo infundatur, et applicato alembico ac vase recipiente, destillatio repetatur, dum limpidissimum, aquae instar, prodit. Oleum aethereum in-lagenulis vitreis exacte clausis et sub aqua demersis servetur.

### OLEUM ANIMALE FOETIDUM.

(*Oleum Cornu cervi foetidum.*)

Obtinetur destillatione Cornu cervi una cum Ammonio sicco ac Li-  
quore Ammonii pyro-oleoso.

## OLEUM CACAO.

*(Butyrum Cacao.)*

R. Nucum sive Seminum Cacao, quantum placet.

Leni igne tosti, a corticibus liberati et contusi, in vase ferreo leniter calefacti, in saccum immittantur, et prelo, cujus laminae in aqua fervida calefactae sint, exprimantur. Oleum butyraceum sic obtentum cum aquae duplo digere in balneo arenae, donec a foecibus subsidentibus liberatum sit. Frigefactum ab aqua separa et ufui serva,

## OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae partem unam,

Olei Olivarum partes quatuor.

Terendo solvantur,

## OLEUM CERAЕ.

R. Ceræ flavæ rasæ,

Calcariae usæ pulveratæ, singularum Libram unam;

fiat destillatio e retorta vitrea, arenae balneo immissa. Oleum elicatum nova destillatione supra

Calcariae usæ Libram dimidiam,

rectifica.

## OLEUM CORNU CERVI FOETIDUM.

Vid. *Oleum animale foetidum.*

## OLEUM MARTIS.

Vid. *Liquor stypticus Loffii.*

ARTICLE

ON THE

THEORY OF THE

ARTICLE

ON THE

ARTICLE

ON THE

ARTICLE

ON THE

ARTICLE

ON THE

ARTICLE

ON THE





## OLEUM NUCISTAE.

*(Oleum Nucis Moschatae.)*

*R.* Nucum Moschatarum, quantum placet;  
in mortario ferreo calido in pastam contusas, et sacco cannabino inclusas, aquae bullientis vapore impraegna, et prelo, laminis aqua fervida calefactis, exprime oleum.

## OLEUM OVORUM.

*R.* Ovorum recentium ad duritiem in aqua coctorum, quantum vis;  
vitelli exempti, contriti, in sartagine calefacti, ope pistilli lignei agitentur, donec rufescant, vel pinguedinem exsudent: tum adhuc fervidos sacco inclusos prelo subjice, oleumque elice.

## OLEUM SUCCINI.

Oleum destillatione Acidi Succinici obtentum, cum aquae sextuplo mixtum, e retorta vitrea denuo destilla, et in vase probe clauso usui serva.

## OPIUM DEPURATUM.

*Vid. Extractum Opii.*

## OXYMEL SCILLITICUM.

*R.* Mellis despumati Uncias triginta.  
Leni igne evaporatis, ad consumptionem circiter sex vel octo Unciarum addantur

Aceti scillitici Unciae duodecim.

Coquantur in vase figulino vitreato, ad consistentiam Syrupi tenuioris.

## OXYMEL SIMPLEX.

Paratur uti Oxymel scilliticum, nisi quod, loco Aceti scillitici, Acetum vini illud ingrediatur.

## PASSULAE LAXATIVAE.

R. Foliorum Sennae Uncias quatuor,  
Coquantur in

Aquae simplicis Unciis decem.

Versus finem coctionis addantur

Cinnamomi Drachmae tres.

Expressa ebulliant cum

Sacchari albi Libra una.

Syrupus colatus superfundatur Passularum minorum Librae unae.

## PASTA ALTHEAE.

R. Radicis Altheae concisae Uncias tres,  
infunde cum

Aquae bullientis Libris octo

per noctem, et post unicam ebullitionem cola. In colatura solvantur

Gummi Arabici,

Sacchari albi, singulorum Librae tres.

Cola, et spatula lignea continue agitando, leni calore ad Mellis consistentiam evapora, ut albescat; deinde admisce

Albumina quadraginta ovorum recentium in spumam quasiata,

Aquae florum Aurantiorum Uncias sex.

Lenissimo calore ad justam consistentiam sub perpetua agitatione inspissetur. Effunde in capsulas papyraceas, et loco calido penitus exsicca, tandem in taleolas scissa fervetur.





## PHOSPHORUS.

*R.* Acidi phosphorici Libras tres,  
in crucibulo fufis adde continue movendo

Pulveris carbonum Libram unam.

Massam adhuc calidam in mortario lapideo tere, ac dein retortae figulinae loricatae immitte, cui, mediante luto pingui, excipulum applicetur amplum, aqua frigida paene repletum, et tubulo parvo in parte superiori munitum, per quem gas exire possit. Destillatio fiat igne aperto et sensim aucto ad retortae candescentiam, donec guttae transire cessent.

Phosphorus elicitus, si nondum satis purus appareat, rectificetur destillatione e retorta vitrea, blando arenae calore, in excipulum sufficienti Aquae quantitate repletum.

## PILULAE APERIENTES s. CONTRA OBSTRUCTIONEM.

Ex Extracto Rhei composito formentur lege artis Pilulae ad pondus Granorum duorum.

## PILULAE AETHIOPICAE.

*R.* Hydrargyri puri Drachmas sex,  
Sulphuris sibiati aurantiaci Unciam dimidiam.

In mortario vitreo ad perfectam globulorum extinctionem tritis addantur et commisceantur

Saponis Hispanici,

Refinae Guajaci, singulorum Uncia dimidia,

Syrupi communis, quantum sufficit,

ut fiat Massa, e qua formentur pilulae.



## PILULAE FOETIDAE.

- R. Afae foetidae Drachmam unam cum dimidia,  
Camphorae Drachmam dimidiam.

Contusis tritisque addantur

Castorei Ruffici Drachma una cum dimidia,

Olei Cornu Cervi destillati Guttae viginti quatuor.

Misceantur in Massam pilularem.

PILULAE PURGANTES & LAXANTES  
CUM MERCURIO.

- R. Extracti Rhei compositi Unciam unam,  
Hydrargyri muriatici mitis Unciam dimidiam,  
Resinae Jalappae Drachmam unam,  
Olei Corticum Aurantiorum Guttas triginta.

Misceantur in Massam pilularem.

## PILULAE RESOLVENTES.

- R. Gummi Ammoniaci in aceto scilliaco soluti et inspissati,  
Saponis Hispanici,  
Extracti Cicutae, singulorum partes aequales.

Misce, fiat Massa pilularis.

## PILULAE SCILLITICAE.

- R. Saponis Hispanici Unciam unam,  
Gummi Ammoniaci,  
Pulveris Radicis Vincetoxici,





Scillae praeparatae, singulorum Unciam dimidiam,

Balsami Copaivae Drachmam, unam.

Misceantur in Massam pilularem.

### PILULAE TONICO-NERVINAE.

R. Ferri sulphurici,

Afae foetidae,

Extracti Chamomillae, singulorum Unciam dimidiam.

Misce, fiat Massa pilularis.

### PLUMBUM ACETICUM.

(*Saccharum Saturni.*)

R. Minii partem unam,

Aceti vini partes octo,

coquantur in vase plumbeo, donec Acetum perfecte dulcescat. Colata evaporantur et crystallisationi committantur.

### PULPA CASSIAE.

R. Fistularum Cassiae, quantum lubet;

eximatur medulla cum feminibus, ac solvatur in

Aquae calidae sufficienti quantitate.

Trajiciatur per cribrum setaceum; lentoque igne ad mellis consistentiam redigatur; et singulis libris addantur

Sacchari albi Unciae quatuor.

Coquantur ad pulpae consistentiam.

## PULPA PRUNORUM.

Fructus pruni domesticae maturi, exemptis nucleis, coquantur ex aquae communis quantitate sufficiente. Liquidum per cribrum setaceum trajectum evaporet ad requisitam spissitudinem. Singulis Pulpae Libris addantur

Sacchari albi Unciae quatuor.

Ad eadem normam paratur

## PULPA TAMARINDORUM.

## PULVIS ALTERANS EDINBURGENSIS.

R. Hydrargyri muriatici mitis, quantum volueris.

Contrito in mortario lapideo, sub continua trituratione addantur paulatim

Sulphuris subtiati aurantiaci partes aequales.

Misce.

## PULVIS AËRIPHORUS.

R. Natri carbonici sicci aqua crystallisationis orbatu Drachmas duas,

Pulveris Tartari depurati Drachmas sex,

Sacchari albi vel Sacchari lactis Unciam dimidiam.

Misce.

## PULVIS DENTIFRICIUS.

R. Pulveris Tartari depurati,

Radiciis Iridis Florentinae, singulorum Uncias duas,

Myrrhae,

Sanguinis draconis, singulorum Unciam unam,

Olei Caryophyllorum Guttas quadraginta.

Misce.







## PULVIS DOWERI.

Vid. *Pulvis Ipecacuanhae compositus.*

## PULVIS JALAPPAE COMPOSITUS.

(*Pulvis laxans.*)

R. Radicis Jalappae praeparatae Uncias duas,  
Kali sulphurici Unciam unam.

Misceantur in pulverem.

## PULVIS INFANTUM.

Vid. *Pulvis Magnesia compositus.*

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS  
f. PULVIS DOWERI.

R. Pulveris radicis Ipecacuanhae,  
Opii, singulorum Drachmam unam,  
Sacchari candidi Drachmas octo.

Misceantur in Pulverem.

## PULVIS LAXANS.

Vid. *Pulvis Jalappae compositus.*

PULVIS MAGNESIAE COMPOSITUS f. INFAN-  
TUM CUM RHEO.

R. Magnesia carbonicae,  
Elaeosacchari Foeniculi,  
Pulveris Rhei, singulorum Unciam dimidiam.

Misceantur in Pulverem.

## PULVIS REFRIGERANS.

- R.* Pulveris Tartari depurati Uncias tres,  
Elaeofacchari Citri,  
Nitri depurati, singulorum Unciam dimidiam.  
Misceantur et in vitro clauso ferventur.

## PULVIS TEMPERANS CAMPHORATUS.

- R.* Pulveris refrigerantis Unciam unam et dimidiam,  
Camphorae Scrupulos duos.  
Misce.

## PULVIS VERMIFUGUS.

- R.* Florum Tanacetii,  
Seminum Cynae, singulorum Drachmas tres,  
Ferri sulphurici Drachmam unam.  
Conterantur in Pulverem.

## RESINA JALAPPAE.

- R.* Radicis Jalappae contusae, quantum volueris,  
Spiritus Vini rectificati sextuplum.

Digerantur in balneo arenae, ut extrahatur Tinctura. Repetatur digestio, donec omnis extracta fuerit Refina. Tincturae filtratae, e cucurbita vitrea leni calore dimidium destillatione abstrahatur. E residuo praecipitetur ope aquae affusae Refina, quae, aqua probe elota, lenissimo calore ficcetur.

Eodem modo paratur

RESINA GUAJACI.





## REGULUS ANTIMONII.

Vid. *Stibium purum*.

## ROOB JUNIPERI.

Vid. *Succus Juniperi inspissatus*.

## SACCHARUM CLARIFICATUM.

Vid. *Syrupus sacchari depurati*.

## SAL MARTIS.

Vid. *Ferrum sulphuricum crystallisatum*.

## SAL PLANTARUM.

Vid. *Kali carbonicum*.

## SAL POLYCHRESTUM DE SEIGNETTE.

Vid. *Tartarus natronatus*.

## SAL TARTARI.

Vid. *Kali carbonicum*.

## SAPO ANTIMONIALIS.

Vid. *Sapo sibiatus*.

## SAPO JALAPPINUS.

R. Refinae Jalappae,  
Saponis Hispanici, singulorum Uncias duas,  
Spiritus Vini rectificati, quantum opus,  
ut leni calore fiat solutio. Dein evapora, ad consistentiam Massae pilularis.



## SAPO STIBIATUS.

*(Sapo antimonialis.)*

- R. Sulphuris stibiati aurantiaci Unciam unam,  
Liquoris Kali caustici, quantum sufficit, ut digerendo fiat solutio;  
cui adde  
Aquae destillatae fervidae pondus triplum,  
Saponis Alicantini rasi Uncias sex.

Solutionem leni calore ad massae pilularis consistentiam evapora. Si massa adhuc rubet, adde

Liquoris Kali caustici, quantum satis,  
ut colorem ex albido cinereum induat.

## SODA PHOSPHORATA.

*Vid. Natrum phosphoricum.*SOLUTIO BARYTAE MURIATICAЕ f. LIQUOR  
TERRAE PONDEROSAE SALITAE.

- R. Barytae muriaticae Scrupulum unum,  
Aquae destillatae Uncias duas.

Soluta filtrentur.

SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE  
f. PRO ENEMATE.

- R. Herbae Malvae Libram dimidiam,  
Meliloti,  
Florum Sambuci,  
Chamomillae, singulorum Uncias octo,



1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

Radicum Althaeae Uncias decem,

Seminum Lini Libras tres,

Incidentur et contendantur finit in Pulverem grossiusculum.

### SPECIES PRO DECOCTO LIGNORUM.

R. Ligni Guajaci rasi Uncias sex,

Sassafras,

Radice Bardanae, singulorum Uncias tres,

Liquiritiae Drachmas tres,

Stipitem Dulcamarae Unciam unam cum dimidia,

Seminis Foeniculi Drachmas duas.

Incisa et contusa misceantur.

### SPECIES FUMALES.

R. Ligni Rhodii Uncias duodecim,

Radice Iridis Florentinae Uncias viginti,

Cassiae Lignae,

Caryophyllatae, singulorum Uncias quatuor,

Gummi Benzoës Libras duas,

Storacis Calamitae Uncias duodecim,

Succini citrini Libram unam,

Olibani,

Mastichis, singulorum Libras duas,

Florum Rosarum rubrarum,

Lavendularum, singulorum Uncias sex.

Concisa et contusa misceantur.

## SPECIES FUMALES OPTIMAE.

- R. Gummi Storacis,  
Benzoës, singulorum Uncias duas,  
Olibani,  
Succini albi, singulorum Unciam unam,  
Olei de Cedro,  
Lavendulae, singulorum Guttas decem.  
Concisa in pulverem grossiusculum misceantur.

## SPECIES PRO INFUSO PECTORALI.

- R. Radicum Altheae Unciam cum dimidia,  
Liquiritiae,  
Herbae Tussilaginis,  
Veronicae,  
Florum Verbasci,  
Sambuci, singulorum Drachmas sex,  
Seminis Anisi stellati Unciam dimidiam.  
Incisa et contusa misceantur.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE  
f. DISCUTIENTES.

- R. Herbae Absinthii,  
Melissae,  
Menthae Piperitae,  
Origani, singularum Uncias quatuor,  
Florum Chamomillae,  
Sambuci,  
Lavendulae, singulorum Uncias tres.  
Incisa et contusa misceantur.

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
PUBLISHED WEEKLY  
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1919

Subscription price, Five Dollars Per Annum in Advance.  
Single Copies, Fifteen Cents.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on April 15, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.  
Postmaster: Send address changes in this journal to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription Department, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on April 15, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.  
Postmaster: Send address changes in this journal to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription Department, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on April 15, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.  
Postmaster: Send address changes in this journal to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription Department, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on April 15, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.  
Postmaster: Send address changes in this journal to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription Department, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on April 15, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.  
Postmaster: Send address changes in this journal to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription Department, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on April 15, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.  
Postmaster: Send address changes in this journal to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription Department, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.





## SPIRITUS AROMATICUS s. ALEXITERIUS.

- R. Cinnamomi Uncias duas,  
Flavedinis Corticum Citri,  
Seminis Foeniculi, singulorum Unciam unam,  
Macis Unciam dimidiam,  
Menthae piperitae Uncias tres,  
Spiritus Vini Gallici Libras duodecim.

Destillatione inde eliciantur librae octo.

## SPIRITUS COCHLEARIAE.

- R. Herbae Cochleariae recentis cum Floribus et Seminibus Libras decem.  
Contusis affundantur,

Spiritus Vini non rectificati Librae viginti.

In vesica per noctem macerata destillentur, juncturis exacte clausis. Spiritus recentij Herbae affusus denuo destilletur, quod ad tertiam vicem repeti potest.

## SPIRITUS CORNU CERVI RECTIFICATUS.

Vid. *Liquor Ammonii pyro-oleosus*.

## SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

- R. Corticum Aurantium Curassaviensium Libram unam cum dimidia,  
Spiritus Vini rectificati Libras octo,

Aquae communis Libras duas,

e vesica lento igne destillentur Spiritus librae octo, Aqua communi diluendae, ac Saccharo edulcorandae.

## SPIRITUS LAVENDULARUM.

R. Florum Lavendularum leniter ficcatorum Libram unam,  
Spiritus Vini non rectificati Libras sex.

Per triduum digesta destillentur, e balneo arenae ad tertias, iterumque fiat destillatio super Florum recentium libram dimidiam.

Eodem modo parantur

SPIRITUS RORISMARINI,

SERPILLI.

## SPIRITUS LAVENDULARUM COMPOSITUS.

R. Florum recentium Lavendularum Libras duas,  
Rorismarini Libram unam,  
Corticum Citri recentium Uncias tres,  
Spiritus Vini rectificati Libras duodecim.

Destillentur e balneo arenae ad ficcitatem. In Spiritu destillato maccarentur per triduum

Cinnamomi Unciae tres,  
Caryophyllorum aromaticorum,  
Cubebarum, singulorum Uncia una.

Colentur.

## SPIRITUS MINDERERI.

Vid. *Liquor Ammonii acetici*.

## SPIRITUS MURIATICO-AETHEREUS.

(*Spiritus Salis dulcis*.)

R. Natri muriatici Libram unam,  
Magnesii oxydati nativi Uncias sex.





in retortam vitream immixtis affunde

Acidi Sulphurici concentrati Uncias duodecim,

prius cum

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis quadraginta octo

mixtas. Destillent igne lenissimo unciae triginta sex.

### SPIRITUS NITRI ACIDUS.

Vid. *Acidum nitricum tenue.*

### SPIRITUS NITRICO-AETHEREUS.

(*Spiritus nitri dulcis.*)

R. Acidi Nitrici partem unam,

instillando misce cum

Spiritus Vini rectificatissimi partibus quinque;

ex retorta igne lenissimo destilla duas tertias partes. Spiritus elicited supra

Magnesium ustam rectificetur.

### SPIRITUS NITRI FUMANS.

Vid. *Acidum nitricum concentratum.*

### SPIRITUS SALIS ACIDUS.

Vid. *Acidum muriaticum.*

### SPIRITUS SALIS AMMONIACI AQUOSUS.

Vid. *Liquor Ammonii carbonici aquosus.*

### SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA PARATUS.

Vid. *Liquor Ammonii caustici.*



## SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

Vid. *Liquor Ammonii vinosus.*

## SPIRITUS SALIS DULCIS.

Vid. *Spiritus muriatico-aethereus.*

## SPIRITUS SAPONATUS.

Vid. *Balsamum saponatum.*

## SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS.

(*Liquor anodynus mineralis Hofmanni.*)

R. Aetheris sulphurici partem unam,  
Spiritus Vini rectificatissimi partes sex,  
misce et ferva.

SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS CAM-  
PHORATUS.


(*Liquor Nervinus.*)

R. Spiritus sulphurico-aetherici Unciam unam,  
in quo solve  
Camphorae Scrupulos quatuor.  
In vitro probe clauso ferva.

SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS MAR-  
TIATUS.

(*Liquor anodynus martialis.*)

R. Ferri puri limati, quantum placet,



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

100 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

Acquired from the  
Estate of [Name]

Gift of [Name]

Received from [Name]

Gift of [Name]

Received from [Name]

Gift of [Name]

Received from [Name]

Gift of [Name]

solve in quantitate sufficiente

Acidi muriatici,

et evapora. Massam siccam in cellam repone, ut in liquorem coloris fusci saturati delique scat. Liquorem obtentum cum

Aetheris sulphurici duplo

misce conquassando. Aetherem hoc modo ferro impraegnatum separa, et cum

Spiritus Vini rectificatissimi duplo

misce. Mixtum in vitris oblongis bene obturatis radiis solis tamdiu expone, donec color omnis evanuerit. Tum sollicitè ferva.

### SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus Vini rectificati Libras duas,

Camphorae Uncias duas.

Solvantur.

### SPIRITUS VITRIOLI.

Vid. *Acidum sulphuricum dilutum.*

### SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS.

R. Spiritus Vini rectificati, quantum libet,

destillet igne leni dimidia pars, Spiritum elicited supra

Calcariae muriaticae partem quartam

lenissimo igne rectifica.

### SPONGIA CERATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata Cerae flavae liquefactae immergatur ac fortiter exprimatur.

## STIBIUM OXYDATUM SULPHURATUM VITRIFICATUM.

(*Vitrum Antimonii.*)

R. Stibii sulphurati triti, quantum placet.

In patina terrea non vitreata leni igne calcinetur, sub jugi cum tenui pistillo vitreo agitatione, ne grumescat Massa. Calcinatio protrahatur, donec fumi affurgere desinant, ac massa in calcem grisei coloris, sulphurem non redolentem, mutata fuerit. Haec fortissimo igne in crucibulo fundatur, ac, paulillo Sulphuris massae difficulter fluenti adjecto, in patinam effundatur, ubi colorem pellucide hyacinthinum exhibet.

## STIBIUM PURUM.

(*Régulus Antimonii.*)

R. Frustulorum ferri puri Uncias octo, candentibus in crucibulo satis amplo paulatim adjiciantur

Stibii sulphurati grossiuscule comminuti Unciae viginti quatuor.

Optime fusis addantur

Kali nitrici quam maxime sicci Unciae tres, perfecte fusa effundantur in conum fusorium sebo illitum, sub jugi hujus percussione, quo subsidat Metallum reductum. Hoc refrigeratum a scoriis separa, et in pulverem redige, admisce

Kali nitrici quam maxime sicci partem octavam, funde, atque a scoriis separa.

## STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM LAEVIGATUM.

(*Antimonium crudum praeparatum.*)

Stibium sulphuratum nigrum electum, in mortario ferreo tritum, super porphyritem, affusa paululum aqua, laevigetur, donec particulae micantes disparuerint, loco tepido siccandum.







## SUCCUS AURANTIORUM.

Ex Aurantiis recentibus exprimatur Succus, atque defaecatus fervetur in vitro angustioris colli, affuso Olei Olivarum pauxillo, vesica muniendo.

## SUCCUS CITRI.

Paratur et servatur, uti Succus Aurantium.

## SUCCUS JUNIPERI INSPISSATUS.

(*Roob Juniperi.*)

Baccae Juniperi recentes, maturae, conquassatae, coquantur in aqua communi. Succus colatus et expressus, addita Sacchari albi quarta parte, leni igne inspissetur ad Mellis consistentiam.

Eodem modo parantur

SUCCUS MORORUM INSPISSATUS f. ROOB MORORUM.

SUCCUS INSPISSATUS SAMBUCI f. ROOB SAMBUCI.

## SUCCUS LIQUIRITIAE DEPURATUS.

Succus Liquiritiae Hispanicus in frustula dissectus, et aqua tepida solutus, per pannum coletur. Faecibus subsidentibus liquor decanthetur, ac leni calore inspissetur.

## SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Vid. *Sulphur sibiatum aurantiacum.*

## SULPHUR DEPURATUM.

*(Flores Sulphuris loti.)*

Sulphur sublimatum, quale proflat, Aqua fervida ab acido adhaerente perfecte libera et siccatum ferva.

## SULPHUR PRAECIPITATUM.

*(Lac Sulphuris.)*

R. Kali sulphurati, quantum vis,  
solve in

Aquae fervidae partibus viginti,

Liquori filtrato paulatim instilla

Acidi sulphurici diluti, quantum ad praecipitandum sufficit.

Praecipitatum probe edulcoratum et lenissimo calore siccatum usui ferva.

## SULPHUR STIBIATUM AURANTIACUM.

*(Sulphur auratum Antimonii.)*

R. Stibii sulphurati nigri laevigati partes duas,

Sulphuris depurati partes tres,

Liquoris Kali caustici, quantum ad solutionem requiritur.

Mixta coque in lebetæ ferreo, continue movendo spatula, ut fiat solutio perfecta; dein liquori aqua fervida diluto, et per chartam colato, instilla paulatim

Acidi sulphurici diluti, quantum ad praecipitandum sufficit.

Praecipitatum aqua tepida perfecte abluetur, lenissimo calore ficcetur, ac in vase clauso usui servetur.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 Broadway, New York, N.Y. 10038

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 Broadway, New York, N.Y. 10038

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION  
1215 Broadway, New York, N.Y. 10038

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 Broadway, New York, N.Y. 10038

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION  
1215 Broadway, New York, N.Y. 10038

SULPHUR STIBIATUM AURANTIACUM  
LIQUIDUM.

Vid. *Liquor Saponis stibiati.*

## SULPHUR STIBIATUM RUBRUM.

(*Kermes minerale.*)

R. Stibii sulphurati nigri Libram unam,

Sulphuris depurati Uncias tres.

Kali carbonici Libram unam cum dimidia.

Mixta et pulverifata injice in crucibulum, ut igne moderato cito liquefcant. Massam fusam in mortarium ferreum effunde, et postquam refrigerit, in pulverem tere, quem in Aquae libris octo coque per semihoram, continue movendo; dein liquorem adhuc fervidum per pannum linteum filtra in vas, cui Aquae communis librae sedecim insunt, ac contactum in vase haud profundo, per quadraginta octo horas sepone. Praecipitatum rubeo-fuscum aqua tepida ablue, caute sicca, et in vase obturato usui ferva.

## SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

R. Sueci Citri depurati et filtrati Uncias decem,

Sacchari albissimi Uncias sedecim.

Mixta post unam alteramve ebullitionem in vase stanneo colentur.

Ad eandem Normam parantur

SYRUPUS BERBERUM.

CERASORUM ACIDORUM.

FRAGARUM.

MORORUM.

RIBIUM.

RUBI IDAEI.



## SYRUPUS DE ALTHEA.

R. Radicis Altheae decorticatae Uncias tres,  
Aquaе fontanae Libras sex.

Coquantur ad tertiae partis consumptionem, sub finem addendo  
Radicis Liquiritiae Uncias tres.

Colaturae subfidentia depuratae addantur  
Sacchari albi Librae sex.

Coquantur leni igne sub continua agitatione, donec fiat Syrupus.

## SYRUPUS AMYGDALARUM.

(*Syrupus emulsivus.*)


R. Amygdalarum dulcium excorticatarum Uncias octo,  
in mortario lapideo pistilli lignei ope contusis, sensim adde  
Aquaе Rosarum Libras duas,  
Florum Aurantii Unciam unam.


In emulsionis colatae unciis viginti solve  
Sacchari albißimi Libras tres,  
calore lenissimo fiat Syrupus.

## SYRUPUS CORTICUM AURANTIORUM.

R. Flavedinis corticum Aurantium concisae Uncias octo,  
Aquaе fontanae ferventis Libras duas.

Digerantur vase clauso per sex horas. Colaturae addantur  
Sacchari albi Librae quatuor,  
ut fiat Syrupus.





## SYRUPUS DIACODION f. PAPAVERIS ALBI.

R. Caputum Papaveris albi modice ficcatorum Uncias quatuordecim,  
Radice Liquiritiae Unciam dimidiam,  
Aquae fontanae bullientis Libras octo.

Per noctem macerata coquantur ad dimidias. Colaturae fortiter expressae addantur

Sacchari albi Librae quatuor.

Coquantur in Syrupum.

## SYRUPUS E MANNA.

R. Foliorum Sennae Uncias quatuor,  
Seminis Foeniculi,  
Zingiberis, singulorum Drachmam unam,  
Aquae fervidae Libras duas.

Digesta exprimantur. Clarificata, deum admistis

Mannae Calabrinae Unciis sex,

Sacchari albi Unciis viginti duabus,

coquantur in Syrupum.

## SYRUPUS PAPAVERIS.

R. Florum Papaveris erratici recentium Libram unam cum dimidia,  
Aquae simplicis destillatae ferventis Libras tres.

Per noctem macerata exprimantur et colaturae ad dimidias evaporatae addantur

Sacchari albi Librae tres.

Coquantur in Syrupum.

## SYRUPUS RHEI.

- R. Radicis Rhei concisi Uncias quatuor,  
Kali carbonici Drachmas duas.

Affunde

Aquae bullientis Libras duas,  
ebulliet leni igne. Expressis unciis viginti immisceantur  
Sacchari albi Librae tres,  
et fiat Syrupus.

SYRUPUS SACCHARI & SACCHARUM CLA-  
RIFICATUM.

- R. Sacchari albi,  
Aquae fontanae, singulorum partes aequales.  
Coquantur in Syrupum.

## TARTARUS AMMONIATUS.

(*Tartarus solubilis ammoniacalis.*)

- R. Tartari depurati triti, quantum placet,  
Aquae communis octuplum,  
coquantur in vase stanneo, solutis successive admisceatur  
Ammonii carbonici quantitas sufficiens,  
ad saturationem usque. Liquor filtratus et vasi porcellaneo immixtus in  
balneo arenae sub agitatione ad siccitatem evaporetur. Sal siccum in vitro  
arctissime clauso fervetur.

## TARTARUS BORAXATUS.

(*Cremor Tartari solubilis.*)

- R. Boracis pulveratae Libram semis,

### 2.1.1. The syllable

The syllable is the smallest unit of speech which is perceived as a single unit. It is the basic unit of organization of the speech stream. The syllable is the unit of the speech stream which is perceived as a single unit.

The syllable is the unit of the speech stream which is perceived as a single unit. It is the basic unit of organization of the speech stream. The syllable is the unit of the speech stream which is perceived as a single unit.

### 2.1.2. The syllable structure

The syllable structure is the organization of the syllable into its constituent parts.

### 2.1.3. The syllable structure in English

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.

### 2.1.4. The syllable structure in English: the syllable

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts. The syllable is the unit of the speech stream which is perceived as a single unit. It is the basic unit of organization of the speech stream. The syllable is the unit of the speech stream which is perceived as a single unit.

### 2.1.5. The syllable structure in English: the syllable

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.

### 2.1.6. The syllable structure in English: the syllable

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.

### 2.1.7. The syllable structure in English: the syllable

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.

The syllable structure in English is the organization of the syllable into its constituent parts.



## ARTICLE 10

1. The Board of Trustees shall have the honor to receive and

to read the report of the

Library

and to make such recommendations

as may be deemed proper for the improvement of the Library

and to report thereon to the

Board of Trustees.

## ARTICLE 11. OF THE BOARD OF TRUSTEES

## SECTION 1.

1. The Board of Trustees shall

be composed of the following members:

The Mayor of the City of New York

## ARTICLE 12. OF THE BOARD OF TRUSTEES

## SECTION 1.

1. The Board of Trustees shall

be composed of the following members:

The Mayor of the City of New York

The Board of Trustees shall

have the honor to receive and to read the report of the

Library and to make such recommendations as may be deemed

proper for the improvement of the Library

## ARTICLE 13. OF THE BOARD OF TRUSTEES

## SECTION 1.

1. The Board of Trustees shall

Aquae communis Libras sex,  
vase stanneo ingerantur et coquantur; sub ebullitione inspergatur  
Pulveris Tartari depurati Libra una cum dimidia, vel quantum spon-  
te solvitur.

Liquor filtretur, et in vase porcellaneo leni calore evaporetur. Sal siccum  
in pulverem tritum in vitro optime claudendo servetur.

### TARTARUS EMETICUS.

*Vid. Tartarus sibiatus.*

### TARTARUS NATRONATUS.

*(Sal Polychrestum de Seignette.)*

*R.* Natri carbonici crystallifati Libram unam,  
Aquae fontanae Libras octo.

Solutio filtrata in vase figulino ebulliat. Inter bulliendum inspergatur  
Tartari depurati pulverati, quantum sufficit ad saturationem.

Solutio demum filtrata, ad tertias evaporata, Crystallisationi committatur.

### TARTARUS SOLUBILIS AMMONIACALIS.

*Vid. Tartarus ammoniatus.*

### TARTARUS STIBIATUS.

*(Tartarus emeticus.)*

*R.* Stibis oxydulati sulphurati vitrei triti, Unciam unam cum dimidia,  
Pulveris Tartari depurati Uncias duas.

In vase porcellaneo inmixtis admisce

Aquae destillatae, quantum requiritur,

ut fiat massa pulti similia. Seponatur vas loco calido per tres hebdomadas,

massa saepius agitetur spatula lignea, et addatur sensim aqua, loco evaporatione consumptae. Dein Aqua fervida diluta filtretur, et residuum abluatur. Liquor evaporetur et loco frigido ad crystallifandum seponatur. Crystalli per vices obtentae in Pulverem tritae, vitro clauso ferventur.

### TARTARUS TARTARISATUS.

Vid. *Kali tartaricum*.

### TARTARUS VITRIOLATUS.

Vid. *Kali sulphuricum*.

### TERRA FOLIATA TARTARI.

Vid. *Kali aceticum*.

### TERRA FOLIATA TARTARI CRYSTALLISATA.

Vid. *Natrum aceticum*.

### TERRA PONDEROSA SALITA.


Vid. *Baryta muriatica*.


### THEA AMARA.

R. Rasurae ligni Guajaci,  
Baccarum Juniperi,  
Foliorum Sennae,  
Herbae Trifolii fibrini, singulorum partes aequales,  
concisa et contusa misce.

### TINCTURA ANTIMONII JACOBI.

Vid. *Liquor saponis sibiati*.





## TINCTURA BENZOËS COMPOSITA.

(*Balsamum Commendatoris; Balsamum traumaticum. Angl. Turlington Balsam; Friars Balsam.*)

- R. Benzoës Uncias tres,  
Styracis in granis Unciam unam et dimidiam,  
Aloës depuratae Unciam dimidiam,  
Balsami Indici nigri Unciam unam,  
Spiritus Vini rectificatissimi Libras tres.  
In vase clauso digere per triduum, deinde per chartam cola.

## TINCTURA CATHARTICA.

- R. Foliorum Sennae Uncias duas,  
Radici Jalappae Unciam unam,  
Seminum Coriandri Unciam dimidiam,  
Spiritus Vini rectificati Libras tres.  
Digerantur per triduum et Tincturae colatae addantur  
Sacchari albi Unciae quatuor.

## TINCTURA FERRI ACETICI AETHEREA.

(*Aether aceticus martialis.*)

- R. Ferri pulverati Uncias quatuor,  
solve in  
Acidi acetici concentrati quantitate sufficiente.  
Solutionis unciis novem admisce  
Aetheris acetici Unciam unam,  
Spiritus Vini rectificatissimi Uncias duas.  
Misce.



## TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

*(Tinctura Guajaci volatilis.)*

R. Resinae Guajaci nativae tritae Unciam unam,  
Liquoris Ammonii vinosi Uncias sex.

Frigida digestionem in vitro clauso saepius movendo extrahatur Tinctura.

## TINCTURA GUAJACI SPIRITUOSA.

R. Resinae Guajaci nativae tritae Unciam unam,  
Spiritus Tassiae s. Sacchari veteris Libram unam,  
digerantur et ferventur.

## TINCTURA OPII AMMONIATA.

*(Laudanum Liquidum Warneri.)*

R. Opii puri,  
Saponis Alicantini, singulorum Drachmas sex,  
Nucis Moschatae contusae Drachmam unam,  
Camphorae Drachmas duas,  
Croci concisi Grana quadraginta,  
Liquoris Ammonii vinosi Uncias novem.

Digerantur per dies decem; interdum conquassando, et decanthentur.

*Nota.* Drachma continet Opii grana quinque cum dimidio.

## TINCTURA OPII CROCATA.

*(Laudanum liquidum Sydenhami.)*

R. Extracti Opii Uncias duas,  
Croci optimi semunciam,





Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum aromaticorum, singulorum Drachmam unam.

In pulverem trita infundantur

Vini Hispanici Libra una.

Digerantur per triduum vel quatrimum; deinde colentur et exprimantur.

*Nota.* Drachma continet opii grana decem.

### TINCTURA OPII SIMPLEX.

*R.* Opii Unciam unam,

Vini Hispanici Uncias duodecim,

digerantur per triduum et ferventur.

*Nota.* Drachma grana decem Opii continet.

### TINCTURA OPII SPIRITUOSA.

*R.* Opii Unciam dimidiam,

Spiritus Vini rectificati Uncias viginti quatuor,

digerantur et ferventur.

*Nota.* Drachma grana quatuor Opii circiter continet.

### TINCTURA RHABARBARI AQUOSA.

(Antea *Anima Rhei.*)

*R.* Rhabarbari electi tenuiter incisi Unciam unam,

Kali carbonici Drachmas duas,

Aquae fontanae bullientis Uncias decem.

Post unicam ebullitionem colentur.

## TINCTURA RHABARBARI VINOSA.

- R. Rhabarbari electi Uncias duas,  
Radiciſ Gentianae Drachmas ſex,  
Seminum Cardamomi minoris Unciam dimidiam,  
Vini albi Libras duas,  
digerantur leni calore et filtrentur.

## UNGUENTUM ALTHEAE.

- R. Mucilaginis Radicum Altheae,  
Seminis Lini, ſingulorum Libram unam,  
Axungiae porcinae Libras ſex.  
Coquantur ad confumptionem omnis aquoſi; deinde addatur  
Refinae flavae ſemilibra.  
Miſceantur in Unguentum.


## UNGUENTUM BASILICUM.

- R. Colophonii,  
Cerae flavae,  
Sevi ovilli,  
Picis nigrae, ſingulorum Libram unam,  
Terebinthinae Libram dimidiam,  
Olei Olivarum Libras tres.  
Leni igne liquata colentur.

## UNGUENTUM CERUSSAE.

(*Unguentum album ſimplex.*)

- R. Axungiae porcinae Libram unam,





1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is a branch of linguistics which deals with the changes in the language over time. The study of the history of the English language is important for many reasons. It helps us to understand the development of the language and the influence of other languages on it. It also helps us to understand the social and cultural changes that have taken place in the English-speaking world.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is a branch of linguistics which deals with the changes in the language over time. The study of the history of the English language is important for many reasons. It helps us to understand the development of the language and the influence of other languages on it. It also helps us to understand the social and cultural changes that have taken place in the English-speaking world.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is a branch of linguistics which deals with the changes in the language over time. The study of the history of the English language is important for many reasons. It helps us to understand the development of the language and the influence of other languages on it. It also helps us to understand the social and cultural changes that have taken place in the English-speaking world.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language. It is a branch of linguistics which deals with the changes in the language over time. The study of the history of the English language is important for many reasons. It helps us to understand the development of the language and the influence of other languages on it. It also helps us to understand the social and cultural changes that have taken place in the English-speaking world.

Ceruffae Libram dimidiam.

Leni igne soluta et deinde perfecte refrigerata misceantur in Unguentum.

## UNGUENTUM CERUSSAE CAMPHORATUM.

(*Unguentum album camphoratum.*)

R. Unguenti Cerussae frigefacti Uncias duas,  
Camphorae cum paucis Olei Amygdalarum Guttulis tritae Grana vi-  
ginti quatuor.

Misceantur in Unguentum.

## UNGUENTUM DIGESTIVUM.

Vid. *Balsamum Terebinthinatum.*

## UNGUENTUM HYDRARGYRI CINEREUM.

(*Unguentum mercuriale s. Neapolitanum.*)

R. Hydrargyri puri,  
Sevi bovini, singulorum Unciam unam,  
Axungiae porcinae Uncias tres.

Mercurius primum cum Sevo et pauxillo Axungiae porcinae probe exstingua-  
tur; deinde Axungia reliqua addatur, et terendo misceantur in Unguentum.

## UNGUENTUM HYDRARGYRI CITRINUM.

R. Hydrargyri puri Unciam unam,  
Acidi nitrici Uncias duas,  
solve digerendo; solutioni calidae admisce  
Axungiae porcinae recenter liquefactae et jam in coagulationem ten-  
dentis Uncias duodecim.

## UNGUENTUM HYDRARGYRI RUBRUM.

*(Balsamum Ophthalmicum rubrum.)*

R. Butyri recentis omni Sale privati Uncias tres,  
liquefacto leni igne, adde

Hydrargyri oxydati rubri in subtilissimum pulverem redacti Drach-  
mas tres.

Exactissime in Mortario vitreo vel lapideo misceantur et diu terantur, do-  
nec perfecte refrigerint.

## UNGUENTUM MERCURIALE.

*Vid. Unguentum Hydrargyri cinereum.*

## UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

*Vid. Unguentum Hydrargyri cinereum.*

## UNGUENTUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

*Vid. Unguentum Hydrargyri rubrum.*

## UNGUENTUM RORISMARINI COMPOSITUM.

*(Unguentum nervinum.)*

R. Herbae Rorismarini Uncias duas,

Rutae,

Majoranae,

Menthae crispae,

Florum Meliloti,


Lavendulae,

Chamomillae,

Baccarum Lauri, fingulorum Unciam unam,

Axungiae porcinae Libram unam,





Sevi ovilli Libram dimidiam,  
coque lento igne, donec aquosum confutum fit.

In colatura expressa liquecant

Cerae flavae,

Terebinthinae, singulorum Unciae duae,

Olei Laurini Unciae quatuor,

misceantur in Unguentum.

### UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Sacchari Saturni Unciam unam cum dimidia,

Cerae albae Uncias tres,

Olei Olivarum Uncias duodecim.

Liquata misce sub continuo motu ad refrigerentiam.

### UNGUENTUM SULPHURIS.

(*Unguentum ad Scabiem.*)

R. Axungiae porcinae saepius lotae Uncias decem,

Radici Enulae in pulverem redactae Uncias duas,

Baccarum Lauri contusarum,

Sulphuris triti, singulorum Unciam unam,

Liquoris Kali carbonici semunciam.

Misceantur.

### UNGUENTUM ZINCI.

(*Unguentum Nihili.*)

R. Zinci oxydati albi pulverati Unciam unam,

Camphorae tritae Scrupulum unum,

Axungiae porcinae Uncias sex.

Misceantur in Unguentum.



## UNGUENTUM ZINCI SULPHURATUM.

*(Unguentum contra Scabiem Jasseri.)*

- R. Axungiae porcinae Libram unam,  
Florum Sulphuris Uncias duas,  
Zinci sulphurici subtiliter pulverati Unciam unam.  
Misceantur in Unguentum.

## VINUM STIBIATUM.

*(Aqua benedicta Rulandi; Vinum emeticum; Essentia Stibii.)*

- R. Tartari stibiati Grana viginti sex,  
Vini Hispanici Libram unam,  
solve leni digestionem et filtra.

## VITRIOLUM MARTIS.

*Vid. Ferrum sulphuricum.*

## VITRUM ANTIMONII.

*Vid. Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum.*

## ZINCUM OXYDATUM ALBUM.

*(Flores Zinci.)*


- R. Zinci sulphurici quantum vis,  
solve in

Aquae fervidae decuplo,  
filtra et instilla sensim

Natri carbonici, in sufficiente quantitate Aquae soluti, quantum satis,  
ut praecipitetur oxydum Zinci. Praecipitatum probe edulcoratum et sic-  
catum, usui ferva.

---





# I N D E X.

- A**brotanum. 7.  
 Absinthium vulgare. 7.  
 Acacia nostra. 7.  
 Acetosella. 7.  
 Acetum. 8.  
     aromaticum. 93.  
     bezoardicum. 93.  
     concentratum. 94.  
     destillatum. 94.  
     Lithargyrii. 95.  
     prophylacticum. 94.  
     Rosarum. 94.  
     Rubi Idaei. 95.  
     saturinum. 95.  
         concentratum. 95. 112.  
     scilliticum. 96.  
 Achillea Millefolium. 58.  
     Parmica. 67.  
 Acidum benzoicum. 96.  
     citricum. 96.  
     muriaticum. 97.  
         oxydatum. 97.  
     nitricum concentratum. 98.  
 Acidum nitricum tenue. 98.  
     phosphoricum. 99.  
     Salis dephlogisticatum. 97.  
     succinicum. 99.  
     sulphuricum concentratum recti-  
         ficatum. 100.  
     sulphuricum dilutum. 100.  
     tartaricum. 100.  
 Acipenser Hufo. 49.  
     stellatus. 49.  
     Sturio. 49.  
 Aconitum. 8.  
     Napellus. 8.  
 Acorus Calamus. 22.  
     verus. 8.  
 Aerugo. 8.  
 Aes. 37.  
 Aesculus Hippocastanum. 47.  
 Aether aceticus. 101.  
     martialis. 102.  
     phosphoratus. 102.  
     sulphureus. 102.  
 Aethiops antimonialis. 102. 138.

# I N D E X.

Aethiops mineralis. 103. 138.

Agaricus Chirurgorum. 9.

muscarius. 9.

Alkali vegetabile aëratum. 103. 139.

volatile siccum. 103.

Alcanna rubra. 9.

spuria. 9.

Allium. 9.

Cepa. 28.

fativum. 9.

Aloë. 9.

caballina. 10.

depurata. 103. 132.

hepatica. 10.

lucida. 10.

perfoliata. 9.

spicata. 9.

succotrina. 10.

Althea. 10.

officinalis. 10.

Alumen crudum. 10.

ustum. 103.

vulgare. 10.

Ammoniacum Gummi. 11.

Sal. 11.

Ammonium carbonicum. 103.

pyro-oleosum. 104.

muriaticum. 11.

depuratum. 104.

martiatum. 104.

Amomum Cardamomum. 24.

Amomum Curcuma. 37.

Zingiber. 90.

Amygdalae amarae. 12.

dulces. 12.

Amygdalus communis. 12.

Amylum. 12.

Amyris elemifera. 39.

Anagallis. 12.

arvensis. 12.

Anchusa. 12.

tinctoria. 9.

Anemone pratensis. 67.

Anethum Foeniculum. 42.

Angelica. 12.

Archangelica. 12.

Angustura. 13.

Anima Rhei. 115. 179.

Anisum. 13.

stellatum. 13.

Anthemis nobilis. 29.

Anthophylli. 26.

Antimonii Butyrum. 105.

Vitrum. 105.

Antimonium crudum. 13.

praeparatum. 105.

Apis mellifera. 28. 55.

Apium Petroselinum. 65.

Aqua aërata. 105. 106.

aëris fixi. 105. 106.

Anisi. 105.

Anthos composita. 106.

# I N D E X.

Aqua benedicta Rulandi. 106.

Calcariae ustae. 106.

Calcis. 106.

carbonata. 106.

carmelitana. 107. 109.

Ceraforum. 107.

Cinnamomi simplex. 107.

vinosa. 108.

destillata simplex. 108.

Florum Aurantii. 109.

Naphae. 109.

Foeniculi. 105.

fortis. 108.

hungarica. 106. 108.

kalino-carbonata. 108. 109.

Lauro-Cerasi. 109.

laxativa. 108. 138.

Melissae. 109.

composita. 107. 109.

Menthae crispae. 109.

piperitidis. 109.

mephitico-alkalina. 108. 109.

Petroselinii. 105.

pyramontana. 13.

Rosarum. 109.

Sambuci. 109.

saturnina. 110.

sedlicensis. 13.

selterana. 14.

sulphurato-acidula. 110.

Aquifolium. 14.

Arbutus Uva ursi. 86.

Arcanum duplicatum. 110. 140.

Arctium Lappa. 18.

Areca Catechu. 27.

Argentum. 14.

foliatum. 14.

nitricum fusum. 110.

vivum. 14.

Aristolochia Serpentaria. 75.

Armoracia. 14.

Arnica. 14.

montana. 14.

Arsenicum album. 15.

Artemisia Abrotanum 7.

Absinthium. 7.

judaica. 31.

Santonica. 31.

Argem. 15.

maculatum. 15.

Asa dulcis. 15.

foetida. 15.

Asarum. 16.

europaeum. 16.

Asclepias Vincetoxicum. 48.

Asphaltum. 16.

Astragalus gummifer. 85.

Atropa Belladonna. 19.

Augustura. 16.

Aurantia. 16.

Axungia Porci. 17.



# INDEX.

**Baccæ Berberidum.** 20.

Juniperi. 50.

Lauri. 51.

Mori. 58.

Oxycocci. 63.

Piperis nigri. 65.

Rhamni cathartici. 69.

Ribesiae nigrae. 69.

rubrae. 69.

Rubi Chamaemori. 50.

Idaei. 70.

Sambuci. 73.

Spinae cervinae. 69.

**Balsamum apoplecticum.** 111.

canadense. 17.

cephalicum. 111.

Commendatoris. 111. 177.

de Copahu. 17.

Copaivæ. 17.

Embryonum. 111.

ophthalmicum rubr. 111. 182.

peruvianum. 18.

nigrum. 18.

saponaceum. 111.

Saturni. 95. 112.

Sulphuris anisatum. 112.

simplex. 112.

terebinthinatum. 112.

terebinthinatum. 112. 181.

traumaticum. 177.

Balsamum universale. 112.

vitæ externum. 113.

ad modum Hoffmanni. 113.

Bardana. 18.

Baryta muriatica. 113.

fulphurica. 19.

Edellium. 19.

Beccabunga. 19.

Belladonna. 19.

Benzoë. 19.

Berberis. 20.

vulgaris. 20.

Betula alba. 20.

Bismalva. 21.

Bismuthum. 21.

Bithumen judaicum. 21.

Boletus igniarius. 9.

Bolus Armena. 21.

Borax. 21.

tartarifata. 114.

veneta. 21.

Bos Taurus. 41.

Bovista. 21.

Brassica Eruca. 40.

Rapa. 68.

Brucea ferruginea. 13.

Bryonia. 21.

alba. 21.

Bubon Galbanum. 43.

Buglossum. 21.

Butyrum Antimonii. 114. 145.

# INDEX.

Butyrum Cacao. 114. 150.  
     Majoranae. 114.

Cacao. 22.

Calamus aromaticus. 22.

    Rotang. 73.

Calcaria sulphurata. 114. 135.

Calomelas. 136.

Calx. 22.

Camphora. 23.

Cannabis. 23.

    fativa. 23.

Cancer Astacus. 23.

Canella alba. 23.

Cantharides. 23.

Caoutchou. 24.

Capficum annuum. 65.

Carabe. 24.

Carbo praeparatus. 115.

    Spongiae. 115.

Cardamines. 24.

Cardamines pratensis. 24.

Cardamomum minus. 24.

Carduus benedictus. 24.

Carex arenaria. 24. 25.

Carica. 25.

Carum Carvi. 25.

Carvum. 25.

Caryophyllata. 25.

Caryophylli aromatici. 25.

Caryophyllus aromaticus. 25.

Cascarilla. 26.

Cassia Fistula. 26.

    Senna. 76.

Castor Fiber. 27.

Castoreum. 26.

Cataputia major. 27.

Catechu. 27.

Centaurea benedicta. 24.

Centaureum minus. 28.

Cepa. 28.

Cera. 28.

    ad Labia. 115.

    viridis. 116.

Cerafa acida. 28.

Ceratum Saturni. 116.

Cereoli exploratorii. 116.

    simplices. 116.

Cerussa alba. 28.

Cervus Elephas. 34.

Ceti sperma. 29.

Chalybs praeparata. 116. 134.

Chaerefolium. 29.

Chaerophyllum. 29.

Chamomilla romana. 29.

    vulgaris. 29.

Chelidonium majus. 30.

    vulgare majus. 30.

China ponderosa. 30.

Chryfocolla. 30.

Cichorium. 30.

# INDEX.

- Cichorium Intybus.* 30.  
*Cicuta aquatica.* 30.  
     *terrestris.* 31.  
     *virosa.* 30.  
*Cina.* 31.  
*Cinchona Caribaea.* 35.  
     *officinalis.* 35.  
*Cineres clavellati.* 32.  
     *depurati.* 116. 139.  
*Cinnamomum.* 31.  
*Citrullus.* 32.  
*Citrum.* 32.  
*Citrus Aurantium.* 16.  
     *medica.* 32.  
*Clavelli Cinnamomi.* 31. 33.  
*Clematis erecta.* 41.  
*Clutia Eluteria.* 26.  
*Coccinella.* 33.  
*Coccus Cacti.* 33.  
*Cochlearia.* 34.  
     *Armoracia.* 14.  
     *officinalis.* 34.  
*Colchicum autumnale.* 34.  
*Colla piscium.* 34.  
*Colocyntthis.* 34.  
*Colophonium.* 34.  
*Columbo.* 34.  
*Coma Centaurii minoris.* 28.  
     *Hypericonis.* 48.  
     *Hyssopi.* 48.  
     *Meliloti.* 56.  
*Coma Tanacetii.* 82.  
*Conserva dichotoma.* 47.  
*Coni Lupuli.* 53.  
*Conium maculatum.* 31.  
*Conserva Rosarum.* 117.  
*Convolvulus Jalappa.* 48.  
     *Scammonia.* 75.  
*Copaifera officinalis.* 17.  
*Coriandrum.* 34.  
     *fativum.* 34.  
*Cornu Cervi.* 34.  
     *sine igne praeparatum.* 117.  
*Cortex Angusturae.* 13.  
     *Angusturae.* 13. 16.  
     *Aurantiae.* 16.  
         *Curassaviensis.* 17.  
     *Betulae.* 20.  
     *Canellae albae.* 23.  
     *Caribaeus.* 35.  
     *Cascarillae.* 26.  
     *Cinchinae.* 35.  
         *flavus.* 36.  
         *regius.* 36.  
         *ruber.* 36.  
     *Cinnamomi.* 31.  
     *Citri.* 33.  
     *Eleutherii.* 26.  
     *Fraxini.* 42.  
     *Geoffroyae jamaicensis.* 44.  
         *surinamensis.* 44.  
     *Granatorum.* 45.

# I N D E X.

Cortex Guajaci. 45.  
     Hippocastani. 47.  
     Juglandis fructus. 50.  
     Mezerici. 58.  
     Peruvianus. 35.  
         flavus. 36.  
         regius. 36.  
         ruber. 36.  
     Quercus. 67.  
     Salicis. 72.  
     Sambuci. 73.  
     Simarubae. 77.  
     Soymidæ. 77.  
     Swietenia Mahagoni. 81.  
     Ulmi. 85.  
 Cremor Tartari. 36.  
     solubilis. 117. 174.  
 Crepitus Lupi. 36.  
 Creta alba. 36.  
 Crocus. 36.  
     Martis aperitivus. 134.  
     fativus. 36.  
 Croton Cascarillæ. 26.  
 Crystalli Tartari. 37.  
 Cubebæ. 37.  
 Cucumis. 37.  
     Colocynthidis. 34.  
     Melo. 56.  
     fativus. 37.  
 Cucurbita Citrullus. 32.  
 Cuprum. 37.

Cuprum aceticum. 37.  
     fulphuricum. 37.  
 Curcuma. 37.  
 Cydonia. 38.  
 Cynara. 38.  
     Scolymus. 38.  
 Cynosbata. 36.

Daphne Laureola. 58.  
     Mezereum. 58.

Datura. 38.  
     Strammonium. 38.  
 Daucus Carota. 38.  
     fativus. 38.  
     vulgaris. 38.

Decoctum laxativum viennense. 117. 138.  
 Dens Leonis. 38.  
 Digitalis purpurea. 38.  
 Dolichos pruriens. 77.  
 Dulcamara. 39.

Elaeosaccharum Anisi. 118.  
     Cinnamomi. 119.  
     Citri. 119.  
     Foeniculi. 119.  
     Menthae piperitæ. 119.

Electrum. 39.  
 Electuarium aperiens. 117.  
     mundificans. 117.



# I N D E X.

Electuarium Theriaca. 118.

Elemi. 39.

Eleutherium. 40.

Elixir acidum. 119.

aromaticum acidum. 119. 120.

balsamicum stomachicum ad modum Hoffmanni. 119.

paregoricum Londinense. 120.

pectorale. 120.

Regis Daniae. 120.

Ringelmanni. 120.

Vitrioli Mynsichti. 119. 120.

Emplastrum adhaesivum. 121.

album coctum. 121. 122.

de Ammoniaco. 121.

cum Asa foetida.

da. 121.

Anglicanum. 121.

Cantharidum ordinarium.

122. 127.

perpetuum.

122. 127.

Cerussae. 121. 122.

Cicutae. 123.

commune. 123.

Diachylon compositum. 123.

124.

simplex. 123.

de Euphorbio. 123. 125.

foetidum. 124.

griseum. 124. 125.

Emplastrum gummosum. 123. 124.

Hydrargyri. 124. 126.

ischiadicum. 123. 125.

de Lapide Calaminari. 124.

125.

Meliloti. 125.

mercuriale. 124. 126.

Minii camphoratum. 126.

miraculosum. 126.

Noricum. 126.

piceum. 126. 127.

saponatum. 126.

sticticum. 126. 127.

vesicatorium ordinarium.

122. 127.

perpetuum.

122. 127.

Enula. 40.

Epidendrum Vanilla. 87.

Eruca. 40.

Essentia Absinthii. 127.

amara. 127.

aromatica. 128.

Asae foetidae. 128.

Benzoës. 128.

Cantharidum. 128.

Castorei. 128.

aetherea. 129.

Centaurii minoris. 127.

Cinnamomi. 129.

Corticis Peruviani composita. 129.

# INDEX.

Essentia Corticis Peruviani simplex. 129.  
     viridis nucum Juglandis. 130.

corticum aurantiorum. 129.

    Cascarillae. 129.

Gei urbani. 129.

Gentianae. 129.

Ligni Quassiae. 129.

Myrrhae. 128.

Pimpinellae. 129.

Scillae. 130.

Stibii. 130.

Trifolii fibrini. 127.

Valerianae ammoniata. 130.

Vincetoxici. 129.

Euphorbia officinalis. 40.

Euphorbium. 40.

Extractum Absinthii. 130.

    Aconiti. 131.

    Aloës gummosum. 103. 132.

    Belladonnae. 131.

    Cardui benedicti. 131.

    Cascarillae. 131.

    catharticum. 133.

    catholicum. 133.

    Centaurei minoris. 131.

    Chamomillae vulgaris. 131.

    Chelidonii. 131.

    Cicutae virosae. 131.

    Columbo. 132.

    Conii maculati. 131.

Extractum Corticis Aurantiorum. 132.

    Geoffroyae. 131.

    Peruviani. 131.

Daturae. 131.

Fumariae. 131.

Gentianae. 131.

Graminis liquidum. 133.

Hellebori. 132.

Hippocastani. 131.

Hyoscyami. 131.

Ligni Guajaci. 132.

    Quassiae. 132.

Marrubii. 131.

Millefolii. 131.

nucum Juglandis. 131.

Opii. 133. 151.

panchymagogum. 133.

Rhei. 131.

    compositum. 133.

Saturni. 95.

Taraxaci liquidum. 133. 146.

Trifolii. 131.

Valerianae. 132.

Faba Pechurim. 64.

Fagara octandra. 81.

Fagus. 40.

    sylvatica. 40.

Farfara. 41.

Fel bovinum inspissatum. 134.



# INDEX.

Fel Tauri. 41.

Ferron. 41.

oxydatum fuscum. 134.

pulveratum. 116. 134.

fulphuricum. 41.

crystallifatum. 134. 159.

Ferula Afa foetida. 15.

Ficus Carica. 25.

Filix. 41.

Flammula Jovis. 41.

Flavedo Corticum Citri. 42.

Flores Acaciae nostrae. 7.

Anagallidis. 12.

Anthos. 42. 69.

Arnicae. 14.

Benzoës. 96.

Chamomillae romanae. 29.

vulgaris. 29.

Flammulae Jovis. 42.

Lavendularum. 51.

Malvae. 54.

Naphae. 42.

Papaveris. 63.

Rosarum incarnatarum. 69.

rubrarum. 69.

Rosmarini. 69.

Salis Ammoniaci martiales. 104.

Sambuci. 73.

Sulphuris. 81. 134.

loti. 170.

Tiliae. 84.

Flores Verbasci. 87.

Violae martiae. 88.

Zinci. 184.

Focnum graecum. 42.

Foeniculum. 42.

aquaticum. 42.

Folia Aquifolii. 14.

Afari. 16.

Aurantii. 17.

Belladonnae. 19.

Daurae. 38.

Digitalis purpureae. 38.

Farfarae. 41.

Flammulae Jovis. 41.

Lauri. 51.

Lauro-Cerasi. 51.

Querci. 67.

Ribesiae nigrae. 69.

Rosmarini sylvestris. 70.

Sabinae. 71.

Salviae. 72.

Sennae. 76.

Solani. 77.

Tabaci. 81.

Uvae ursi. 86.

Formica. 42.

rufa. 42.

Fraxinus. 42.

excelsior. 42.

Ornus. 54.

Fructus Ceraforum acidorum. 28.

# INDEX.

Fructus Cubebae. 37.

Cucumeris. 37.

Fagi. 40.

Vanillae. 87.

Vitis idaeae. 88.

Fumaria. 42.

officinalis. 42.

Fungus Querci. 43.

Galanga minor. 43.

Galbanum. 43.

Galla. 43.

Gambogia. 43.

Gelatina Liquiritiae. 135.

Gentiana Centaureum. 27.

purpurea. 44.

rubra. 44.

Geoffroya jamaicensis. 44.

inermis. 44.

surinamensis. 44.

Geum urbanum. 25. 44.

Glandes Querci. 68.

Globuli Tartari martiales. 135.

Glycyrrhiza. 44.

echinata. 44.

glabra. 44.

Gramen caninum. 44.

Granatorum cortices. 45.

Gratiola. 45.

officinalis. 45.

Guajacum. 45.

officinale. 45.

Gummi adstringens Fothergilli. 46.

Ammoniacum. 11.

arabicum. 46.

Aloe dulcis. 15. 19.

foetida. 15.

Bdellii. 19.

Benzoës. 15. 19.

Camphorae. 23.

Elemi. 39.

Euphorbii. 40.

Galbani. 43.

Gambienfe. 46.

Gambogiae. 46.

Guajaci. 45.

Guttae. 46.

Gamba. 46.

Juniperi. 73.

Kino. 46.

Laccæ. 50.

Mastichis. 55.

Myrrhae. 60.

Olibani. 61.

Opopanax. 62.

Sagapœnum. 71.

Sandarach. 73.

Sanguinis Draconis. 73.

Senegal. 46.

Storacis Calamitæ. 79.

rubrum adstringens. 46.

# INDEX.

Gummi Tacamahacae. 81.

Tragacanthae. 85.

**H**aematoxylon Campefcianum. 22.

Helenium. 47.

Helleborus niger. 47.

Helminthochortum. 47.

Hepar Antimonii. 135. 140.

fulphuris. 140.

calcareum. 114. 135.

salinum. 135. 140.

Herba Abrotani. 7.

Abfinthii. 7.

Acetofellae. 7.

Aconiti. 8.

Altheae. 10.

Arnicae. 14.

Beccabungae. 19.

Belladonnae. 19.

Cardamines. 24.

Cardui benedicti. 24.

Chamomillae vulgaris. 29.

Chaerophylli. 29.

Chelidonii majoris. 30.

Cicutae aquaticae. 30.

terrestris. 31.

Cochleariae. 34.

Cynarae. 38.

Daturae. 38.

Farfarae. 41.

Herba Fumariae. 42.

Gratiolae. 45.

Hyoscyami. 48.

Jaceae. 88.

Majoranae. 53.

Malvae. 54.

Marrubii. 55.

Matricariae. 55.

Melissae citratae. 56.

Menthae crispae. 57.

piperitae. 57.

Millefolii. 58.

Nasturtii aquatici. 60.

Nicotianae. 60. 81.

Origanj. 63.

Polygalae amarae. 66.

Pulsatillae nigricantis. 67.

Rosmarini. 69.

Rutae. 70.

Salviae. 72.

Scordii. 75.

Serpilli. 76.

Tabaci. 81.

Taraxaci. 82.

Thymi vulgaris. 84.

Trifolii fibrini. 85.

Tussilaginis. 41.

Veronicae. 87.

Violae tricoloris. 88.

Hippocastanum. 47.

Hirudo. 47.

# INDEX.

*Hirudo medicinalis.* 47.

*Hirundinaria.* 47.

*Hordeum vulgare.* 53.

*Humulus Lupulus.* 53.

*Hydrargyrum.* 48.

*muriaticum corrosivum.* 136.

*mite.* 136.

*praecipitatum.* 136.

*nitricum.* 137.

*oxydatum rubrum.* 137.

*nigrum.* 137.

*stibiato-fulphuratum.*

        102. 138.

*fulphuratum nigrum.*

        103. 138.

*Hyoscyamus.* 48.

*niger.* 48.

*Hypericon.* 48.

*Hypericum perforatum.* 48.

*Hyslopus.* 48.

*officinalis.* 48.

*Jacea.* 88.

*Jalappa.* 48.

*Jasminum officinale.* 49.

*Jathropha elastica.* 68.

*Ichthyocolla.* 49.

*Ilex Aquifolium.* 14.

*Illicium anisatum.* 13.

*Infusum Sennae compositum.* 108. 117. 138.

*Inula Helenium.* 40.

*Ipecacuanha.* 49.

*Iris florentina.* 49.

*Juglans.* 50.

*regia.* 50.

*Juniperus.* 50.

*communis.* 50.

*Lycia.* 61.

*Sabina.* 71.

*Thurifera.* 61.

**K** *ali acetium.* 139.

*carbonicum.* 50. 103. 116. 139. 159.

*causticum siccum.* 139. 141.

*nitricum.* 50.

*fulphuratum.* 135. 140.

*fulphurato-stibiato.* 135. 140.

*fulphuricum.* 110. 140.

*tartaricum.* 141. 176.

*Kermes minerale.* 171.

**L** *aculphuris.* 170.

*Lacca.* 50.

*in baculis.* 51.

*in granis.* 51.

*in tabulis.* 51.

*Lapathum acutum.* 51.

*Lapides cancerorum.* 23.

*Lapis Calaminaris.* 22.



# INDEX.

- Lapis causticus. 139. 141.  
     infernalis. 110.  
 Lappa major. 18.  
 Laudanum liquidum Sydenhami. 141.  
     Warneri. 141.  
 Lauro-cerasus. 51.  
 Laurus. 51.  
     Camphora. 23.  
     Cinnamomum. 31.  
     nobilis. 51.  
     Pechurim. 64.  
     Sassafras. 74.  
 Lavendula. 51.  
     spica. 51.  
 Ledum palustre. 70.  
 Leontodon Taraxacum. 82.  
 Levisticum. 52.  
 Lichen islandicus. 52.  
 Lignum Campefcianum. 22.  
     Campefcienfe. 22.  
     Gajaci. 45.  
     Juniperi. 50.  
     Quaffiae. 67.  
     fanctum. 45.  
     Sassafras. 74.  
     Swieteniae Mahagoni. 81.  
 Ligulticum. 52.  
     Levulticum. 52.  
 Limatura martis praeparata. 134.  
 Linimentum ammoniatum. 141.  
     ammoniato-camphoratum. 141.  
 Linimentum volatile. 141.  
     camphoratum. 141.  
 Linum fativum. 52.  
     ulitativum. 52.  
 Liquamen Myrrhae. 144.  
 Liquidambar styraciflua. 80.  
 Liquiritia. 52.  
 Liqueur Ammonii acetici. 142.  
     carbonici aquofii. 142.  
     cauftici. 142.  
     pyro-oleofii. 143.  
     fuccinati. 143. 144.  
     vinofus. 143.  
 Anodynus martialis. 143.  
     mineralis Hoffm. 143.  
 Bellofti. 143. 144.  
 Cornu Cervi fuccinatus. 143. 144.  
 Hydrargyri nitrici. 143. 144.  
 Kali acetici. 144.  
     carbonici. 144.  
 Myrrhae. 144.  
 nervinus. 144.  
 probatorius Hahnemanni. 110.  
 faponis ftibiati. 145. 171. 176.  
 Stibii muriatici. 105. 114. 145.  
 ftipticus Loffii. 145. 150.  
 Terrae foliatae Tartari. 144.  
     ponderofae falitae. 145. 160.  
 Lithargyrium Argenti. 52.  
 Lupulus. 53.  
 Lycoperdon Bovifta. 21.

# INDEX.

- Lycopodium*. 53.  
     *clavatum*. 53.  
*Lytta vesicatoria*. 23.  
  
*Macis*. 59.  
*Magnesia alba*. 146.  
     *calcinata*. 146.  
     *carbonica*. 146.  
     *salis amari*. 146.  
     *fulphurica*. 53.  
     *usta*. 146.  
     *vitriariorum*. 53.  
*Magnesium oxydatum nativum*. 53.  
*Majorana*. 53.  
*Mala Aurantii*. 16.  
     *Citri*. 32.  
*Malicorium*. 53.  
*Malthum*. 53.  
*Malva*. 54.  
     *rotundifolia*. 54.  
     *sylvestris*. 54.  
*Manna*. 54.  
*Maranta Galanga*. 43.  
*Marasita*. 54.  
*Marubium*. 55.  
     *vulgare*. 55.  
*Mastix*. 55.  
*Matricaria*. 55.  
     *Chamomilla*. 29.  
     *Parthenium*. 55.  
     *Matricaria fravecolens*. 29.  
*Mel*. 55.  
     *despumatum*. 56. 146.  
     *Narbonense*. 56.  
     *Rofarum*. 146.  
     *virgineum*. 56.  
*Melaleuca Leucadendrum*. 22.  
*Melampodium*. 56.  
*Melilotus*. 56.  
*Melissa citrata*. 56.  
     *officinalis*. 56.  
*Mellago Graminis*. 133.  
     *Taraxaci*. 133. 146.  
*Melo*. 56.  
*Meloë Proscarabaeus*. 75.  
     *vesicatorius*. 23.  
*Mentha crispa*. 57.  
     *piperita*. 57.  
*Menyanthes trifoliata*. 85.  
*Mercurius*. 57.  
     *dulcis*. 136.  
     *nitrosus*. 137.  
     *praecipitatus albus*. 136.  
         *ruber*. 137.  
     *solubilis*. 137.  
     *sublimatus corrosivus*. 136.  
*Mezereum*. 58.  
*Millefolium*. 58.  
*Mimosa Catechu*. 27.  
     *nilotica*. 46.  
*Minium*. 58.



# INDEX.

Morus. 58.

nigra. 58.

Moschata Nux. 58. 60.

Moschus. 59.

Muscus islandicus. 60.

Myristica moschata. 58.

Nux. 60. 58.

Myrrha. 60.

**N**aphta Aceti. 101.

phosphorata. 102.

Vitrioli. 102.

Nasturtium aquaticum. 60.

Natrum aceticum. 147. 176.

carbonicum. 60.

muriaticum. 60.

phosphoricum. 147. 160.

fulphuricum crystallifatum. 147.

Nicotiana. 60.

Tabacum. 81.

Nitrum crudum. 60.

Nuclei Ceraforum. 28.

Nux Moschata. 58. 60.

Myristica. 58. 60.

vomica. 61.

**O**culi Populi. 66.

Olea europaea. 61.

Oleum Absinthii aethereum. 147.

Oleum Absinthii coctum. 148.

Amygdalarum. 149.

animale aethereum. 149.

Dippelii. 149.

foetidum. 149. 150.

Anthos. 148.

Asphalti. 61.

Baccarum Juniperi. 148.

Bergamottae. 20.

Betulinum. 20.

Brusci. 20.

Cacao. 114. 150.

Cajeput. 22.

camphoratum. 150.

Caryophyllorum. 148.

de Cedro. 61.

Cerae. 150.

Chamomillae vulgaris. 149.

Cinnamomi. 148.

Cornu Cervi foetidum. 149. 150.

corticum Aurantiorum. 20.

Fiorum Lavendulae. 148.

Fructuum Fagi. 149.

Herbae Majoranae. 148.

Menthae crispae. 148.

piperitae. 148.

Origani. 148.

Rorismarini. 148.

Tanacetii. 148.

Thymi. 148.

Hyoscyami. 149.

# I N D E X.

Oleum Hyperici coctum. 149.

Jasmini. 49.

Juniperi. 61.

Lauri. 61.

Lini. 52.

Macis. 148.

Martis. 145. 150.

Moschatae. 59.

\*Nucis moschatae. 151.

Nucistae. 151.

Olivarum. 61.

Ovorum. 151.

Petrae album. 61.

Raparum. 68.

Ricini. 61.

Rufci. 20.

Seminum Anisi. 148.

Carvi. 148.

Foeniculi. 148.

Lini. 149.

Ricini. 149.

Succini. 151.

Tartari per deliquium. 144.

Terebinthinae. 61.

Vitrioli. 100.

Olibanum. 61.

Ononis arvensis. 62.

spinosa. 62.

Opium. 62.

depuratum. 133. 151.

Opopanax. 63.

Orchis latifolia. 72.

maculata. 72.

militaris. 72.

Morio. 72.

pyramidalis. 72.

Origanum. 63.

Majorana. 53.

vulgare. 63.

Ova Gallinae. 63.

Oxalis Acetosella. 7.

Oxycoccos. 63.

Oxymel scilliticum. 151.

simplex. 152.

Papaver album. 63.

somniferum. 62. 63.

Passulae laxativae. 152.

majores. 63.

minores. 64.

Pasta Altheae. 152.

Pastinaca Opopanax. 63.

Pechurim. 64.

Petroleum album. 64.

Petroselinum. 65.

Phasianus Gallus. 63.

Phellandrium. 65.

aquaticum. 65.

Phosphorus. 153.

Phyteter macrocephalus. 29.

Pilulae aethiopicae. 153.

# INDEX.

- Pilulae aperientes.* 153.  
     *contra obstructionem.* 153.  
     *foetidae.* 154.  
     *laxantes cum Mercurio.* 154.  
     *purgantes.* 154.  
     *resolventes.* 154.  
     *scilliticae.* 154.  
     *tonico-nervinae.* 155.  
*Pimpinella alba.* 65.  
     *Anisum.* 13.  
     *saxifraga.* 65.  
*Pinus balsamea.* 83.  
     *canadensis.* 83.  
     *Larix.* 83.  
     *sylvestris.* 83.  
*Piper album.* 66.  
     *caudatum.* 37.  
     *hispanicum.* 65.  
     *indicum.* 65.  
     *nigrum.* 65.  
*Pistacia Lentiscus.* 55.  
*Pitcramia exeelsa.* 67.  
*Pix liquida.* 66.  
     *navalis.* 84.  
     *nigra.* 84.  
     *solida.* 66.  
*Plumbum.* 66.  
     *aceticum.* 155.  
     *carbonicum.* 66.  
     *oxydatum.* 66.  
*Polygala amara.* 66.  
     *Senega.* 75.  
     *Polypodium.* 66.  
         *Filix mas.* 41.  
         *vulgare.* 66.  
*Poma Colocynthidis.* 34.  
*Populus.* 66.  
     *nigra.* 66.  
*Pruna.* 67.  
*Pruneola.* 67.  
*Prunus Brignolensis.* 67.  
     *Cerasus.* 28.  
     *domestica.* 67.  
     *Lauro-Cerasus.* 51.  
     *spinosa.* 7.  
*Psychotria emetica.* 49.  
*Ptarmica.* 67.  
*Pulpa Cassiae.* 155.  
     *Prunorum.* 156.  
     *Tamarindorum.* 81. 156.  
*Pulsatilla nigricans.* 67.  
*Pulvis alterans Edinburgensis.* 156.  
     *aëriphorus.* 156.  
     *carbonum.* 115.  
     *dentifricius.* 156.  
     *Doweri.* 157.  
     *Jalappae compositus.* 157.  
     *Infantum.* 157.  
     *Ipecacuanhae compositus.* 157.  
     *laxans.* 157.  
     *Magnesia compositus.* 157.  
     *refrigerans.* 158.

# INDEX.

Pulvis temperans camphoratus. 158.

vermifugus. 158.

Punica Granatum. 45.

Pyrus Cydonia. 38.

**Quassia.** 67.

Samaruba. 77.

Quercus. 67.

Cerris. 43.

Rgbur. 67.

**Radix Alkannae rubrae.** 9.

Allii. 9.

Altheae. 10.

Angelicae. 12.

Ari. 15.

Armoraciae. 14.

Afari. 16.

Bardanae. 18.

Belladonnae. 19.

Bryoniae. 21.

Calami aromatici. 22.

Caricis arenariae. 25.

Caryophyllatae. 25.

Cepae. 28.

Chelidonii majoris. 30.

Chinae. 30.

Cichorii. 30.

Colchici. 34.

Radix Columbae. 34.

Curcumae. 37.

Dauci Carottae. 38.

Enulae. 40.

Farfarae. 41.

Filicis. 41.

Foeniculi. 42.

Galangae minoris. 43.

Gei urbani. 25.

Gentianae rubrae. 44.

Glycyrrhizae. 44.

Graminis. 45.

Gratiolae. 45.

Helenii. 40.

Hellebori nigri. 47.

Hirundinariae. 48.

Jalappae. 48.

Ipecacuanhae. 49.

Iridis florentinae. 49.

Lapathi acuti. 51.

Lappae majoris. 18.

Levistici. 52.

Ligustici. 52.

Ononidis spinosae. 62.

Pimpinellae albae. 65.

Polygalae amarae. 66.

Polypodii. 66.

Pruniceae. 67.

Raphani rusticani. 68.

Rhabarbari. 68.

Rhei. 68.



# INDEX.

- Radix Rubiae tinctorum.* 70.  
     *Salab.* 72.  
     *Saleb.* 72.  
     *Saponariae.* 74.  
     *Sarsaparillae.* 74.  
     *Scillae.* 79.  
     *Senegae.* 75.  
     *Serpentariae virginianae.* 76.  
     *Spigeliae Anthelmiae.* 78.  
         *marilandicae.* 78.  
     *Taraxaci.* 82.  
     *Valerianae hortensis.* 86.  
         *sylvestris.* 86.  
     *Vincetoxici.* 48.  
     *Zingiberis.* 90.  
*Raparum oleum.* 68.  
*Raphanus rusticanus.* 68.  
*Regulus Antimonii.* 159.  
*Resina communis.* 68.  
     *elastica.* 68.  
     *Guajaci.* 68. 158.  
     *Jalappae.* 158.  
     *Juniperi.* 68. 73.  
*Rhabarbarum.* 68.  
*Rhamnus catharticus.* 68. 69.  
*Rheum.* 69.  
     *palmatum.* 68.  
     *undulatum.* 68.  
*Ribes nigrum.* 69.  
     *rubrum.* 69.  
*Ricinus communis.* 27.  
     *Ribes nigrum.* 69.  
         *rubrum.* 69.  
*Roob Juniperi.* 159.  
*Rosa canina.* 38.  
     *centifolia.* 69.  
     *Damascena.* 69.  
     *incarnata.* 69.  
     *rubra.* 69.  
*Rosmarinus.* 69.  
     *officinalis.* 69.  
     *sylvestris.* 69.  
*Rubia tinctorum.* 70.  
*Rubus Chamaemorus.* 70.  
     *Idaeus.* 70.  
*Rumex acutus.* 51.  
*Ruta.* 70.  
     *graveolens.* 70.  
*Sabadilla.* 70.  
*Sabina.* 71.  
*Saccharum.* 71.  
     *clarificatum.* 159. 174.  
     *lactis.* 71.  
     *officinale.* 71.  
     *Saturni.* 155.  
*Sagapenum.* 71.  
*Sal Acetosellae.* 71.  
     *Ammoniacum depuratum.* 104.  
     *Anglicum.* 72.  
     *catharticum.* 72.

# I N D E X.

- Sal culinare. 72.
- Ebshamenfe. 72.
- essentiale Tartari. 100.
- gemmae. 72.
- Martis. 134. 159.
- mirabile Glauberi. 147.
- plantarum. 139. 159.
- polychrestum de Seignette. 159. 175.
- Scidlicense. 72.
- Succini. 99.
- Tartari. 139. 159.
- volatile Cornu Cervi. 104.
- Salab. 72.
- Saleb. 72.
- Salix. 72.
- alba. 72.
- fragilis. 72.
- pentandra. 72.
- vitellina. 72.
- Salvia. 72.
- officinalis. 72.
- Sambucus. 73.
- nigra. 73.
- Sandaraca. 73.
- Sandarach. 73.
- Sanguis Draconis. 73.
- Santonium. 74.
- Sapo alicantinus. 74.
- antimonialis. 159.
- jalappinus. 159.
- stibiatus. 159. 160.
- Saponaria. 74.
- officinalis. 74.
- Sarfa. 74.
- Sarsaparilla. 74.
- Sassafras. 74.
- Scammonium. 75.
- Scandix Cerefolium. 29.
- Scarabaeus unctuosus majalis. 75.
- Scilla. 79.
- Scordium. 75.
- Semen Amygdalarum amararum. 12.
- dulcium. 12.
- Anisi. 13.
- stellati. 13.
- Cacae. 22.
- Cannabis. 23.
- Cardamomi. 24.
- Carvi. 25.
- Cataputiae majoris. 27.
- Cinae. 31.
- Citrulli. 32.
- Coriandri. 34.
- Cucumeris. 37.
- Cydoniorum. 38.
- Erucae. 40.
- Foeniculi. 42.
- Foeni graeci. 42.
- Hordei vulgaris. 53.
- Hyoscyami. 48.
- Lini sativi. 52.
- Lycopodii. 53.



# INDEX

- Semen Melonis. 56.  
     Papaveris albi. 63.  
     Petrofelini. 65.  
     Phellandrii aquatici. 65.  
     Ricini vulgaris. 27.  
     Sabadillae. 70.  
     Sinapis. 77.  
     Tanacetii. 82.  
     Tritici. 12.  
     Urticae. 86.  
 Senega. 75.  
 Senna. 76.  
 Serpentaria virginiana. 76.  
 Serpillum. 76.  
 Sevum bovinum. 76.  
     cervinum. 76.  
     ovillum. 66.  
     vervecinum. 76.  
 Siliqua hirsuta. 77.  
 Simaruba. 77.  
 Sinapis. 77.  
     alba. 77.  
     nigra. 77.  
 Silybrium Nasturtium aquaticum. 60.  
 Smilax China. 30.  
     Sarsaparilla. 74.  
 Soda. 77.  
     phosphorata. 147. 160.  
 Solanum. 77.  
     Dulcamara. 39.  
     furosum. 77.  
     Solanum nigrum. 77.  
     Solutio Barytae muriaticae. 145. 160.  
     Soymida. 77.  
     Spathum ponderosum. 78.  
     Species pro Cataplasmate emolliente. 160.  
         pro Decocto lignorum. 161.  
         discutientes. 162.  
         pro Enemate. 160.  
         fumales. 161.  
         optimae. 162.  
         pro infuso pectorali. 162.  
         resolventes externae. 162.  
 Spigelia Anthelmia. 78.  
     marilandica. 78.  
 Spina cervina. 78.  
 Spiritus alexiterius. 163.  
     aromaticus. 163.  
     Cochleariae. 163.  
     Cornu Cervi rectificati. 163.  
     corticum Aurantiorum. 163.  
     Lavendularum. 164.  
         compositus. 164.  
     Mindereri. 142. 164.  
     muriatico-aethereus. 164.  
     nitri acidus. 98. 165.  
         dulcis. 165.  
         fumans. 98. 165.  
     nitrico-aethereus. 165.  
     Salis acidus. 97. 165.  
         ammoniaci aquosus. 142. 165.

# INDEX.

- Spiritus Salis ammoniaci cum Calce viva  
     paratus. 142. 165.  
     vinosus. 143. 166.  
     dulcis. 164. 166.  
     saponatus. 166.  
     fulphurico-aethereus. 143. 166.  
         camphoratus.  
             143. 166.  
         martiatus.  
             143. 166.  
     Vini. 78.  
         camphoratus. 167.  
         rectificatissimus. 167.  
     Vitrioli. 100. 167.
- Spongia. 79.  
     cerata. 167.  
     officinalis. 79.  
     usta. 115.
- Squilla. 79.  
     maritima. 79.
- Stalagmites cambogioides. 46.
- Stannum. 79.
- Stibium. 79.  
     oxydatum fulphuratum vitrificatum.  
         105. 168.  
     purum. 159. 168.  
     fulphuratum nigrum. 79.  
         laevigatum.  
             105. 168.
- Stipites Dulcamarae. 39.
- Storax Calamita. 79.
- Strychnos Nux vomica. 61.
- Styrax Benzoë. 19.  
     liquida. 80.  
         vera. 80.  
     officinalis. 79.
- Succinum. 80.
- Succus Aloës. 9.  
     Aurantiorum. 169.  
     Berberidum. 20.  
     Betulae. 20.  
     Catechu. 27.  
     Citrî. 32. 169.  
     Juniperi inspissatus. 159. 169.  
     Liquiritiae. 169.  
     Mororum. 169.  
     Opii. 62.  
     Sambuci inspissatus. 169.  
     Scammoniae. 75.
- Sulphas Baryta. 78.
- Sulphur auratum Antimonii. 169. 170.  
     liquidum. 145.  
     citrinum. 80.  
     depuratum. 170.  
     praecipitatum. 170.  
     stibiatum aurantiacum. 170.  
         liquidum. 171.  
         rubrum. 171.  
     vulgare. 80.
- Swietenia febrifuga. 77.  
     Mahagoni. 81.  
     Soymida. 77.

# I N D E X.

Syrupus acetositis Citri. 171.

de Althea. 172.

Amygdalarum. 172.

Berberum. 171.

Ceraforum acidorum. 171.

Corticis Aurantiorum. 172.

Diacodion. 173.

emulsivus. 172.

Fragarum. 171.

e Manna. 173.

Mororum. 171.

Papaveris. 173.

albi. 173.

Rhei. 174.

Ribium. 171.

Rubi Idaci. 171.

Sacchari. 174.

depurati. 159.

**T**abacum. 81.

Tacamahaca. 81.

Tamarindus. 81.

indica. 81.

Tanacetum. 82.

vulgare. 82.

Taraxacum. 82.

Tartarus ammoniatus. 174.

boraxatus. 114. 117. 174.

emeticus. 175.

natronatus. 159. 175.

Tartarus solubilis ammoniacalis. 174. 175.

stibiatus. 175.

tartarifatus. 141. 176.

vini. 82.

vitriolatus. 140.

Terebinthina. 83.

canadensis. 83.

communis. 83.

laricina. 83.

veneta. 83.

Terra Catechu. 27.

foliata tartari. 139. 176.

crystallifata. 147. 176.

japonica. 27. 84.

ponderosa salita. 113. 176.

Teucrium Scordium. 75.

Thea amara. 176.

Theobroma Cacao. 22.

Thuja articulata. 73.

Thus. 84.

Thymus serpillum. 76.

vulgaris. 84.

Tilia. 84.

europaea. 84.

Tincal. 21. 84.

Tinctura Antimonii Jacobi. 145. 176.

Benzoës composita 111. 112. 177.

cathartica. 177.

ferri acetici-aetherea. 102. 177.

Guajaci ammoniata. 178.

spirituosa. 178.

# I N D E X.

Tinctura Guajaci volatilis. 178.  
     Opii ammoniata. 141. 178.  
         crocata. 141. 178.  
         simplex. 179.  
         spirituosa. 179.  
 Rhabarbari aquosa. 105. 179.  
         vinosa. 180.  
 Rhei aquosa. 105. 179.  
 Tragacantha. 85.  
 Trifolium fibrinum. 85.  
     Melilotus officinalis. 56.  
 Trigonella Foenum graecum. 42.  
 Triticum hybernum. 12.  
     repens. 45.  
     turgidum. 12.  
 Turiones Pini. 85.  
 Tussilago. 85.  
  
**U**lmus. 85.  
     campestris. 85.  
 Unguentum Altheae. 180.  
     Basilicum. 180.  
     Cerussae. 180.  
         camphoratum. 181.  
         digestivum. 112. 181.  
     Hydraegyri cinereum. 181.  
         citrinum. 181.  
         rubrum. 182.  
     Neapolitanum. 181. 182.  
     nervinum. 182.

Unguentum Nihili. 183.  
     ophthalmicum rubrum. 182.  
     Rosmarini compositum. 182.  
     Saturninum. 183.  
     ad Scabiem. 183.  
     ad Scabiem, Jasseri. 184.  
     Sulphuris. 183.  
     Zinci. 183.  
         sulphuratum. 184.

Urtica. 86.  
     dioica. 86.  
 Uva ursi. 86.

**V**accinium Oxycoccos. 63.  
     Vitis idaea. 88.  
 Valeriana hortenensis. 86.  
     officinalis. 86.  
     Phu. 86.  
     sylvestris. 86.

Vanilla. 87.  
 Veratrum Sabadilla. 70.  
 Verbascum. 87.  
     Thapsus. 87.

Veronica. 87.  
     Beccabunga. 19.  
     officinalis. 87.

Vincetoxicum. 87.

Vinum. 87.

    Gallicum album. 87.  
     rubrum. 87.

# INDEX.

Vinum Hispanicum. 88.

Lusitanicum. 87.

Maderense. 88.

Malacense. 88.

Rhenanum. 88.

stibiatum. 106. 184.

Viola Martia. 88.

odorata. 88.

tricolor. 88.

Viride aeris. 8. 88.

Vitellus Ovi. 63.

Vitis apyrena. 64.

idaea. 88.

vinifera. 63. 87.

Vitriolum album. 89.

coeruleum. 89.

de Cypro. 89.

Martis. 89. 134. 184.

viride. 89.

Vitrum Antimonii. 184.

Winterana Canella. 23.

Zincum. 89.

oxydatum album. 184.

fulphuricum. 89.

Zingiber. 90.

---



## Dansk Register.

Nakersiffel. 42.

Nbrod. 7.

Nedike. 8.

Nrenpriis. 87.

Ngerborre. 18.

Ngerffreppe. 18.

Ngerum. 28.

Ngurk. 37.

Nlandsrod. 40.

Nllun. 10.

Nllui. 85.

Nloe. 9.

Nlthee. 10.

Nmerikansk Brækrod. 49.

Ormeurt. 78.

Nmmoniaf. 11.

Nmur. 56.

Nngelik. 12.

Nngurier. 32.

Nugustura. 13.

Nnnis. 13.

Npothekerperikum. 48.

Nrabiff Gummi. 46.

Nrmeniff Bolus. 21.

Nrtiffok. 38.

Nst. 42.

Nring. 44.

Nxrod. 44.

Naldrian. 86.

Narbel. 58.

Narsleik. 87.

Naxergeel. 26.

Nbellium Gummi. 19.

Nelbung. 19.

Nenzoe. 19.

Nerberisbær. 20.

Nergamotolie. 20.

Nergfonge. 63.

Nhynte. 63.

Nernsteen. 80.

Nesteklover. 85.

Niergrad. 65.

Nirkeolie. 20.

Nirkesaft. 20.



## Dansk Register.

Bittersæde. 39.  
 Blaacmunke. 8.  
 Blaae Vitriol. 89.  
 Bladselv. 14.  
 Bleghyidt. 28.  
 Blodblomster. 48.  
 Blodigle. 47.  
 Blommer. 67.  
 Blye. 66.  
 Beg. 40.  
 Bomolie. 61.  
 Bølgeblade. 35.  
 Borax. 21.  
 Borre. 18.  
 Brændenælde. 86.  
 Brændeurt. 41.  
 Brændeviin. 78.  
 Bregne. 41.  
 Brisf. 50.  
 Bruneller. 67.  
 Brunsteen. 53.  
 Bruse. 50.  
 Bryngebær. 70.  
 Buxæffe. 41.  
 Bukkehorn. 42.  
 Bulmeurt. 48.

Cacaobenner. 22.  
 Cajaputolie. 22.  
 Calmus. 22.

Camelblom. 29.  
 Camelblomster. 29.  
 Campher. 23.  
 Carabiff Kinabatf. 35.  
 Cardamommer. 24.  
 Carmosinorm. 33.  
 Cassa-Gaiffe. 41.  
 Cassie. 26.  
 Castarille. 26.  
 Chinarod. 30.  
 Christstorn. 14.  
 Citron. 32.

Hiertensfynd. 56.

Melisse. 56.

Cochlearia. 34.  
 Coloquinder. 34.  
 Columbo. 34.  
 Copaiabalsom. 17.  
 Corbendist. 24.  
 Corender. 64.  
 Coriander. 34.  
 Cubeber. 37.  
 Cuzzinel. 33.

Dansk Ingeser. 15.  
 Kommen. 25.

Desmer. 59.  
 Drageblod. 73.  
 Dyvelsdref. 15.

# Dansk Register.

Edikeroſe. 69.  
 Egebregne. 66.  
 Egeſvamp. 9.  
 Egetræ. 67.  
 Einc. 50.  
 Elastiſk Harpir. 68.  
 Elemi. 39.  
 Elm. 85.  
 Ene. 50.  
 Enebær. 50.  
 Enebærgummi. 73.  
 Ener. 50.  
 Engkaſſe. 24.  
 Engeliſk Larcersalt. 72.  
 Engeliſød. 66.  
 Euphorbiumgummi. 40.  
 Faaretalg. 76.  
 Fadnobuſk. 12.  
 Fadaoranſſe. 12.  
 Fadnorvotas. 12.  
 Fandensnoffer. 48.  
 Fandenspunge. 48.  
 Fatno. 12.  
 Fennikel. 42.  
 Fieſldgræs. 52.  
 Figen. 25.  
 Fiisop. 21.  
 Finmarkekaal. 34.

Fiolrod. 49.  
 Fivel. 82.  
 Flesmegræs. 87.  
 Fløtelsurt. 88.  
 Flueſvamp. 9.  
 Føllefød. 41.  
 Fenugræs. 42.  
 Fyldroſe. 69.  
 Fyrreknopper. 85.  
 Gaascheel. 12.  
 Galanga. 43.  
 Galæbler. 43.  
 Galbanyum. 43.  
 Galdebær. 21.  
 Galmey. 22.  
 Galurt. 38.  
 Gedeklov. 85.  
 Gemeen Terpentien. 83.  
 Giegeblomſter. 24.  
 Giegemad. 7.  
 Giegeurt. 7.  
 Gienſokblomme. 14.  
 Goffas. 50.  
 Granatæble. 45.  
 Grin ved Dag. 12.  
 Grin ved Middag. 12.  
 Greſte Moliſoor. 41.  
 Gren Vitriol. 89.  
 Guajaſ. 45.

## Dansk Register.

Gudsnaadeurt. 45.

Guldbloemme. 14.

Gulerod. 38.

Gummigut. 46.

Gummitak. 50.

Gurkemeie. 37.

Gul Kinabark. 36.

Gul Svovl. 80.

Haarklaggborrrer. 18.

Hak og Tak. 81.

Hamp. 23.

Handblom. 41.

Harbøns. 58.

Hasselurt. 16.

Heilsota. 66.

Heedbregne. 41.

Hestebloemme. 14.

Hestecastanier. 47.

Hestegilding. 62.

Hestehov. 41.

Hestesolvie. 14.

Hestesyre. 51.

Himbær. 70.

Hindbær. 70.

Hiortebær. 68.

Hiortetakke. 34.

Hiortetalg. 76.

Hønsbane. 48.

Hønsæg. 63.

Hør. 52.

Hønning. 55.

Hørsetander. 48.

Hørblad. 41.

Hørrødd. 41.

Humle. 53.

Hundebær. 21. 39.

Hundegræs. 44.

Hunsblas. 49.

Hvalraff. 29.

Hvid Kaneel. 23.

Leg. 9.

Kride. 36.

Kegnsan. 67.

Kennep. 40.

Kreenolie. 64.

Kalmie. 63.

Kitriol. 89.

Kyben. 38.

Kyld. 73.

Kyperikum. 58.

Kalap. 48.

Kamaikansk Drimbarktræ. 44.

Kaponisk Jord. 27.

Kasminolie. 49.

Kentesbær. 50.

Kern. 41.

Kitriol. 89.

Kngever. 90.

## Dansk Register.

Jedebeeg. 16.  
Jomfruehonning. 56.  
Jordhumle. 48. 58.  
Jordmos. 53.  
Jordreg. 42.  
Islandsk Mos. 52.  
Isop. 48.

Kabbelaup. 82.  
Kalk. 22.  
Kampesketræ. 22.  
Kanadisk Balsom. 83.  
Terpentin. 83.

Kaneel. 31.  
Karve. 25.  
Karvi. 25.  
Katteost. 54.  
Kielderhals. 58.

Kina. 35.  
Kinabark. 35.  
Kinsbast. 58.  
Klæghorrer. 18.  
Klaret Honning. 56.  
Klevhumle. 63.  
Kleende Bønne. 77.

Klojæffe. 41.  
Knæegræs. 44.  
Knipling. 39.  
Kobber. 37.  
Kiørvel. 29.

Kongelys. 87.  
Kongens Kinabark. 36.  
Korsbær. 68.  
Korsblomster. 66.  
Kraakesod. 53.  
Kraakestiig. 53.  
Kraftmeel. 12.  
Kragetorn. 62.  
Krandseine. 61.  
Krap. 70.  
Krebseine. 23.  
Krebsstene. 23.  
Krengbærtorn. 7.  
Kresingbær. 88.  
Kreslinger. 88.  
Kroppegæs. 44.  
Krusemynte. 57.  
Kummen. 25.

Laamanak. 70.  
Laddoch. 70.  
Lakrits. 44.  
Langstenderod. 62.  
Latoch. 70.  
Laurbærbladet Kirsebærtræ. 51.  
Laurbærtræ. 51.  
Lavendel. 51.  
Laxeerblomster. 82.  
Ledmye. 19.  
Leersivel. 44.



# Dans Register.

Leersfreppe. 41.

Lemmike. 19.

Lindetræ. 84.

Løbstik. 52.

Løg. 28.

Løgurt. 75.

Løvetand. 82.

Løbstik. 52.

Lungegræs-Klunger. 18.

Lustgræs. 53.

Mahognitræ. 81.

Mairan. 53.

Malt. 53.

Malurt. 7.

Mandeblood. 48.

Manna. 54.

Maretorn. 14.

Mariebregne. 66.

Marilandsk Ormeurt. 78

Marrube. 55.

Martsfioler. 88.

Mastix. 55.

Matrum. 55.

Meelbarrus. 86.

Meelbær. 86.

Melksukker. 71.

Melon. 56.

Meloten. 56.

Merian. 53.

Misbær. 86.

Misnebær. 86.

Mennie. 58.

Molsforblom. 41.

Morbærtræ. 58.

Multebær. 70.

Munkeshætte. 8.

Munkeshoved. 82.

Munkekrone. 29.

Muskatenblomme. 59.

Muskatnød. 58.

Myrebær. 70.

Myrer. 42.

Myrrha. 60.

Natflade. 19.

Nellikær. 25.

Nellikærod. 25.

Negne Jomfrue. 34.

Norsk Thee. 87.

Nyper. 38.

Nienrod. 86.

Nilonge. 14.

Nliebille. 75.

Opium. 62.

Orangeblomster. 17.

Ormesfrø. 31.

Ormekrud. 82.

# Dansk Register.

Drimekrudtsfrøe. 82.

Dregalde. 14.

Dretalg. 76.

Panargummi. 63.

Pebermynte. 57.

Peberrod. 14.

Perikum. 48.

Persille. 65.

Petrolie. 64.

Pichurimbønne. 64.

Piil. 72.

Pimpinelle. 65.

Pokkenholt. 45.

Pomerantsblade. 17.

Pomerantser. 16.

Poppelpiil. 66.

Potasse. 32.

Potrosiner. 64.

Præstekrone. 82.

Purgeerkorn. 27.

Pyramontervand. 13.

Qvæder. 38.

Qvæseurt. 65.

Qvanne. 12.

Qvanrod. 12.

Qvassiebarf. 67.

Qvassietræe. 67.

Qvikketaagen. 44.

Qvikkelsv. 57.

Qvikurt. 44.

Rædla. 50.

Ræverever. 53.

Raufan. 82.

Rav. 80.

Reinsan. 82.

Reinsaufrøe. 82.

Rhabarber. 68.

Ringejan. 82.

Redarve. 12.

Rød Fingerhat. 38.

Rød Kinabark. 36.

Rød Dretunge. 9.

Røde Ribs. 69.

Røde Røser. 69.

Rellike. 58.

Rispons. 63.

Rocolie. 68.

Romerske Cameelblomster. 29.

Rosiner. 63.

Roslonge. 83.

Rosmarin. 69.

Rottekrudt. 15.

Roud-Røllik. 82.

Rude. 70.

Rystebloom. 41.



# Danſk Register.

Sabadillekorn. 70.

Sæbenrt. 74.

Safran. 36.

Sagapengumini. 71.

Salab. 72.

Salaprod. 72.

Salmiak. 11.

Salpeter. 60.

Salvie. 72.

Sanct-Ellensrod. 40.

Sanct-Hansurt. 48.

Sandvedgræs. 24.

Sarsaparill. 74.

Sassafras. 74.

Seidlitzersalt. 72.

Seidlitzervand. 13.

Selidon. 30.

Selstervand. 14.

Selsnuge. 30.

Senega. 75.

Senne. 76.

Sennep. 77.

Sevenbom. 71.

Simarubé. 77.

Skaarekonge. 63.

Skammonium. 75.

Skarmynte. 63.

Skarmyde. 31.

Skeenrt. 34.

Skiærbregne. 41.

Skiærsøde. 44.

Skingræs. 44.

Skiærbugsurt. 34.

Skorv. 41.

Skovmynte. 63.

Skovsyre. 7.

Skovsyresalt. 7.

Skovtidsel. 14.

Skreppe. 41.

Slaæetorn. 7.

Slangeurt. 76.

Sløke. 12.

Sloike. 12.

Søde. 44.

Sødvenne. 48.

Søde Mandler. 12.

Sødkonge. 44.

Sødrod. 44.

Søenfraækfod. 53.

Sølv. 14.

Sølberglød. 52.

Søde. 77.

Søebær. 77.

Søelbær. 69.

Sort Køebælde. 67.

Sort Nyserod. 47.

Sort Peber. 65.

Sort peruviansk Balsom. 18.

Soulonbat. 88.

Soymidatræ. 77.

Spansk Fluer. 23.

# Dansk Register.

Spanstgeont. 8.  
 Spanst Veber. 65.  
 Spanst Sæbe. 74.  
 Spiauter. 89.  
 Spidsøglands. 13.  
 Sprengerod. 30.  
 Stedmodersblomst. 88.  
 Steenfløver. 56.  
 Steensalt. 72.  
 Steensøde. 66.  
 Stiernannis. 13.  
 Stifmorsblomst. 88.  
 Strivelse. 12.  
 Stodderlys. 87.  
 Stoksvæve. 14.  
 Storax. 79.  
 Stor Baldrian. 86.  
 Stor Eriksgræs. 34.  
 Stor Græsrod. 24.  
 Stor Skreppe. 18.  
 Stor Svaleurt. 30.  
 Stormhat. 8.  
 Strandleg. 79.  
 Strandmos. 47.  
 Strandsteeurt. 34.  
 Straxbalsom. 80.  
 Sukker. 71.  
 Sure Kirsebær. 28.  
 Surinamst Drumbarktræ. 44.  
 Suurfløver. 7.  
 Svalerod. 47.

Svamp. 79.  
 Svinefidt. 17.  
 Svineurt. 77.  
 Syffelroet. 66.  
 Taggræs. 44.  
 Tagræs. 44.  
 Tamarindetræ. 81.  
 Tandsuc. 82.  
 Terpentin. 83.  
 Thymian. 84.  
 Tin. 79.  
 Tisbast. 58.  
 Tondersvamp. 9.  
 Tobak. 81.  
 Tordenskrepp. 18.  
 Tostkonning. 63.  
 Tragant. 85.  
 Tranebær. 63.  
 Trepeek. 41.  
 Troldebær. 39.  
 Tungspat. 78.  
 Tusengylde. 28.  
 Tutenage. 89.  
 Tytebær. 88.  
 Tytling. 88.  
 Tyttebær. 88.

Ulvesfis. 21.  
 Ulvesod. 53.

## Danſk Register.

Bagvartrod. 30.  
Valerian. 86.  
Balmueſaft. 62.  
Balnsddetræ. 50.  
Bandsennikel. 65.  
Bandskarſe. 60.  
Bandsmeloner. 32.  
Bandspaſtinak. 30.  
Bânille. 87.  
Belandſrod. 86.  
Benderod. 86.  
Bendmoſrod. 86.  
Benediſk Terpentîn. 83.  
Veronica. 87.  
Beſtindiſk Bittertræ. 67.  
Viebar. 68.

Bilde Caſtanier. 47.

Bild Karſe. 24.

Mairan. 63.

Mynte. 63.

Nardus. 86.

Rosmarin. 69.

Thymian. 76.

Wiin. 87.

Wiinſteen. 82.

Wiraſk. 61.

Wismuth. 21.

Wolverley. 14.

Wor Frue Sengenhalmt. 76.

Wor. 28.

Wrietorn. 68.

Zink. 89.

---

## Deutsches Register.

- Aaron. 15.  
Ackerwurzel. 22.  
Alandwurzel. 40.  
Alfranken. 39.  
Allaum. 10.  
Alloë. 9.  
Althee. 10.  
Ameisen. 42.  
Amerikanische Brechwurzel. 49.  
    Spigelia. 78.  
Amerikanisches Wurmkraut. 78.  
Ammoniac. 11.  
Andorn. 55.  
Angelica. 12.  
Angurien. 32.  
Augustura. 13.  
Annis. 13.  
Arabisch Gummi. 46.  
Armenischer Bolus. 21.  
Artischocken. 38.  
Aschsalz. 77.  
Asphalt. 16.  
Augenstein. 89.  
Bachbohnen. 19.  
Bärlap. 53.  
Baumöl. 61.  
Bedkraut. 52.  
Benedictenwurzel. 25.  
Benzoe. 19.  
Berberisbeeren. 20.  
Bergamotöl. 20.  
Bernstein. 80.  
Bibenell. 65.  
Biebergeil. 26.  
Bilsenkraut. 48.  
Birchentbeer. 20.  
Birckenwasser. 20.  
Bisam. 59.  
Bitterklee. 85.  
Bittersüß. 39.  
Blane Märzviolen. 88.  
Blauer Sturmhut. 8.  
    Vitriol. 89.  
Bley. 66.  
Bleyglätte. 52.  
Bleyweiß. 28.



## Deutsches Register.

Blutigel. 47.

Bokshorn. 42.

Borax. 21.

Borras. 21.

Bovist. 21.

Brandlettich. 41.

Brandtwein. 78.

Brasilianische Bohne. 64.

Brauner Dosten. 63.

Braunstein. 53.

Brenkraut. 41.

Brennessel. 86.

Brunnenkresse. 60.

Buchen. 40.

Coloquinten. 34.

Columbo. 34.

Copaibabalsam. 17.

Coriander. 34.

Corinthen. 64.

Cubeben. 37.

Curcumei. 37.

Deutscher Ingwer. 15.

Drachant. 85.

Drachenblut. 73.

Drehblatt. 85.

Dreysaltigkeitsblume. 88.

Cacaobohnen. 22.

Cajaputöl. 22.

Calmus. 22.

Camillen. 29.

Canel. 31.

Caraibische Chinarinde. 35.

Cardobenedicten. 24.

Carotten. 38.

Catechu. 27.

Chinarinde. 35.

Chinarwurzel. 30.

Chocoladefrucht. 22.

Christwürzel. 47.

Citron. 32.

Citron-Melisse. 56.

Cberaute. 7.

Ehrenpreis. 87.

Eibisch. 10.

Eichenbaum. 67.

Eichenschwam. 9.

Eisen. 41.

Eisen-Bitriol. 89.

Elastisches Harz. 68.

Elemi. 39.

Engelsüß. 66.

Englisches Variersalz. 72.

Erdranch. 42.

Eschenbaum. 42.

Essig. 8.

Essigrose. 69.

# Deutsches Register

Färberröthe. 70.

Fallkraut. 14.

Farnkraut. 41.

Federharz. 68.

Feigen. 25.

Feldkümmel. 25.

Fenchel. 42.

Fenchelholz. 74.

Feuerschwam. 9.

Fichtenknospen. 85.

Fiebertinde. 35.

Firniß. 73.

Flieber. 73.

Fliegenschwam. 9.

Franzosenholz. 45.

Frensamkraut. 88.

Galäpfel. 43.

Galbanum. 43.

Galgant. 43.

Gallizenstein. 89.

Galmey. 22.

Gauchblumen. 24.

Gauchheil. 12.

Geläuterter Honig. 56.

Gelbe Chinarinde. 36.

Wurzeln. 38.

Gelber Ingfer. 37.

Schwefel. 80.

Gemein Wurmfaat. 82.

Gemeiner Terpent. 83.

Wermuth. 7.

Gertkraut. 7.

Gertwurzel. 7.

Gewürznelcken. 25.

Gichtbeeren. 69.

Gichttrübe. 21.

Giffiwurzel. 47.

Glasfchmalz. 77.

Gottesgnadenkraut. 45.

Granatapfel-Schale. 45.

Graswurzel. 44.

Grindwurzel. 51.

Groß Schellkraut. 30.

Große Graswurzel. 24.

Großer Baldrian. 86.

Grünspan. 8.

Grüner Vitriol. 89.

Gummi Bdellium. 19.

Gummigutt. 46.

Gummilak. 50.

Gurke. 37.

Hack und Tack. 81.

Hanbutten. 38.

Hanf. 23.

Hasselwurzel. 16.

Hauhechel. 62.

Hausenblase. 49.



## Deutsches Register.

Heidebienenkraut. 69.

Himbeeren. 70.

Hindbeeren. 70.

Hindlaufwurzel. 30.

Hirschhorn. 34.

Hirschtalch. 76.

Hohlbeeren. 70.

Hollunder. 73.

Honig. 55.

Hopfen. 53.

Hufflattich. 41.

Hundeblumen. 82.

Hülfsendorn. 14.

Hünerdarm. 12.

Hüner-Eyer. 63.

Jalappe. 48.

Jamgikanische China. 35.

Wurmrinde. 44.

Jasminöl. 49.

Indischer Pfeffer. 65.

Jugfer. 90.

Johanniskraut. 48.

Isländisch Lungenmoos. 52.

Jsof. 48.

Zuckende Fasel. 77.

Judenpech. 16.

Jungfernhonig. 56.

Käsepappeln. 54.

Kalch. 22.

Kampeschenholz. 22.

Kampfer. 23.

Kanadischer Terpentia. 83.

Kardamomen. 24.

Kastarille. 26.

Kastarillenrinde. 26.

Kassie. 26.

Kellerhals. 58.

Kerbel. 29.

Kirschlorbeerbaum. 51.

Kleine Cardamomen. 24.

Rosinen. 64.

Kleiner Valdeian. 86.

Kletter. 18.

Knoblauch. 9.

Kochenille. 33.

Königs Chinarinde. 36.

Königskerzen. 87.

Korallenmoos. 47.

Krähenaugen. 61.

Krautmehl. 12.

Kranbeeren. 88.

Kranzaugen. 61.

Krausemünze. 57.

Krebsaugen. 23.

Krebssteine. 23.

Krepp. 70.

Kreuzbeeren. 68.

# Deutsches Register.

Kreuzblumen. 66.

Kürbel. 29.

Kuhkrägc. 77.

Kupfer. 37.

Lachenknohlauch. 75.

Lavendel. 51.

Lederharz. 68.

Lein. 52.

Liebstockel. 52.

Lindenbaum. 84.

Liquiritien. 44.

Löffelkraut. 34.

Löwenkraut. 82.

Löwenzahn. 82.

Lorbeerbaum. 51.

Luntenschwam. 9.

Lustblumen. 34.

Mäusegift. 15.

Mahagoniebaum. 81.

Majoran. 53.

Malz. 53.

Manna. 54.

Marien-Bettstroh. 76.

Marilandische Spigclie. 78.

Marilandisches Wurmkraut. 78.

Mastix. 55.

Maulbeerbaum. 58.

Maykäfer. 75.

Meerrettich. 14.

Meerzwiebel. 79.

Meliloten. 56.

Melone. 56.

Mennich. 58.

Merikanischer Käufesaamen. 70.

Milchzucker. 71.

Möhren. 38.

Mouchkappen. 8.

Mohnsaamen. 63.

Mohnsast. 62.

Moosbeeren. 63.

Moschatenblumen. 59.

Moschatennuß. 58.

Mutterkraut. 55.

Myrrha. 60.

Nachtschatten. 19. 77.

Narrenkappen. 8.

Nelkenwurzel. 25.

Nichsengalle. 41.

Panargummi. 63.

Pappelbaum. 66.

Pauttenbeeren. 70.

Peersaat. 65.

Petersilien. 65.

Pfassenohrlein. 82.

Pfeffermünze. 57.

# Deutsches Register.

Pflaumen. 67.  
 Pichurimbohne. 64.  
 Pomeranzblätter. 17.  
 Pomeranzblüthen. 17.  
 Pomeranzen. 16.  
 Post. 69.  
 Potaſche. 32.  
 Preißelbeeren. 88.  
 Primellen. 67.  
 Purgierkörner. 27.  
 Pyrmonterwaſſer. 13.

Quaſſienholz. 67.  
 Queck. 44.  
 Qwendel. 76.  
 Qwitten. 38.  
 Qwiſſilber. 57.

Raſengift. 15.  
 Raute. 70.  
 Reinfarn. 82.  
 Reinfarnſaamen. 82.  
 Rhabarber. 68.  
 Rindſtalch. 76.  
 Röllk. 58.  
 Römische Chamillen. 29.  
 Rößter. 85.  
 Roſcaſtanien. 47.  
 Roſinen. 63.  
 Roſmarin. 69.

Rothe Chinarinde. 36.  
 Johannisbeeren. 69.  
 Schſenzun-e. 9.  
 Roſen. 69.  
 Rother Enzian. 44.  
 Fingerhut. 38.  
 Mennich. 58.  
 Rüßöl. 68.  
 Rüſter. 85.  
 Ruhrinde. 77.  
 Ruhrwurzel. 49.

Sabadillkörner. 70.  
 Sadenbaum. 71.  
 Safran. 36.  
 Sagapen. 71.  
 Salapwurzel. 72.  
 Salbey. 72.  
 Salmiak. 11.  
 Salpeter. 60.  
 Sandbeere. 86.  
 Saſaparill. 74.  
 Sauerſlee. 7.  
 Sauerſleesalz. 7.  
 Saukraut. 52. 77.  
 Saure Kiſſchen. 28.  
 Scammonium. 75.  
 Schaaſgarb. 58.  
 Schaaſtalch. 76.  
 Scharfes Euphorbiumgummi. 40.

## Deutsches Register.

- Schierling. 31.  
 Schlackigtes Erdped. 16.  
 Schmeer. 17.  
 Schwalbenwurzel. 47.  
 Schwam. 79.  
 Schwarze Küchenschelle. 67.  
     Nießwurzel. 47.  
 Schwarzer Degen. 20.  
     peruvianischer Balsam. 18.  
     Pfeffer. 65.  
 Schweinschmalz. 17.  
 Schweerspat. 78.  
 Schwindelförner. 37.  
 Seidlizerfalz. 72.  
 Seidlizerwasser. 13.  
 Seifenkraut. 74.  
 Selterwasser. 14.  
 Semsblätter. 76.  
 Senega. 75.  
 Senf. 77.  
 Sewenbaum. 71.  
 Seversaat. 31.  
 Sendelbast. 58.  
 Silber. 14.  
 Silberglätte. 52.  
 Simarube. 77.  
 Soda. 77.  
 Soyminenbaum. 77.  
 Spanische Fliegen. 23.  
     Seife. 74.  
 Spanischer Pfeffer. 65.  
 Spießglanz. 13.  
 Stachelnußkraut. 38.  
 Stangenlaß. 50.  
 Stechapfel. 38.  
 Stechpalmen. 14.  
 Steinklee. 56.  
 Steinsalz. 72.  
 Stekdorn. 7.  
 Sternannis. 13.  
 Stiefmütterchen. 88.  
 Stinkender Usand. 15.  
 Storax. 79.  
 Streupulvermoos. 53.  
 Styrar balsam. 80.  
 Süßholz. 44.  
 Süße Mandeln. 12.  
 Surinamischer Wurmrindenbaum. 44.  
 Surinamisches Bitterholz. 67.  
 Tamarindenbaum. 81.  
 Taubenkropf. 42.  
 Tausendgülden. 28.  
 Terpentin. 82.  
 Teufelsdreck. 15.  
 Thymian. 84.  
 Toback. 81.  
 Tollbeeren. 19.  
 Tollkraut. 38.  
 Türkischer Pfeffer. 65.  
 Ulmenbaum. 85.



## Deutsches Register.

Vanillie. 87.  
Venedischer Serpentin. 83.  
Virginische Giffwurzel. 76.  
Violenwurzel. 49.  
Vogelkraut. 12.

Wacholder. 50.  
Wacholderharz. 73.  
Wachs. 28.  
Wallrath. 29.  
Wasserbungen. 19.  
Wasserfennikel. 65.  
Wassermelonen. 32.  
Wasserschierling. 30.  
Wegwartwurzel. 30.  
Weichsdornbeeren. 68.  
Weiden. 72.  
Wein. 87.  
Weinraute. 70.  
Weinstein. 82.  
Weirauch. 61.  
Weisse Kreide. 36.  
Weisser Bertram. 67.  
    Mohn. 63.  
    Reinfarn. 67.  
    Senf. 40.  
    Vitriol. 89.  
    Zimmet. 23.

Weisses Bergöl. 64.  
    Steinöl. 64.  
Welscher Nußbaum. 50.  
Westindisch Bitterholz. 67.  
Wiesendragun. 67.  
Wiesenkresse. 24.  
Wilder Rosmarin. 69.  
Wildes Delbaumgummi. 39.  
Winter-Majoran. 63.  
Wismuth. 21.  
Wolferley. 14.  
Wolfskirsch. 19.  
Wollkraut. 87.  
Würznägelein. 25.  
Winterich. 30.  
Wunderbaumsaamen. 27.  
Wurmmoos. 47.  
Wurmsaamen. 31.

Zaunrübe. 21.  
Zeitlose. 34.  
Zimmet. 31.  
Zinck. 89.  
Zinn. 79.  
Zitwersaanten. 31.  
Zucker. 71.  
Zunderschwam. 9.  
Zwiebeln. 28.

---

SELECTUS MEDICAMINUM,

QUAE

IN OMNIBUS MINORIBUS PHARMACOPOLIIS

PRÆSTO ESSE DEBENT.





**A**cetum concentratum.

crudum.

faturninum.

faturninum concentratum.

seilliticum.

**Acidum** muriaticum.

nitricum tenue.

succinicum.

fulphuricum concentratum.

fulphuricum dilutum.

tartaricum.

**Aerugo.**

**Aether** sulphuricus.

**Agaricus.**

**Aloë** succotrina.

**Alumen** crudum.

ustum.

**Ammoniacum.**

**Ammonium** carbonicum.

pyro-oleosum.

muriaticum.

**Amygdalae** amarae.

dulces.

**Amylum.**

**Aqua** calcariae ustae.

cinnamomi simplex.

destillata.

foeniculi.

menthae crispae.

menthae piperitae.

petroselini.

rosarum.

sambuci.

faturnina.

**Argentum** nitricum fusum.

**Arsenicum** album.

**Asa** foetida.

**Asphaltum.**

**Axungia** porci.

**Baccae** juniperi.

lauri.

**Balsamum** copaivae.

peruvianum.

saponaceum.

terebinthinatum.

# SELECTUS MEDICAMINUM.

Balsamum universale.

vitae externum.

Baryta muriatica.

Borax.

Butyrum inajoranae.

Calx.

Camphora.

Cantharides.

Carbo praeparatus.

Cardamomi minores.

Caricae.

Caryophylli.

Cassia fistula.

Castoreum rufficum.

Cepae.

Cera alba.

flava.

ad labia.

Ceratum saturni.

Cerussa alba.

Clavelli cinnamomi.

Colla piscium.

Comae lupuli.

Cornu cervi.

sine igne praeparatum.

Cortex aurantiorum.

cascarillae.

chinae fuscus.

chinae flavus sive regius.

cinnamomi.

Cortex mezerei.

nucum juglandis viridis.

quercus.

salicis.

Creta alba.

Crocus.

Cuprum sulphuricum.

Electuarium aperiens.

theriaca.

Elixir acidum.

pectorale.

Emplastrum adhaesivum.

cantharidum ordinarium.

cantharidum perpetuum.

cerussae.

cicutae.

commune.

diachylon gummosum.

hydrargyri.

de lapide calaminari.

meliloti.

miraculosum.

piceum.

Euphorbium.

Essentia absinthii.

amara.

asae foetidae.

cantharidum.

castorei.

cinnamomi.

# SELECTUS MEDICAMINUM.

Essentia corticis peruviani simplex.  
 corticis peruviani composita.  
 corticis aurantiorum.  
 corticis cascarillae.  
 radicis gei urbani.  
 myrrhae.  
 pimpinellae.  
 scillae.

Extractum absinthii.  
 aconiti.  
 cardui benedicti.  
 chamomillae.  
 conii maculati.  
 corticis peruviani.  
 graminis liquidum.  
 hyoscyami.  
 nucum juglandis.  
 taraxaci liquidum.

Fel bovinum inspissatum.

Ferrum pulveratum.  
 sulphuricum.

Flores arnicae.  
 chamomillae vulgaris.  
 lavendulae.  
 rosarum.  
 sambuci.  
 verbasci.

Folia quercus.  
 fennae.  
 ribis nigri.

Galbanum.

Gallae.

Gelatinae liquiritiae.

Glandes quercus.

Gummi arabicum.

guajaci.

guttae.

Herba absinthii.

aconiti.

althaeae.

cardui benedicti.

chamomillae vulgaris.

cicutae aquaticae.

cicutae terrestres.

farfarae.

gratiolae.

hyoscyami.

majoranae.

malvae.

melissae.

menthae crispae.

menthae piperitae.

millefolii.

nicotianae.

salviae.

scordii.

thymi.

trifolii fibrini.

veronicae.

violae tricoloris.

## SELECTUS MEDICAMINUM.

Hirudines.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum.

muriaticum mite.

oxydatum rubrum.

oxydatum nigrum.

stibiato-fulphuratum.

fulphuratum nigrum.

Infusum fennae compositum.

Kali aceticum.

carbonicum depuratum.

nitricum depuratum.

tartaricum.

Lapis calaminaris.

Lapides cancerorum.

Lignum guajaci.

quassiae.

sassafras.

Linimentum ammoniatum.

ammoniato-camphoratum.

Liquor ammonii acetici.

ammonii carbonici aquosus.

ammonii causticus.

ammonii pyro-oleosi.

ammonii succinici.

stibii muriatici.

Lithargyrium.

Lycopodium.

Macis.

Magnesia carbonica.

fulphurica.

Magnesium oxydatum nigrum.

Maltum.

Manna.

Mel album.

commune.

despumatum.

Minium.

Moschus.

Musculus islandicus.

Myrrha.

Natrum aceticum.

carbonicum.

fulphuricum.

Nuces moschatae.

vomicae.

Oleum absinthii coctum.

amygdalarum.

animale aethereum.

animale foetidum.

anisi.

anthos.

asphaltum.

baccarum juniperi.

caryophyllorum.

de cedro.

chamomillae coctum.



# SELECTUS MEDICAMINUM.

Oleum foeniculi.  
 hyoscyami.  
 hyperici.  
 laurinum expressum.  
 lini.  
 olivarum.  
 ovorum.  
 raparum.  
 ricini.  
 terebinthinae.

Opium.  
 Oxytel scilliticum.  
 simplex.

Pastulae laxativae.  
 Pasta altheae.  
 Pilulae aperientes.  
 Piper nigrum.  
 Pix solida.  
 Plumbum aceticum.  
 Poma aurantia inmatuta.  
 colocynthidis.

Pulpa cassiae.  
 tamarindorum.

Pulvis jalappae compositus.  
 magnesia compositus.  
 refrigerans.  
 temperans camphoratus.

Radix altheae.  
 angelicae.

Radix armoraciae.  
 bardanae.  
 calami aromatici.  
 caryophyllatae.  
 chinae.  
 enulae.  
 gentianae.  
 glycyrrhizae.  
 graminis.  
 gratiola.  
 jalappae.  
 ipecacuanhae.  
 iridis florentinae.  
 pimpinellae.  
 rhabarbari.  
 saleb.  
 scillae.  
 senegae.  
 taraxaci.  
 valerianae sylvestris.  
 zingiberis.

Resina guajaci nativa.  
 jalappae.  
 pini.

Sapo alicantinus.  
 stibiatus.

Scammonium.

Semen anisi.  
 anisi stellati.  
 cannabis.



# SELECTUS MEDICAMINUM.

## Semen carvi.

cynae.

foeniculi.

foenugraeci.

lini.

papaveris albi.

petroselinii.

fabadillae.

sinapi albi anglici.

tanacetii.

## Sevum bovinum.

ovillum.

## Species pro cataplasmate emolliente

pro decocto lignorum.

fumales.

pro infuso pectorali.

resolventes externae.

## Spiritus cochleariae.

lavendulae simplex.

lavendulae compositus.

muriatico-aethereus.

fulphurico-aethereus.

fulphurico-aethereus-camphoratus.

vini camphoratus.

vini rectificatus.

vini rectificatissimus.

## Spongia cerata.

marina.

## Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum.

fulphuratum nigrum.

## Stipites dulcamarae.

Succinum.

Succus berberum.

juniperi inspissatus.

liquiritiae depuratus.

sambuci inspissatus.

## Sulphur citrinum.

depuratum.

praecipitatum.

stibiatum rubrum.

## Syrupus althaeae.

berberum.

ceraforum.

diacodion.

mannae.

rhei.

sacchari depurati.

rubi idaei.

## Tamarindi.

Tartarus depuratus.

natronatus.

stibiatus.

## Terebinthina cocta.

communis.

## Tinctura guajaci spirituosa.

opii crocata.

opii spirituosa.

rhabarbari aquosa.

rhabarbari vinosa.

# SELECTUS MEDICAMINUM.

Unguentum althaeae.

basilicum.

cerussae.

cerussae camphoratum.

hydrargyri cinereum.

hydrargyri rubrum.

rosmarini compositum.

saturninum.

fulphuris.

Vinum gallicum album.

malacense.

stibiatum.

Zincum oxydatum album.

purum.

fulphuricum.

---



# ERRATA NOTABILIORA

## Pharmacopoeae danicae.

Pag. 7. Lin. 14. colligenda leg. colligendi

- 8. — 5. paratus l. paratur
  - 11. — 2. violaceae l. ferulaceae
  - 15. — 24. Kaempero l. Kaempfero
  - 16. — 1. Haselwurzel l. Haselwurzel
  - 26. — 1. Antophylli l. Anthophylli
  - 28. — 6. gulden l. gùlden
  - 33. — 1. guttularum l. guttularum acidi sulphurici
  - — 26. In Cocco cacti coccinelliferi l. Coccus Cacti, in Cacto coccinellifero
  - 36. — penult. p. provin- l. provin-
  - 49. — 9. Hufsonis l. Hufsonis,
  - — 22. nullius l. nullus
  - 57. — 19. reliquens l. relinquens
  - 59. — 18. collectus l. collecta
  - 61. — 25. Olei l. Oleae
  - 65. — 10. locos l. locus
  - 68. — 7. Raphani l. Raparum
  - — ult. Weichsdornbeeren l. Weisdornbeeren
  - 72. — 1. catharticum l. catharticum
  - 75. — 9. virofi l. virofi
  - 78. — 9. frustulae albae, lamellofae l. frustula alba, lamellofa
  - — — inquinatae l. inquinata
  - 80. — 7. magnum l. magma
  - 81. — 8. rugoso l. rugosa
  - — 9. coriaceo l. coriacea
  - 86. — 22. congrueus l. congruens
  - 134. — 21. seclusi l. seclusae
  - 139. — 21. indururescat l. indurescat
  - 143. — 13. caustici l. carbonici
-



















